

# APPARATVS B

ET DELECTVS  
SIMPLICIVM

MEDICAMEN-  
TORVM.

\*

DE COMPOSITIONE

*Medicamentorum secundum*

*Genera,*

EX PAVLO Aegineta.

DE COMPOSITIONE

*Medicamentorum secundum Genera  
vniuersalis methodus, ex*

GALENO.

\*


OMNIA nunc primùm ædita, cum Medicis, tum  
Pharmacopolis omnib. apprimè neces-  
saria, Auctore

CONRADO GESSNERO Tigurino.

Lugduni,

*Sub scuto COLONIENSI, apud Ioan-  
nem & Franciscum Frellonios, fratres.*

1 5 4 2



CLARISS. MEDICO,  
D. CHRISTOPHORO  
CLAVSERO

CONRADVS GESSNERVS

S. P. D.



OLENDA profectores,  
multaq; reprehensione di  
gna, Christophore uir do  
ctissime, cum nostro secu  
lo artes ac discipline o  
mnes, barbaram quæque

suam exuerint leberidem, & tanquam uere  
nouo eruditorum ceu fauoniorum afflatu sc  
lici reuirescere cœperint: solam adhuc Me  
dicinam nondum indiq; uetus illud exuiuium  
exuisse. Haud secus quàm cum puerpera sc  
liciter quidem enixa partum est, secundis ue  
rò hærentibus adhuc affligitur: Ita Pæonia  
disciplina in lucem nuper ædita est satis in  
tegre, nisi aliqua eius pars lateret adhuc in  
tenebris condita. Quæ nam uerò ea est? Illa  
omniū prima, quæ iuuenescere primum de-

bebat: illa in primis necessaria, quod ad frequenter usum attinet, ac instrumenti rationem: illa cuius auctores in utraque lingua nitidissimos & eloquentissimos habemus. Nempe quæ Medicamenta simplicia rectè cognita, suo in genere præstantissima quæque seligit, usui lecta probè parat, siue simplici, siue cum alijs iuncto. Minimè te fugit hucusque è faculentis barbarorū lacunis, quicquid huiusmodi Apparatum attinet, præteritis antiquiorū doctiorumq; fontibus, haustum esse. Hanc ego tandem fortunam misertus Medicinæ nobilissimæ, tanquam alicuius heroinæ in fœdam miseramq; servitutem indignis modis redactæ, quantiscunque possem hoc tempore copijs succurrere uolui, inq; pristinum ingenuitatis statum asserere. Tolerandum quidem utcumque existimassem, si dictis tantum barbaris ueluti conuitijs inclyta herois fuisset affecta, nisi purissimo etiam eius integerrimoq; corpori iniurias inferri animaduertissem. Itaque uirium mearum non igna-



## DEDICATORIA.

rus, periclitari tamen egomet malui, quam sciens uidentisq; ipsam in periculo solam deserre. Mox suppetias ad hoc ex antiquis collegi, Dioscoride cumprimis, eaque Mesuæi parte, quæ iam antea eruditissimi uiri Tagautij opera politius exculta fuerat. Hoc enim enixè cupio, hoc unicum instituo, ut phar macorū officinæ rectè sint constitutæ. Proinde simplicia primū medicamina, tum quæ Dioscorides, tum quæ alij Græci Latiniq;ue insignia tradiderant, in enchiridion redegi, historia quidem fuscè explicata, uiribus autem breuissimè iuxta Pauli Aeginetæ ferè præscriptum. Eorundem alio opere solas nomenclaturas uarijs linguis exposui, uidelicet Latina, Græca, Germanica atque Gallica. Rursus alio libello succidanea, quæ mutuos & æquales usus sui exhibent, conscripsi: omnibus in Pharmacopoliorū utilitatem elaboratis, ut simplicium nomina, historiam, reciprocationem, delectum, apparatusq;ue haberent. Quæ si non perfeci, saltem cona-

tus sum. Interim hoc labore fruuntur Septuaginta-  
 farii, hinc interim proficiant, donec uel ipse  
 colophonem imposuero, uel alius quispiam,  
 cui hæc rudimenta sint absoluendi à se ope-  
 ris. Habebunt ex hoc libro pharmacorum  
 institores ea signa quibus in suo quodque ge-  
 nere præstantissimum deprehendant, co-  
 quendi, lauandi, urendi, eliciendi que succos  
 rationem, & alia huiusmodi necessaria co-  
 gnitu. Quòd si adhuc composita medica-  
 menta illustrentur, quomodo apud ueteres  
 sint appellata, qua ratione parata, haud ui-  
 deo quid aliud à pharmacopolis desyderari  
 debeat, aut possit. Sunt sanè per multa  
 que uulgo barbaris nominibus iactantur, an-  
 tiquius à Græcis deducta, multa à recen-  
 tioribus quidem Græcis, politius tamen in-  
 tegrinsque multo, quàm usurpentur hodie,  
 tradita: sed in tanta nominum barbarie, cor-  
 ruptaque rerum confusione plerisque latent.

Ea quoque breui enucleata, Latine descri-  
 pta ex ueteribus, ueraque methodo compo-  
 sita

# DEDICATORIA.

sua studiosis impertiar, si hæc illis placuisse animaduertero. Visum est autem huic adiungere uniuersalia Aeginetæ de medicamentorum secundum genera compositione præcepta, eiusdemque argumenti generalē Galeni doctrinam, particularibus ferè cunctis reiectis: partim ut liber magnitudine nō excederet, sed breuitate sua legentium animos inuitaret, alliceretque: partim quòd multa inutilia, non ab ipso Galeno, sed alijs passim doctis atque indoctis composita uiderentur: Facile autem fuerit simplicium materiam, ac uniuersalem methodum callenti, particularia ad quoscunque affectus medicamina consiliuere. Item in alio opere quod iam breui ædendum pollicitus sum, scorsim omnes saltem insignes particulares cōpositiones memorabo. His omnibus de causis generalē solutionem tanquam epitomen Galeni librorum de compositione *et* *ym*, hoc loco tradere operæpretium iudicavi: paucis exceptis ex quorum descriptione reliquorū etiā apparatus

Seplasiarij conijcerent, exemplaremque ali-  
 quam exercitationē haberent. E cæteris Ga-  
 leni scriptis nullum scio pharmacopolis ne-  
 cessarium lectu, nisi qui Theriacam mixtu-  
 ram præparât, ut primus de antidotis, quem  
 diligenter iterum atq; iterū euoluant omnes  
 adhortor. Tibi uerò in primis hoc quicquid  
 est, eruditissime uir Christophore, mihiq; co-  
 lendissime, uolui dedicatū, idq; iure optimo,  
 cū in clyta urbs Tigurū cōmunis utriq; pa-  
 tria te fælicissimum sui ἀρχιεργου habuerit.  
 Præterea D. Albertus Belfortis Rhæus uir  
 in omni disciplinarum genere absolutus, me-  
 dicinæ iuxta & philosophiæ peritiss. cuius  
 hic aliquot diebus, quæ eius est humanitas,  
 summa familiaritate sum usus: hic inquam  
 cum quotidie in honorificā tui mētionē simul  
 incideremus, effecit quò minus tui obliuisci  
 potuerim. Accipies igitur bono animo, &  
 pro eruditione tua si quid mutādū, demēdū,  
 adiiciendū ue uidebitur, facies. Vale.  
 Lugduni in peregrinatione, 1541. Idib. Ian.

# Index in Apparatum

## Simplicium & Generalium Medicamentorum.

A		Aeris squama	10
Abſinthium	pag. 3	Aes uſum	11
Abſinthij doſis & de		Aeris coſtio	126
lectus	ibid.	Aeris ſcoria	11
Acacia	4	Aerugo rafa	ibid.
Acaciæ delectus	ibid.	Aeruginis coſtio	125
Acopa	133. & 273	Aerugo ſcolecia	12
Acopa calefaciētia quibus		Agaricum	13
conſtent, quibusq; conue-		Agarici mali notæ	14
niant	133	Agglutinamenta	121
Acopa emollientia quid		Alcyonij quinque genera	
preſtent	ibid.		14
Acopis quæ miſceantur		Alſeſceræ doſis	27
	275	Aloe	15
Acoporum ſpiſitudo quæ		Aloës optimæ notæ	ibid.
eſſe debeat	133	Aloës coſtio	126
Acorum	4	Alumen	16. & quomodo
Adeps omnis	4. & ſeq.	modo in emplaſtris co-	
&	264	qui debeat	126
Adipum differentiæ	261	Alypia unde dicta	112
Aeris flos	9	Ammoniacum	17
Aeris flos quomodo in em-		Ammoniaci coſtio	127
plaſtris cog debeat	127	Amomum	17

# I N D E X.

Amomis	17	Atramentū librarium	23
Amurca	18	Atramentū sutoriū	ibid.
Amygdalæ dulces	ibid.	Atramenti sutorij coctio	
Amylum	ibid.		126
Anisum	ibid.	Auripigmentum	24
Anacollemata	123	Auripigmenti coctio	126
Antipathes	41		B
Apochyma, pix nauibus		Balanus myrepfice	25
derasa, quomodo in em=		Balsanum	ibid.
plastris coq̃ debeat	127	Bdellium	26
Aqua	18	Bdellij coctio	127
Argenti spuma	19	Ben delectus	25
Argēti spumæ coctio	126	Bitumen	27
Argenti spumæ usus & ui		Bituminis coctio	127
res	155	Bryon	69
Argenti spumæ crudæ u=		Bryonia	27
fus	161	Britanica	ibid.
Argenti spuma & reliqua		Buprestes	ibid.
metallica quomodo ab=		Butyri fuligo	ibid.
luantur	162		C
Argentum uiuam	21	Cadmia	28
Aristolochia	ibid.	Cadmia coctio	126
Aristolochiæ delectus &		Calamus odoratus	30
dosis	22	Calx uiua	ibid.
Armenius lapis	ibid.	Cantharides	ibid.
Armenici dosis	ibid.	Cardamomum	31
Asarum	ibid.	Cartami delectus & dosis	
Asius lapis	23		39
Aspalathus	ibid.	Cassia	31
			Cassia

# INDEX.

Cassia fistularis, quam Græci uelutres ignorarunt	31	Chrysocolla	ibid.
Castorium	32	Cicuta	37
Cedrus	ibid.	Cinnabaris	ibid.
Cedria	ibid.	Cinnamomum	ibid.
Centaureum magnum	ibid.	Cnicus	39
Centaureum minus	ibid.	Cnidij granum	110. do=
Centaureij utriusque dos	33	sis	111
delectus	33	Coccum	39
Cera	33. & quomodo in emplastris coqui debeat	Cocculus lapis	39. &
Cera candida quomodo fit	54	Collyria	121
Cera cum oleo in medicamentis quis modus esse debeat	132	Collyriorum liquidorum materia	123
Ceratoma lagnata	274	Colocynthis duplex genus	40
Cervi cornu	34	Colocynthis medullæ præparande modus.	ibidem
Cerussa quomodo fit	34	Conchyliorum coctio	130
que melior	35. & quomodo in emplastris coqui debeat	Conyza	41
Chalcitis	36. & quomodo in emplastris coqui debeat	Corallium	ibid.
Chamaelea	110	Costus	ibid.
Chelidonium	56	Cotonea mala	42
		Crocodili terrestris simum, siue Crocodilea	ibid.
		Crocomagma	ibid.
		Crocum	42. & 43
		Cucurbitula sylvatica diæ	
		ligentissime terenda	40
		Cya	



# INDEX.

Cyaneus, siue Coceruleus la	Emplastrorū materia	123
pis	Emplastrorum differentie	43
Cyclamen		44 124
Cypirus	ibid. Emplastra catagmatica	
Cyphi thymiana	45 102. &	124
Cyprus	ibid. Emplastra cicatricem du-	
	centia	124
<b>D</b> Acrydion	98 Emplastra colletica	ibid.
Diphryges	45. & Emplastra quæ cōcoquunt	
quomodo in emplastris	ibid.	
coquatur	130 Emplastra digerentia	ibi
Dipsacum	46 dem &	257
Dracunculus	ibid. Emplastra emollientia	i-
Dropax duplicem recipit	bidem	
præparationem, materiā	Emplastra enema	125
acopis & emplastris	Emplastra extrahentia	
confinem	133 124. &	257
Dulcis radix	46 Emplastra quæ leniunt	
	125	
<b>E</b> Benus	46 Emplastra pus mouentia	
Elaterium	47 ibid.	
Elaterij durationis tempus	Emplastra siccantia	124
48	Emplastrorū uiridium u-	
Elleborus uomitione pur-	sus	179
gat	113 Emplastrorum uiridium	
Elleborus albus quomodo	commixtio, & propor-	
præparandus	ibid. tio	180
Elleborum fortissimo duci	Emplastra quomodo uiri-	
æquatur	ibid. dia fiant	182
	Em	



# I N D E X.

Emplastrum uiridis simplicis	spuma & ccrussa	164
confectio & uirtus	Emplastrum eiusdē pōd.	166
Emplastrum melina	Emplastrum candida quomo	
Emplastrum rufa, quæ dixi	do componenda aduersus	
ma, id est incerti coloris	ulcera, cocoethe, & cica	
dicuntur	tricem difficulter admittentia	167. & seq.
Emplastrum rufum Galeni	In Emplastris colorum uarietas	171
190	Epithemata	131
Emplastrum cicatricem inducentia	Epithymum	48
Emplastrum cephalica	Epithymi dosi	49
Emplastrum propriè cephalica	Eruina farina	ibidem
193	Euphorbium	ibidem
Emplastrum glutinanti	Euphorbij dosi	50
194	F	
Emplastrum nigrum	FAex	50
Emplastrum nigri coctio ibi.	Fel	51
Emplastrum pharmacum ὀξυχαλκίως	Fici lixiuum	ibidem
143. & seq.	Fici syluestris & satiuæ succus	ibidem
Emplastrum ex argenti spuma præparatum	Fœniculi succus	ibidem
155	Fœnumgræcum, & eius coctio ex Actio	52
Emplastrum candidum quomodo fit	Fucus marinus	ibidem
157	Fuligo	ibidem
Emplastrum ex argenti spuma & hydreleo	Fumaria	ibidem
157	Fumariæ exhibitionis modus	53
Emplastrum ex argenti spuma & oxeleo		
159		
Emplastrum ex argenti spuma & aneleo		
160		
Emplastrum alba ex argenti		

# INDEX.

G		Hyoſcyamus	ibidem
Agites lapis	53	Hypociſthis	58
Galbanum 53. & quo		Hyſſopum	ibidem
modo in emplaſtris co-		I	
quatur	128	Ichthyocolia	55
Galenii documentum de la-		Indicationes ad ulcera cu-	
pidibus abluendis	22	randa	255
Galla	54	Indicum	59
Gallinacei ueteri ius	ibid.	Inunctionum alie ſimpli-	
Galli gallinacei delectus	54	ces, alie compositæ	135
Gallinacei decocti doſis	55	Inunctionum ſimpliciũ ma-	
Geniſta	102	teria	ibidem
Gentianæ ſuccus	55	Iris	59
Gingiber	ibidem	Iris Meſue	ibidem
Glâs unguetaria 25. & 55		Iris Florentina	60
Glutinum	55	Iuncus odoratus	ibid.
Glutinum piſcium	ibid.	L	
Gramen	56	Ac	61
H		Lactuca ſylueſtris ibi.	
Aematites	56	Ladanum	61
Helenuſ	57	Lana et lanarum medicina	
Hermodaſtylus	ibidem	62	
Herbæ quomodo emplaſtra		Lapidum coſlio	130
ingrediantur	130	Laſerpitium	62
Hermodaſtylis legendis tẽ		Lathyrus	63
pus accommodum	ibid.	Lentiſcus	ibidem
Hermodaſtylus rotundus		Ligultiſticum	63
ibidem		Lilium	ibidem
Hormunum ſylueſtre	57	Lora	ibidem
		Lycium	

# INDEX.

Lycium	64	bdena	163
Lyncis urina, siue Lyncu- rium	ibidem	Medicamenta specialia	198
M		et seq.	
MAgnes	65	Medicamentorum ex me- tallicis confectio, ad ner- uorum uulnera	219
Malabathrū	ibid.	Medicamentum ex euphor- bio	225
Malagmata	259	Medicamentum ex liquabi- libus	230
Malagmatum genera	131	Medicamentum ex Ladano	252
Mandragoras	65	Medicamenti emplastrodis	250
Manna	66	compositio	250
Mannæ adulteratio	ibid.	Medicamentum mediocre	ibidem
Mannæ thuris coctio	128	ibidem	
Marchasita	43	Medicamentū liquidū	263
Marrubium	66	Medicamentis siccis, in ul- ceribus ad cicatricē ægre uenientibus et malignis, quomodo utendū sit	246
Mastiche	ibidem	Medicamina malaſtica pri- mū ordinis	267
Meconium	79	Medicamina malaſtica ſe- cundi ordinis	268
Medicamenta arida	118	Medicamina relaxātia	270
Medicamēta ſtomatica	120	Medicamentum conſiſten- tiæ ordo	273
Medicamentorum ſtomati- corum uſus utrius	ibid.	Medulle	67. et 265
Medicamenta quæ empla- ſtra ingrediuntur quomo- do coquantur	125	Mel	
Medicamenta qui probè cō- poſiturus eſt, quæ præſci- re eū cōuenit	138. et ſeq.		
Medicaminum compoſito- rum uſus	140		
Medicamentum ex moly-			

# I N D E X.

Mel	67	Nardum Celticum	72
Melanteria	ibidem	Nervorum uulneratorum	
Melilotos	68	curationis modus	198
Mesue error	93	Nitrum	72
Mesue somnium	112	Nitri spuma	73
Metalla quæ liquefiunt	156	Nitri coctio	130
Metallorum frictio cum a-		O	
ceto ad solem	177	Enanthe	73
Mezcreon	111	Oesypum	ibidem
Mezerei dosis	ibidem	Oleæ Aethiopicæ lachry-	
Minij coctio	126	ma	74
Misy quomodo emplastra		Oleum candidum	ibid.
ingrediatur	129	Oleæ sylvestris succus	75
Molybdæna	68	Oleum Sicyonium	ibid.
Molybdoides lapis	83	Oleum Omphacinum	76
Mori succus	68	Olei cum cera in medica-	
Mori radix	ibidem	mentis quis modus esse	
Muscus	69	debeat	132
Myrobalani Cepuli, Em-		Olei differentie	178
pelitici, Belethzici, Ni-		Oleum tenuissimum	209
gri	69	Olei coctio	129
Myrrha	70	Oleū simplex acopon	274
Myrrhæ coctio	129	Omphacium	76
Myrrhatroglodytica	70	Opium	76. & 79
Myrrha Bæotica	ibidem	Opopanacis coctio	129
Myrtus	71	P	
Myrtidanum	ibidem	Palma Elate	77
N	N	Palmarum nuclei	ibi.
Nardi genera	71	Panaces	ibidem
		Panis	

# INDEX.

Panis porcinus	44	guia	ibid.
Pancreatium	78	Pissasphaltum	ibid.
Papaueris calyces	ibid.	Pityusa	ibid.
Papaueris nigri capita & folia	78.79	Pityusæ modus	112
Papaueris lachryma quo= modo emplastra ingre= diatur	128	Pix arida	81
Pastillorū tres species	117	Picis costio	129
Peplus	79	Plumbaginis costio	ibid.
Pepo	ibid.	Plumbum elotum	82
Pucedanum	ibid.	Plumbum ustum	ibid.
Pharmaca abstergentia		Plumbi usti costio	129
184. & seq.		Plumbi recrementum	83
Pharmacum ex columba= rum stercore	233	Polium	ibid.
Pharmacū ex herbis	234	Polypodium	ibid.
Pharmacorum sumptuoso rum confectura ad ner= uos uulneratos	235	Polypodij notæ	ibid.
Phrygius lapis	80	Pompholyx	84
Phu	ibid.	Pompholygis costio	126
Piceæ fuligo	ibid.	Populus	87
Picus liquidæ fuligo	ibid.	Propolis	ibid.
Picinum oleum	ibid.	Propolis costio	130
Pimi fuligo	ibid.	Pruna	87
Pinorum erucæ	27	Pruna prandium inchoa= re debent	88
Piper nigrum	81	Prunorum decocti modus	
Piscium fluiuatilium pin= a		ibidem	
		Pseudocasia	31
		Pseudocinnanomum	38
		Pforicum	88. & 36
		Psyllium	88
		Psyllium commēdatur se= a	

# INDEX.

mine	ibid.	Rhaponticum	ibid.
Pumex	ibid.	Rhu	ibid.
Pumicis coctio	130	Ricinus	ibid.
Punicum malum domesti-		Rosarum succus	92
cum & sylvestre	88	Rosei pastilli	ibid.
Pycnocomon	ibid.	Rosarum quæ præstenda	
Pyrites	44. & 89	ibidem	
Q		Rosæ damascenæ	93
QVo tempore, quibus		S	
locis stirpes legere		Sagapenum	93
conueniat		Sagapenu optimu	94
R		Sagapenum purgatorium	
Radicum coctio	130	non est	ibid.
Resina liquida è pinu		Sagapeni coctio	130
& picea	89	Sal	94
Resinæ coctio	130	Salis flos	95
Resina lentiscina	66	Salis spuma	ibid.
Resinæ	229	Salis coctio	130
Resinarum differentie		Salix	95
176. &	213	Samia terra	ibid.
Resinæ cum malagmatis mi-		Sanuus lapis	ibid.
sceantior	265	Sampsuchum	ibid.
Resinæ Colophonie du-		Sandaracha	ibid.
plex nota	265	Sandarachæ coctio	126
Rhabbarbarum	90	Sarcocolla	96
Rhabbarbari optimi notæ		Scammonia	ibid.
ibidem		Scammoniū colligendi mo-	
Rhabbarbarum correctore		di duo ex Diosc.	96.
non eget	91	ex Mesuæ quatuor	97

Scam

# INDEX.

Scammonio colligēdo tem	Spatha	77
pus accommodum 97	Spica	91
Scammonij optimi fidelis	Spodium	86
probatio 98	Spongiæ	102
Scammonium deterrimum	Squamma ex Acie decussa	
ibidem	10	
Scammonij dosis 98. & 99	Squilla	100
Schistus lapis 99	Stellatus lapis	43
Scilla ibid.	Styrax	103
Scordium 100	Styracis differentię & ele	
Semenum coctio 130	ctio	264
Sene 100	Sulfur	103
Serapionis error 41	Sulfuris coctio	130
Sertula Campana 68	Sycomori succus	104
Serum 101	T	
Seri lactis optimæ notæ	T Amarindi	104
ibidem	Tamarindorum adul	
Sigillum Mariæ 44	teratio	ibid.
Sinapi 101	Tamarindorum conservatio	ibid.
Sinapismus quomodo fiat	133	
134	Terebinthina	ibid.
Sinapismus quibus utilis fit	Terebinthina quomodo u	
134	ratur	105
Sinapismus quibus uitadus	Terra Ampelitis	ibid.
fit ibid.	Terra Chia	ibid.
Solanum hortense 101	Terra Cimolia	ibid.
Sori ibid.	Terra Eretrias	ibid.
Sori coctio 130	Terra Lemnia	106
Spartion 102	Terra Melia	ibid.



# INDEX.

Terræ omnis electio	106	Tithymalus Cyparissius	
Terræ Selinusia	ibid.	ibidem	
Terræ cuiuslibet coctio	139	Tragacantha	111
Thapsia	107	Tragos	ibidem
Thapsiæ coctio	131	Tragoriganum	ibidem
Thus	108	Turpet	ibidem
Thuris fuligo	109	Tripoliij dosis	112
Thuris cortex	ibidem	V	
Thuris lachryma quomodo emplastra igrediatur	128	Veratrum album	113
Thuris manna	102	Veratri albi dosis	113.
Thymelæa	110	¶ 114	
Thymelææ modus, siue do sis	ibidem	Veratrum nigrum	114
Thymus	111	Viole succus	115
Thymu dosis	ibidem	Vipera	ibidem
Tithymalus Characias	106	Viscum	116
Tithymalus Paraluis	107	Vlceris canii curandi ratio	
Tithymalus Helioscop. 1b.		171. & seq.	
		Vnguis odoratus	116
		Vnguentorum coctio	131

# FINIS.



# Apparatus, & delectus

SIMPLICIUM MEDI-

CAMENTORVM.

Quo tempore, quibus locis stirpes  
legere conveniat.

EX PRAEFAT. DIOSCORIDIS.



IN PRIMIS curam impene-  
dere oportet, ut suis temporibus  
singula & demetantur & recon-  
dantur. certe pro horum ratione  
aut ualeat uiribus, aut euasido nul-  
loq; munere funguntur. Scire

na igitur caeli constitutione deme-  
tenda sunt. Magni siquidem refert inter colligendum, si  
uel squalores uel imbres infesti sint: quemadmodum si lo-  
ca, in quibus prodeunt, cliuosa, & uentus exposita sint &  
perflata, frigidaq; & aquis carentia. in his enim locis ui-  
res eorum longe ualidiores intelliguntur. Contra, quae  
in campestribus, riguis, & opacis, ceterisq; locis a uen-  
to silentibus enascuntur, plerumq; degenerant, & minus  
uiribus ualent: multoq; magis, si non suo tempore, nec op-  
portunè colligantur, aut si per imbecillitatē intabuerint.  
Neque ignorandum, saepe pro peculiari loci natura, aut  
anni clementia, maturius aut serius adolefcere. Nonne

bis anno florifera. Quare cui in animo est horum peritiam assequi, necesse est eum prima germinatione solo emergentibus, adultis, & senescentibus adesse. Nam qui pullullanti herbe duntaxat astiterit, adultam cognoscere non potest: neque qui adultam tantum inspexerit, nuper erumpentem noscet. Quò fit ut propter mutatam foliorum faciem, caulium proceritates, florum seminisq; magnitudinem, & id genus alias peculiares notas, nonnulli qui olim has rerum uarietates non perspexerunt, magno in errore uersentur. Quæ causa etiam nonnullis scriptoribus imposuit, qui herbas quasdam, uerbi gratia gramen, quinq; folium, & tusilaginẽ, emittere florem, fructum & caulem negant. Ergo qui sæpius ad uisendas herbas & earum natales se contulerit, earum cognitionem maxime consequetur. Scire etiamnum cõuenit, sola ex herbaceis medicaminibus ueratri genera, nigrum, inquam, & candidum, multis edurare annis: reliqua à trunatu inutilia. Quæ uerò fruticosa sunt, sicut stœchas, trixago, polium, abrotonum, scriphum, absinthium, hyssopum, & alia id genus semine prægnantia demetantur.

Flores quoq; antea, quàm spõre sua decidant. Fructus autem, ut maturi decerpantur necesse est. Semina, ubi siccari cõperint, priusquàm defluant. Herbarum succus, & foliorum elici debet, germinantibus tum primum cauliculis. Lac & lachrymæ excipiantur, inciso per summum adolescentiæ uigorem caule. Radices, & liquamenta, corticẽsue ut recondantur eximere conuenit, cum herbe suis folijs exuuntur. Siccantur etiã expurgatæ inibi, locis asperginem non redolentibus: sed  
que

quæ luto aut puluere sunt oblitæ, aqua elui debēt. Flores & omnia quæ iucundum odorem efflant, arculis liaceis, nullo situ obductis reponantur. Nonnunquam charta aut folijs semina, ut perennent, aptè inuoluuntur.

Liquidis medicaminibus densior materia argentea, uitrea, aut cornea cōuenit. Fictilis etiam, si modò rara non sit, accōmodatur: & lignea, præsertim è buxo: sed ænea uasa ocularijs medicamentis liquidisq; & omnibus ijs, quæ aceto, pice liquida, aut cedria cōponuntur. Adipem autem & medullas stagnans uasis recondi conuenit.

A



**A**BSINTHII existimatur li= Absinthium. quantulum herbae eosdem præstare effectus. Attamen potionibus improbat, quoniam stomachum malè habet, & capitis ciet dolorem. Sunt qui cocta amurca liquamentum adulterant. Diosc.

Dosis. Eius decoctum, aut madesacti dilutum, seu, ut dosis abundicitur, infusio sumitur Mesue ab uncijs quinq; usq; ad thij. octo. Puluis à drachmis duabus usq; ad drachmas tres. Et succus à drachmis tribus usq; ad quatuor. Sed hic, ut diximus, inutilis stomacho capitiq; est. Eligendum est delectus. uulgare, quod generis appellatione Absinthium nuncupatur. Reliquæ enim species stomacho aduersantur. Atque illud folia candida, læuia & plana habeat, & longè à mari sit semotum, atq; in solo libero crescat. Mesue.

**Acacia.** ACACIA in Aegypto nascens, habet semen lupino simile in folliculis. ex quo succus expressus siccat in delectus. umbra, niger ex maturo semine, subrufus ex uiridi. Eligatur modicè rufus & odoratus, ut in hac arbore esse potest. Aliqui exprimunt ex folijs & semine succum. Manat & gummi ex ea spina. Lauatur oculorū medicamentis, trito in aqua, mox effuso quod concreuerat, donec pura extet aqua. & ita cogitur in pastillos. Vritur etiam in cruda fidelia, donec fictile fornacibus percoquatur: torreturq; in carbonum balitu perflata. Praefertur eius spinæ gummi, quod in uermiculorū speciem contrahatur, & uatri modo perluceat, ligni expers. proximum est candidum. sordidum uerò ac resinosum, inutile. Alterum ACACIAE genus in Cappadocia Pontoque prouenit, Aegyptiæ spinæ similitudine, uiribus iam dicto inferius. Diosc.

**Acorum.** ACORVM optimum est densum, candidum, plenum carie, non exesum, odoratum, cuiusmodi Colchidicum & Galaticum, quod afflection dicunt. Diosc.

**Adeps.** ADEPS anserinus aut gallinaceus recens & sine sale conditus, ad uulnū uitia proficit. sale inueteratus, & qui temporis spatio acrimoniam concepit, uulnū ininuitus est. Recens exemptus membranis in fictilem ollam demissus, quæ altero tantopere capacior sit, quantus sit modus adipis, quem curare institueris, obstructo diligenter uase, flagrantissimo soli exponitur. eliquesens inde humor in fictile alterum excolatur, donec adeps omnis absumatur. mox loco uehementer frigido reconditur. & ad usum digeritur. Alij fictile fulciunt super aquam calidam,

dam, aut tenuem & elanguidam prunā, quæ solis uicem  
 penset. Est & alia curandi ratio: Exemptis membranis  
 teritur, coniectusq; in ollam eliquatur, adiecto minuti  
 salis momento. mox lineo colo transfusus reponitur. Vi-  
 liter in medicamenta additur, quæ lassitudines & sati-  
 gationes leuant. Suillus adeps & ursinus hoc curantur  
 modo: Recens, præpinguis, renibus potissimum detra-  
 ctus, in largiore aqua cœlesti & quàm frigidissima, ex-  
 emptis tunicis, diligentissimè manibus confricatur, &  
 exprimendo fermè siccatur, subindeq; noua aqua ablu-  
 tur. cæterum fictili capacitatis duplæ inditus, in aquam  
 demergitur, & subditis leuib; prunis spatha mouetur:  
 eliquatusq; colo transfunditur in aquam. ubi uerò refri-  
 xit, & guttatim aquam omnem exclusit, in prælotum fi-  
 ctile demittitur, & infusa aqua leniter eliquari debet, &  
 manu deprimi, quò facilius faculentum uirus pessum-  
 eat. postea in pilam spongia madefactam transfunditur.  
 ubi coire coepit, residens in imo sordes eximitur. tertio  
 citra aquam eliquatur, repurgatusq; fictili bene opercu-  
 lato, perquàm frigidis locis reponitur. Hircinū sciūm,  
 ouillum, ceruinumq; ita curato: Elotum ex his quodcun-  
 que, tunicis, ut in suilli mentione dictum est, exemptis, pi-  
 le emolliendum tradito, ac manibus fricato, affusa pau-  
 latim aqua, donec ne amplius quidem cruentū uirus ex-  
 cernatur, aut pingue aliquod innatet, sed nitida spectetur.  
 deinde in ollam fictilem conijcito, & adiecta aqua  
 ut superemineat, leui pruna liquefacito, & moueto; at-  
 que in aquam colato. cumq; refrixerit, iterū in loto ficti-  
 li eliquato, & quæ antè diximus facito. tertio sine aqua

liquefactum, in perfsam liquore pilam colato, refrige-  
 ratumq; , ut in fuilli ratione diximus, recõdito. Bubulum  
 autem seuum, renibus maximè detractum, exemplis mem-  
 branis, aqua marina ex alto petita eluendum est: mox in  
 pila tundendum diligenter, affusa maris aqua. cum uerò  
 dissolutum fuerit, in fictilem ollam conijciendum, & ma-  
 rina aqua, quæ non minus dodrante superemineat, pro-  
 luendum. decoquendum donec omnis aboleatur odor,  
 additis ad singulas seui Atticæ minas, quaternis Tyr-  
 rhenicæ ceræ drachmis. excolatumq; , detractis quæ pos-  
 sum ierant sordibus, in nouo fictili reponendum. oper-  
 tumq; soli interdum credendum, ut ad candorem reduca-  
 tur, & odoris uirus euanescat. Priuatim taurorum pin-  
 gue sic curari debet: Renibus euulsum pingue profiuen-  
 te annis aqua abluito, detractisq; tunicis, fictili nouo,  
 postquam exiguum salcem insperferis, liquefacito. dein  
 in nitentem aquam excolato: & ubi concrefcere cepit,  
 manibus iterum confricando uehementer lauto, aqua se-  
 pius infusa refusaq; , donec quanoptimè elotum uideat-  
 ur. rursus in olla cum pari modo uini odorati decoqui-  
 to. & cum iterum efferbuerit, dempto ab igni uase, ibi-  
 dem siuito pernoctare. postidic si grauitur adhuc oleat,  
 noua olla repetitum, uino odorato perfundatur. eadem  
 quæ prius fiant, dum omne uirus euanescat. Colliquatur  
 & sine sale, præsertim affectionum earum causa, quibus  
 sal aduersari solet. sed ita paratum non magnopere albe-  
 scit. Eodem modo pardorum ac leonum pingua curari  
 oportet. Taurinum autem & uitulinum pingue, necnon  
 ceruinum, atq; etiam huius animalis medulla, odorem

tis imbuitur, hac ratione : Pingue quod odoratum reddi debet, demptis, quo diximus modo, membranis, clotum & uino quamodoratissimo nulla matris aqua diluto feruefactum, pernoctare sinitur, alterum id genus uinū eadem mensura infunditur, colliquatur, & exquisitè colatur. nouemq; eius heminis, iunci Arabici septē drachmæ adijciuntur. Quòd si ipsum odoris fragrantioris fieri uoles, quadraginta floris eiusdem drachmæ, cum paribus palmæ, calami, & casie modis adduntur, & xylobalsami, aspalathi singulæ drachmæ, cinnamomi, cardamomi, & nardi, singulæ uncie. omnia exactius tunduntur, & affuso uino odorato, in uase operto, quod supra carbones firmiter collocatum sit, ter effervereunt, & semoto ab igni uase inibi pernoctant. postridie uinum effunditur, aliudq; generis eiusdem adijcitur. ter simili modo bene conseruescat, deinde matutinis exempto adipe uinum effundatur: & abluto uase, si quid imo subsidens hæsit, detergatur. postremò eliquatum pingue & excolatum, ad usus reconditur. Hoc autem modo odoramentis imbuitur, quod antea curatum est. uerum antè dicta prius inspissari solent, quò facilius sibi odoramentorum uires adsciscant. Itaq; assumens quodcunq; horū uoles, cum uino feruefacito, impositis unā myrti ramulis, serpillio, cypero, item aspalatho plenius tuso. aliqui tamen ad hunc usum, uno duntaxat horum contenti sunt. cum autem ter efferverit, exemptum leniter, & linteo colatū, aromatis, uti expositum est, imbuitur. Adipibus spissamenta sic fiunt (quemcunq; acceperis, oportet ut recens tundatur) Sincerus & sanguinis expers adeps, reliquas



habens notas quas sepe retulimus, in ollam nouā demit-  
 titur, infuso uino albo, uetere, odorato, quod semipedis  
 altitudinem superet. lento igni seruescat, dum uernacu-  
 lus odor aboleatur, planēq; uinum redoleat. at ubi depo-  
 sito uase refrixit, duæ adipis minæ in ollam mittuntur,  
 & duo uini eiusdem sextarij, & seminis loti, eius inquā  
 cuius è ligno ludicæ tibie factitantur, tusi minæ qua-  
 tuor adijciuntur. lento igni subinde miscendo decoquun-  
 tur. cumq; odoris uirus euinuerit, excolatusq; adeps re-  
 frixerit, una contusi aspalatbi mina, cum amaracini flo-  
 ris minis quatuor, & uetere uino subigitur. nocte una  
 hæc odorem rapiunt, combibunt. postridie in fictilem  
 ollam tricongialem ea omnia cum adipe iniecta, additis  
 sextarijs tribus uini, unā seruescunt, quousq; & uim &  
 odorem spissamentorum adeps ipse contraxerit. qui eli-  
 quesceus colatur, & reponitur. Quod si maiorem odo-  
 ris fragrantiam efflagites, drachmas octo quam pinguas-  
 simæ myrrhæ uino macerate, quod multos in annos as-  
 seruatum est, misceto. Gallinæ accuserimusq; sic odo-  
 ribus imbui solent: Cuiusuis eorum percurati sextarij  
 duo fictili olla excipiuntur. crysiceptri, xylobalsami,  
 palmæ elatæ, & calami planē contusi, singulorum ses-  
 uncia admiscetur. uini Lesbij ueteris cyalbus unus ad-  
 ijciatur. ea ter effervescent prunis. mox uase sublato ab  
 igne die noctuq; refrigerantur. postridie liquata per lin-  
 teum crassum mundum in uas excolatur. ubi uero adeps  
 coierit, concha excipitur, fictiliq; nouo densius operito  
 per frigidis locis reponitur. Hyberno tempore id insti-  
 tuere oportet. æstate siquidem pingua non coguntur.



Nec desunt qui Tyrrhenicæ ceræ momentum adijciant, quò facilius in unum corpus omnia coalescant. Eadem ratione suillus adeps & ursinus cæteriq; id genus, odoramentis imbuuntur. Verum sampsuchi odorem adeps ipse repræsentabit hoc modo: Curati quæmoptimè adipis, præsertim taurini, mina una, tempestiuq; sampsuchi exquisitè confracti sesquimina miscentur, & insperso largiore uino digeruntur in offas, quæ in uase cooperito nocte quiescunt. matutinis in fictili olla leuiusculo igni, affusa aqua leuiter coquuntur. dumq; suum adeps odorem exuerit, defecatus ac bene operatus, nocte tota permanet. postero die deterfa sorde quæ pessum ierat, sampsuchi, ut dictum est, confusi iterum sesquimina priori pastillo adijcitur, eodemq; modo in offas cogitur. alijs quæ diximus peractis, decoquitur & colatur. & si qua fundo hæsit spurcitia, deraditur, & frigido loco reconditur. Si quis tamen incuratum adipem anserinum, gallinaceum, aut uitulinum, à putredine tueri uelit, ita faciendum est: Quemuis adipem diligenter elotum & siccatum in umbra super cribrum per lintea munda manibus uehementer exprimat, linoq; consutum umbroso in loco suspendat. & post multos dies noua charta inuolutum, frigido loco recondat. Pinguia autem indito melle uindicanur à putredinis uitio. Diosc.

AERIS FLOS, quem nonnulli clauorum ueterum Aeris flos. psegina, quasi resegmentum aut segmentum, nominauerunt, optimus est friabilis, in atritu fuluescens, milij effigie, & numero, breuis, pōderosus, modicè splendens, atq; constringens, qui delumatam æris scobem non recepit, qua sæpe

adulteratur. Sed id facile deprehēditur, cum dentiū illi-  
su, dilatantur ramenta. Fit autem, cum æs fornacibus su-  
sum, in receptacula delabitur, per cola fistularum ad ea  
pertinentium. tum huic negotio additi ministri, sordes  
expurgantes, aquam clarissimam infundunt, refrigeran-  
di proposito. Itaq; repentino concretu, ac addensatione,  
uelut expuitur, & erumpit antedictus flos. Diosc.

Aeris squam-  
ma.

AERIS SQUAMMA excussa ex Cypris officina  
ruan clauis, crassa quidem ipsa præstator quæ helitis, id  
est clauaris, nominatur. sed ex uili promiscuoq; ære, aut  
candido, uitioso intelligitur. Quam, utpote tenuē & in-  
uolidam, dānamus, maximē approbātes crassam, rufam,  
præsertim si aceti resperfu æruginem cōtrahat. Laua-  
tur hoc modo: Siccæ aeris squammæ expurgatæ selibra,  
cum nitida aqua in mortario manu diligenter conturbat-  
tur quousq; pessum ierit. abijciatur quod subsidit, & es-  
fusa aqua, hemina cœlestis umbris adijciatur, & distenta  
manu, squamma, quasi destringenda sit, uehementer con-  
fricatur. dumq; lentorem emittere cœperit, aqua sensim  
ad sex heminas usq; superinfunditur, terendo ualidé.  
squamma ad latus mortarij colligitur, ibiq; apprimitur.  
quo factō, expressus humor pyxide ex ære rubro facta,  
excipitur. hoc est enim uelut flos squammæ, ualens uiri-  
bus, & ad ocularia medicamenta cum primis efficax.  
Inutile imbecillūq; quod superest, lauatur donec nullā  
prorsus lentiliam excernat, & linteo opertū biduo con-  
quiescere sinitur, effusq; extante aqua, ubi siccatum  
erit, reconditur pyxidicula. Alij ut cadmian lauant, &  
reponunt. SQUAMMAE ex acie, aut micronibus de-

cussæ,

cuisse, quam uocant stomoma, eadem uis. Lauatur modo simili, & reconditur. Sed ad moliendam alui deiectionem inefficacior est. Diosc.

AES VSTVM probatur rubrum, & quod contritu Aes vstum.  
colore cinnabarim imitetur. nigrum uero, plus quam de  
ceat, exustum est. Fit autem è clauis solutarum nauium,  
fictili crudo cōpositis, subperso sulphure cum sale pari,  
omnibus uicissim insparsis, fictile, circumlito figulari cre  
ta spiramento, fornacibus inditur, donec figlinum perco  
quatur. Quidam pro sulphure & sale alumen inspar  
gunt. Alij sine sulphure ac sale, fictili multos dies urūt.  
Alij sulphure solo utuntur, fuliginem tamen excutiunt.  
Alij oblitos scissili alumine clauos, cū sulphure & ace  
to, fictili crudo cremant. Alij in ænea olla aceto resper  
sos, urunt, & iterum ac tertio idem efficiūt, postea recon  
dunt. Principem locum tenet in Memphide combustum,  
proximū in Cypro. Lauatur ut Cadmia, mutata qua  
ter die aqua, donec nulla prorsus sordes emergat.

AERIS SCORIA, id est, recrementū eodem modo Aeris scoria.  
lauatur, & eandem uim sed imbecillitorem habet. Diosc.

AERUGO rafa fit ijs modis: In cadum aut aliud con Aerugo  
simile uas acetum quamacerrimum infunditur. superpo rafa.  
nitur inde inuersum æneum uas, præsertim concamera  
tum: sin minus, planum. sitq; obstructum, nullumq; ha  
beat spiramentum. exempto, quo doliolum obturaueris,  
operculo decimum post diem, insidens ærugo deraditur.  
Aut æris lamina in cadis super acetum ita suspenditur,  
ne ipsum attingat, & totidem post dies raditur. Aut mas  
sula æris, aut lamina una plures ue, uinaceis non recen  
tibus,

tibus, sed iam acscenctibus cōduntur, & simili modo uer-  
 santur. Quinetiam ex delinata aris scobe æruginem fa-  
 cere licet. nec non è laminis, quibus bractæ auri conclu-  
 sæ malleo ducuntur: si quis eas aceto respargat, & iter  
 aut quater uerset, donec æruginem contrahant. Tradunt  
 æruginem in Cyprijs metallis gigni, lapidibus quibus-  
 dam nonnihil aris habentibus, quibus ærugo efflorescit.  
 adduntq; per caniculæ æstus, è quodam specu manare:  
 sed illam paucam & optimam esse: hanc speluncis ef-  
 fluentem, copiosam quidem, & boni coloris, sed uitio-  
 sum, quòd lapides multos collegerit. Pluribus autem mo-  
 dis adulterant. aliqui punice admixto, alij marmore, alij  
 atramento sutorio. Sed deprehēdemus pumicem aut mæ-  
 mor, dum pollice sinistræ manus madefacto, æruginis  
 portiunculam altero atterimus. siquidem eam diffundi  
 constat. marmoris autem pumicisq; partes, coeunt non  
 dissipate, demumq; translatione crebra & humoris com-  
 plexu dealbescent. quin & dentium appressu. siquidem  
 sincera cedit, leuis, & sine asperitate. Atramentum ue-  
 rò sutorium igne coarguitur. namq; si fictile, aut lami-  
 na, adulterata ærugine illinatur, & feruenti cinere aut  
 carbonibus incalcescat alterutrum, mutabilior, rubescetq;  
 id quod atramentum sutorium acceperit: quòd idustum  
 suapte natura talem sortitur colorē. Aæruginis quæ  
 uocant scoleciæ, duo sunt genera. quedam fossilis est.  
 altera factitia ad hunc modum: In mortario Cyprij aris  
 dimidiam heminam aceti albi acrisq; pistillo cupreo con-  
 terito, donec strigmenti crassitudinem imitetur. deinde  
 aluminis rotundi drachmam unam, cum salis fossitij,  
 translu

translucentis, aut marini quàm albiſſimi, ſolidiſq; , aut cer-  
 te cum nitri pari pōdere terito in ſole, æ ſtuofiſſimis die-  
 bus, ſub ſyduſ caniculæ, donec colorem æruginis cōtra-  
 hat, & concretu ſtrigmentofum fiat. ubi autem ſe in uer-  
 miculorum Rhodiaciſ ſimilium ſpeciem cōgērit, recon-  
 dito: Efficax & ualde boni coloris redditur, ſi duas par-  
 teis urinæ ueteris, cum una aceti adieceris, & alia, quæ  
 dicta ſunt, peregeris. Sunt qui æruginem raſilem, quæ in  
 apparatu non reſpondit, gummi miſto digerant in for-  
 mas, & ita uendant. quod genus, ut uitioſum, improba-  
 tur. Fit & quædam ærugo ab aurificibus, mortario &  
 piſtillo Cyprij æris, cum urina pueri impubis, qua aurū  
 ferruminant. Antedicta æruginum genera, uſto æri o-  
 mino reſpōdent, ſed magis effectū ualent. Sciendum ſoſi-  
 lem ſcolecīa præſtantiſſimā eſſe: de raſam ſequi: poſtre-  
 mo loco factitiā. mordaciſſima tamen eſt hæc, & magis  
 adſtringens. aurificū autē ærugo raſæ reſpondet. Dioſc.

AGARICI duo genera. fœmina, quæ præfertur, Agaricum.  
 rectus intus uenarum diſcurſibus conſtat. mas rotundus  
 eſt, & undiq; compactior. Vtriq; guſtus in initio dulcis,  
 mox in amaritudinem tranſit. Gignitur in Sarmatiæ re-  
 gione, quæ Agaria dicitur. Dioſc. Agarico fœminæ  
 quinque has præcipuè dotes ex ſapientum opinione tri-  
 buit Meſue, nempe ut ſit albus, læuis, friabilis, admodū  
 rarus. Paulus eligendum conſulit albiſſimum, quod delectus.  
 facillimè frangatur, nec ſit ualde lignoſum, aut perfora-  
 tum. Noſtri quoq; pharmacopolæ unum bonitatis indi-  
 cium eſſe affirmant in Agarico, cū eſt friabile. Dioſc. Dioscorides.  
 ſcorides tamē infirmum illud Agaricum eſſe dicit, quod  
 friab

friabile est. Cuiusmodi esse adfirmat, quod in Galatia & Cilicia in cedris gignitur. Leuissimum, optimum: densum, graue & lignosum, deterrimum lib. de Antidotis Gal. Mari pariter & fœminæ commune est, ut in primo dosi. gustu dulce appareat. Contriti Agarici potio est Mesue à drachma una usq; ad duas. Eiusdē uero decocti seu infusionis (ut loquitur) dosis est eidem à drachmis duabus usq; ad quatuor. Datur obolis quatuor contritū, Plinio, ex aceto mulso. Aëtius drachmas duas ex oxymelte uel melicrato propinat. Dioscor. modò obolos duos, modò tres: modò drachmā unā, modò duas exhibet, pro uiribus, ætate, & morbi ratione: nunc ex aqua, nunc ex uino: his ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsæ. Mesue.

Alcyonium. ALCYONII quinque esse genera compertum est. unum enim spissum, acerbi saporis, spongiosa facie, item tetri odoris, ponderosum, & piscem olens, quod plurimum in litoribus inuenitur. alterum pinnulæ oculorum aut spongiæ simile, fistulosum, & leue, odorem algæ referens. tertium uermiculi forma, & colore magis purpureum, quod Milesium quidam uocant. quartum succidis uelleribus non dissimile, multis inanitatibus hians, leue. quintum figura fungi, sine odore, asperum, parte interna quodam modo punicosum, foris læue, acre. quod plurimum in propontide iuxta insulam Besbicon appellatā gignitur, patrio nomine halos achnen uocant. Si quisquā alcyonium cremare uelit, cum sale in crudum fictile mitat, & oblinens uasis spiraculum luto, ita fornaci mandet, & cum figlinū percoctum fuerit, extrahens ad usus recondat. Lauatur, ut Cadmia, Diosc.

**A L O E** plurima præpinguisq; in India gignitur, ex Aloë.  
 qua coactus succus adfertur. Nascitur etiam in Asia &  
 Arabia, in locis quibusdam maritimis: & in insulis, ut  
 in Andro, non ualde succo extrahendo idonea, sed ad  
 glutinanda uulnera sanè quàm utilis, si detrita illinatur.  
 Duo succi genera. quoddam arenosum, quod sedimentū  
 purissimæ esse uidetur. alterum ad iocineris imaginem  
 uergit. Eligi debet boni odoris, syncera, quæ nihil delectus.  
 doli sensit, nitida, calculorum expers, rufi coloris, friabilis,  
 ac iocineris modo coacta, facile liquefscens, eximie  
 amaritudinis. improbatum nigrum & fractu contumax.  
 Gummi eam adulterant. quod deprehenditur gustu, amaritudine,  
 & ualido odore. eoq; argumento, quod digitis  
 friata non ad minima usq; frustra resoluitur. Nec desunt  
 qui acaciam immisceant. Oculorum medicamentis torretur,  
 in munda & candenti testa, pennaq; subinde uersatur,  
 ut possit æqualiter torreri. Lauatur, ut quod sit arenosissimum,  
 tanquam inutile subsidat, & leue ac pinguis-  
 simum assumatur. Diosc.

**Optima Aloë censetur,**

Pinguis.

Nitida, splendida ac syncera.

Calculorum expers, Diosc. & Aëtio. hoc est  
 non lapidosa aut arenosa.

Iocineris modo coacta. Diosc. densa Aëtio.

Iocineris colore & subfulua, Aëtio.

Rufi coloris, Diosco. aliàs subflaua.

Facile liquefscens, seu humescens.

Friabilis.

Odorata.

Eximie amaritudinis. id est, amarissima.

Optimæ aloë  
 es notæ.



Saporis etiam parum astringentis, Galeno.

Nigram duram, fractu contumacem, tanquam improbam atque inutilem rejicito.

**Dosis.** Dosis Aloës in substantia Mesuæ est ab aureo uno ad drachmas duas. Macerata uerò Aloës portio eidem est ab aureo uno usque ad drachmas tres. Aëtius drachmas duas Aloës exhibet cum mēlicrato, uel tres aut quinque pilulas, citrij uel brassicæ succo exceptas, magnitudine cicercis, his qui ea opus habent. Aliqui à drachmis duabus ad quatuor exhibent. Mesuæ.

**Alumen.** Omne ALUMINIS genus ferè in Aegypto, & in eisdem metallis inuenitur. etenim scissile quoddam, quasi flos glebosi intelligitur. Gignitur & in alijs quibusdam locis, in Melo, in Macedonia, in Liparis, Sardinia, Hierapoli Phrygiæ, Aphrica, Armenia, & plerisque alijs regionibus, sicut & rubrica. Plurimæ eius species. uerian ad medendi usum, scissile, rotundum, & liquidum expetuntur. Optimum est scissile, præsertim recens, candidissimum, gustu perquam adstringens, graue olens, calculorū expers, nec glebulose aut assulose compactum, sed sigillatim in capillamenta quædam canescētia dehiscens, quale est quod trichites, quasi capillare nominatur, in Aegypto natum. Reperitur quoque lapis huic alumini persimilis, qui gustus iudicio dignoscitur, quod non adstringat. Damnatur in rotundi genere, quod manu confectum est. sed ex figura deprehenditur. Assumendum autē suapte natura rotundum, bullis turgens, albo propius, atque ualidius adstringens, præterea nonnihil palloris cū quadam pinguitudine præ se ferens, sine arenis, friabile, natione



ione Aegyptium, aut ex insula Melo. Liquidi probatio, ut sit lymphidum, lacteum, æquale, & semper succo madens, sine lapidibus, atq; quendam coloris igniculum expirans. Diosc.

AMMONIACVM serulæ succus est, quam iuxta Cy Ammoniacū reuen Aphrica gignit. cuius fruticem cum radice agassolim uocant. Probatur bene coloratum, ligni & calculorum expert, thuris similitudine, minutis glebis, densum, syncrum, nulla sorde spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. hoc genus thrausma, id est friaturan, appellant: quod uero terram & calculos collegit, phyrana. gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, succum stillante serulacea arbore. Diosc.

AMOMVM exigue fruticat, ex ligno se conuoluens Amomum. in racemum modum: flore, ceu candidæ uiolæ, paruo: folijs uitis albæ similibus. Laudatur quammaxime Armeniacum, fuluo auri colore, ligno subrufo, ualde odorato. Medicum, quoniam in campestribus & aquosis enascitur, infirmus esse constat. Est autem magnum, subuiride, tactu tenerum, frutice uenoso, odore origani. Ponticum uerò subrusum, paruum, fragile, racemosum, fructu turgens, & odore nates feriens. Deligito recens, selectio. candidum uel subrubrum, quod nec astrictum cohercat, nec conuoluatur, sed solum diffundatur, seminis plenum, uuis paruis simile, graue, odoratum, modò cariem non cōtraxerit, acre, gustu mordens, simplici colore non euariante. Adulteratur herba amomo simili, quæ Amomus uocatur, sed sine odore, sine fructu. Nascitur in Armenia, flore origani. Quare in huiusmodi probatio

nibus fragmenta fugienda sunt: eligenda autem, quæ ab una radice integros furculos emittunt. Diosc.

**Amurca.** AMURCA expressæ oliuæ recrementum est. decocta in cupreo uase ad crassitudinem mellis adstringit, cæteros præbens lycii effectus, insuperq; alios. Diosc.

**Amygdales dulces.** AMYGDALAE dulces cibo idoneæ: sed multo minus ualent in remedijs quàm amaræ. Diosc.

**Amylum.** AMYLUM ex eo appellatū est, quòd sine mola fiat. Optimum ex trimestri, natione Creticum aut Aegyptiū. Ratio faciundi amyli hæc est: Purgatum trimestre triticum madescit quinquies die, & si fieri potest, nocte. cum emollitū fuerit, effunditur sensim, siue agitatione, aqua: quò minus cremor utilis unā excludatur. ubi mollissimū esse uidetur, mutata aqua pedibus calcari oportet. rursus infusa, tertio demum enatantes ibi furfures in cereniculo eximendi. reliquūq; quallo sportisq; siccātū tegulis nouis confectum torreatur flagrantissimo in sole. namq; si paulisper udum maneat, acorē concipit. Fit etiā amyliū ex zea, quæ maceratur, ac eluitur uno aut altero die, & subactæ farinæ modo manibus subigitur. pressaq; feruentissimo in sole, ut antè retulimus, exiccatur, nullius in medicina usus. ad alia tamen cōueniens. Diosc.

**Anisum.** ANISVM melius semper recens, plenum, non furfurisum, odore præstans. inter prima laudatum est Creticum, proximo loco Aegyptium. Diosc.

**Aqua.** De AQUIS in uniuersum decernere, propter locorum proprietates, & peculiâres naturas, cœlum, & alia pleraque, difficile est. Magna tamen ex parte optima est dulcis, sincera, nullius omnino qualitatis particeps. & que

que ne minimo quidem tempore in præcordijs cōmoratur. ad hæc, quæ & facili uia fertur, & citra molestiā, nec inflationes creat, & minime computrescit. Diosc.

ARGENTI spuma quædā gignitur ex arena, quam Argenti spuma molybdiū uocant, in fornacibus conflata, donec perfecta sit. Sic igni incandescat. altera ex argēto. tertia ex plumbo. Probatissima est Attica. secunda Hispaniensis. has sequitur quæ sit Dicæarchiæ, id est Puteolis, Baijs, in Campania, & Sicilia. plurima enim hisce locis est flagrantibus laminis plumbis gignitur. Quæ flauo colore splendet, chrysitis appellatur omnium optima: quæ in Sicilia, argyritus: quæ ex argento, calabritus. Vritur argenti spuma, confractis partibus ad magnitudinem iuglandiū, prunæ superpositis: ita accensa follibus, ut conflagret, abstergitur insidens spurcitia, & reconditur. Aliqui ter aceto aut uino restinguētes, rursus urunt, & eadem prosequuti, reponunt. Lauatur ut cadmea. Ut argyritidi nominata, aut, si desideretur, alteri candor detur, ea in partibus magnitudine fabarum confracta, chœnicis atticæ mensura, si cili nouo superfusa aqua, addito candidi tritici pari pōdere, priuatimq; pugillo hordei, linteolo puro, raro, ansulis uasis alligato, coquitur, donec hordeum fractum dissiliat. deinde omnia in nouū craterem oris ampli trāsfunduntur. triticum abiicitur. spuma argenti uehementer manibus affricando infusa aqua lauatur, assiccataque in Thebaico mortario teritur, affusa feruente aqua, donec soluta fatiscat. excolata aqua, iterum tota die teritur, & uesperis infusa calida aqua finitur. mane colis excernitur, alia infunditur, atque ter die excolatur. id septem diebus

fieri solet. postea additis ad singulas minas spumæ argenti, quinis salis fossilis drachmis, infusaq; calida aqua, ter die teritur, & addita aqua excolatur. cumq; in albutil, calida infusa, idem facito, dum nullam prorsus salsedinē respiciat. demum ardentissimo sole siccata: eiecto prius hu more, reconditur. Sin minus, muna spumæ argyritidis diligenter teritur, addito sale fossili trito, triplicato pondere, in fictile nouum coniecitur, aqua infunditur, ita ut superemaneat. mouetur quotidie mane & uesperis, aquaque superinfunditur, priore nequaquam effusa. hoc fit triginta diebus. namq; nisi moueatur, crassescit, usq; in duritiē testæ. Post hæc effusa leniter muria, in Thebaico mortuario spuma argenti teritur, coniectaq; in fictile aqua continens, manibus diligenter agitur, mutata subinde aqua, donec nullum salsuginis indicium præbeat. deinde quod ex argenti spuma candidum apparet, in uas aliud transfertur, & redactum in pastillos, plumbea pyxide conditur. Alij spumam argenti in fabarum magnitudines confractam, in uentre suillo crudo ex aqua coquunt, dum iuscus eliquescent, contabescat, exemptanq; cum sale pari terunt, & ut supra dictum est lauant. Sunt qui salis libram unam, & spumæ argenti tantundem, in sole terat, aqua continuè mutata, dum candor ei detur. Aliaratio: Sumito quantā uis argenti spumam: ubi lana candida inuolueris, fictili nouo indita aqua, cum pugillo fabarum recentium repurgatarumq; decoquito. Cumq; fabæ disruptæ dehiscant, lanāq; non denigretur, exemptā argenti spumam, & altera lana inuolutā, iterum coquito, cyathum aquæ & parem fabarum modum adiciens. eadem

tertio,

tertio, quæ suprâ, facito. in summa, tantisper, dum Luna iam non inficiatur. Insuper transfundens in mortarium, ad singulas salis fossitij libras, adijcito octogenas spumæ argenti drachmas Atticas, & terito: intermittensq; nitri quimalbissimi cum aqua diluti drachmas quadraginta septem indito. iterum terito, donec satis candoris contraxisse uideatur. ita autem fundens eam ex alto in fictile oris ampli, adiecta largiore aqua, ubi considerare desierit, colato. tum nouam superadiiciens aquam, manibus probe uersatam, finito ut confidat, ac rursus per colum traicito. alternis eadem proseguere, dum pura aqua dulcisq; effluat, & nullam falsedinem præ se ferat. postremo in fictile nouum translatur, colato sensim omni humore, soli quadraginta diebus, sub caniculæ sydus exponito, & siccata uitior. Enotam autem constat ad oculorum collyria prodesse, & ad cicatricum sceditates tollendas, ad rugosas facies, et cicatricosas, laceratasq; & macularum plenas. Diosc.

ARGENTVM uiuum fit ex minio, quod abusiue cinnabaris dicitur, patinis fictilibus, imposita ferrea concha cinnabarin cōtinente, & calice cooperta, argilla superlita, carbonibus succendunt. siquidem deterfa fuligo, quæ calici insidet, refrigerata in argentum uiuum coit. Quinetiam inuenitur in argenti fodinarum tectis, stillatum concretum. Alij per sese in metallis inueniri tradūt. Seruatur in uitreis, aut plumbeis, aut stagnéis, aut argenteis uasis. siquidem aliam materiam omnem exedit, & defluere facit. Diosc.

ARISTOLOCHIA RVM radices effodere messis Aristolochia

bus est tempestiuum, ita desquamato terreno seruan-  
 dolectus. tur. Quinque aut sex annos durant. Maxime cōmen-  
 datur Pontica, & in uno quoq; genere ponderosissima.  
 Quæ oblonga radice, tenuiori q; est, gratior habetur: car-  
 nosi enim est corticis, unguentis quoq; nardinis conue-  
 dosis. nientissime dicata. Dosis Aristolochiæ Mesuæ est, à  
 drachma una usq; ad aureum unum. Aëtius scribit Ari-  
 stolochiæ surculosæ exiccati drachman unam propi-  
 nat, ad bilem pituitamq; expurgandam. Mes.

Armenius la ARMENIUM optimum esse Plinius dicit, quod ma-  
 pis. xime uiret, communicato colore cum cœruleo. Dio-  
 scorid. laudat Armenium, qui sit leuis, colore cœruleo,  
 perquam æquabilis, calculo carent, & friabilis. Eadem  
 dosis Arme- que Chrysocolle præstat, sed inefficacius. Aëtius  
 nici lapidis. scrupulos quatuor eiusmodi lapidis offert. Alexander  
 illon scrupulos tres uel quatuor: loti uero quinque uel  
 sex exhibet. Vult autem ut quinquagesies abluatur. Ve-  
 rumenimvero tutius iuxta Galeni sententiam fuerit, to-  
 galeni docu- mentū de la- ties ipsum lauare, aquamq; tandiu mutare, donec pura  
 pidibus ablu- ab omni sorde uideatur, omniq; sapore medicamenti ca-  
 endis. reat. Quod Galeni documentum non tantum peculiari-  
 ter de hoc lapide à Pharmacopola accipiendum est, sed  
 in uniuersum de quauis re lapidosa quæ sit abluenda.  
 Cæterum nō loti potio est Mesuæ à drachma semis, usq;  
 ad sesquidrachman, loti uero à drachma una usque ad  
 drachmas duas. Mesuæ.

Asarum. ASARVM aliud instar albi Ellebori deiicit senis  
 drachmis potu ex aqua mulsæ. Eius autem infusionis po-  
 dosis. tio est Mesuæ ab aureis duobus, usq; ad drachmas qua-  
 tuor:



taor: & pulueris à drachma una usque ad ancos duos.  
Si autem ad exactum lenorem ac curiose teratur, magis  
per urinas purgat, quàm per alium. Idem auctor radi-  
cem hanc Asaron Græcis nuncupatâ, præfert quæ cras-  
sa & densa sit, iucundo odore, & sapore acri cum mo-  
dica stypticitate. Optimum autem Asarum, nasci ait Eleæio.  
Plinius in Ponto. proximum in Phrygia. tertium in Il-  
lyrico. Mesue.

ASIVS lapis assumi debet pumicis colore, lenis, fun-  
gosis, item friabilis, scissiles uenas lutei coloris ad inum  
actas habens. Eius flos, salsugo subflaua est, summo la-  
pide insidens, compage tenui, colore in aliquibus albo,  
in alijs pumici simili, ad luteum uergente. admotus lina-  
gæ aliquantū mordet. Lōgè ualidior est lapide. Diosc.

ASPALATHVS spinosus frutex nascitur in Istro, Aspalathus.  
Nisyro, Syria, & Rhodiorum insula. quo ad unguen-  
torum spissamēta unguentarij utuntur. Optimus est gra-  
delectus.  
uis, detracto cortice rubens, aut in purpuram uergens,  
densus, odoratus, gustatu amarus. Est & alterum genus  
candidum, lignosum, sine odore, quod deterius habetur.  
Dioscorides.

ATRAMENTVM quo scribimus, fuligine ē tedis  
coacta colligitur. in singulas libras grōmis, ternæ fuligi-  
nis uncie adijciuntur. Fit etiam ē resinarum & picioria  
fuligine, de qua paulo antè diximus. Assumitur autem su-  
lignis muna, gummis sesquilibra, glutinis taurini, atra-  
menti sutorij, singulorum fescuncia. Dioscorides.

ATRAMENTVM sutorium genere quidem unum Atramentū  
& idem est, molle & concretum: sed in specie differen-  
sutorium.



lias treis habet. unum nanque humoribus stillatim in cuniculos quosdam colatus, concrefcit. quare ab ijs qui Cypria metalla perficiunt, stillatitium appellatur. Peteseius ipsum pinarion uocat, alij stalacticon, id est stillatium, alterum simplici ratione fit in speluncis: postea transfusum in excauatos scrobes, concretum capefit. quod pecton, id est concretitium, propriè nomenclatur. tertium dicitur coctile, & in Hispania fieri solet. sed inutile, ac inualidissimum esse constat. Ratio parandi hæc est: Aqua madesfactum decoquunt, mox in piscinas transfundunt, & residere patiuntur. hoc certis diebus coalescit, in complures formulas digestum, tesserarum speciem reddentes, quæ racematim inter se coherescunt. Optimum esse creditur, cæruleum, graue, concretum, translucens. cuiusmodi stillatitium est, ab alijs lonchoton nomenclatum. proximum, concretitium. coctile uerò ad infestius & denigrationes, aptius cæteris esse cõpertum est. sed ad medicinæ usum inualidius esse, experientia docent. Vritur, ut paulo post in mentione chalcitis ostendimus. Dioscorides.

Auripigmentum.

AVRIPIGMENTVM in eisdem metallis, quibus sandaracha, gignitur. Optimum existimatur erythrosolum, aureo colore micans, nulli materiæ permixtum, in squamas fissile, quale in Mysia Hellefonti nascitur. Huius duo genera fluxerunt. unum supra dictum est. alterum glaucis effigie, pallidum, & colore sandarachâ mutans, glebosum, ex Ponto & Cappadocia deferitur. quod etiâ secundum locum tenet. Torretur in testa noua uinis car bonibus subiectis: asiduoq; uersatur, donec igne flagret,

gret, & mutet colorem. deinde refrigeratum, tritumq;  
reconditur.

## B



**B**ALANVS myrepſice, hoc Balanus my  
eſt glans unguētaria, præſertur repſice.  
Dioſcoridi, recens, & ſarctū, delectus ben.  
item cādida, & quæ facile à pu  
taminibus ſoluitur, id eſt, quæ  
ſuo cortice facile ſpoliatur. Plin  
nius Petrean, id eſt ex oppido

quod Petram uocant, optimam eſſe dicit, nigro cortice,  
& candido nucleo. Errat Meſue qui Ben antiquum di  
cit melius eſſe recenti. Glans unguentaria aluum ſola  
uit ex hydromelite, Dioſcoridi, ſed ſtomacho aduerſa  
tur. Drachmæ pondere pota eidem auctori lienem abſu  
mit. Doſis eius eſt Meſuæ à drachma ſemis uſq; ad dra  
chmā unam & ſemis. Oleum quoque quod ex ea ex  
primitur, uentrem potu ciet.

Glans vngue  
taria.

**BALSAMVM** in Iudæa ſolum quadā ualle & Aez Balaſamum.

gypto naſcitur. his differens modis, ſcabritia, proce  
ritate, gracilitate. Quod igitur tenui & capillacea coma  
eſt, theriſtrum uocant, quaſi demeſſile. fortaiſſis quoniā  
ob gracilitatem facile demetatur. Aetiſius ſub ortu  
Canis ardoribus, arboſ uingibus ferreis inciditur, ma  
natq; è plaga ſuccus, quem opobalaſamum uocant: ſed tan  
exiguo ſtillatu, ut annis ſingulis, ne plures quidem quā  
ſem ſepteniue cōgij cogantur. inibiq; pondus, duplo re  
penditur argento. Succī probatio eſt, ut ſit recens, uali  
di odoris, ſincerus, non ad acorem uer gens, dilui faci

lis, leuis, astringens, ac modicè mordens gustu. Sed uarie uitiatur, musto ab aliquibus terebinthi, cypri, lentisci, balani unguento: item susino, metopio, melle, aut Cypria cera liquida. quod maleficium faciliè deprehenditur. Nanque mcerus in laneam uestem susus, neque maculam facit, neque si eluatur notam relinquit: uitiatus autem mbaeret. Et lac instillatus coagulat, quod adulteratus non efficit. Quinetiam syncerus in aqua aut lacte celerrime liquatur, coloreq; lactescit: uitiatus uerò olei modo innatat, se conuoluens, aut in stellæ modum diffundens. Syncerus senescens crassescit, deteriorq; redditur. Hallucinantur, qui aqua concretum pessum ire, et ad inasidere arbitrantur, postea dissipatum supernat. E ligni genere, quod xylobalsamum uocant, probatur recens, sarmento tenui, suluum, odoratum, quadam tenes opobalsamum spirans. Necessarius etiam seminis erumpit usus. quare eligatur flauum, plenum, grande, ponderosum, mordens gustu, seruens in ore, modicè opobalsamum olens. Adulteratur semine hyperico simili, quod à Petra oppido defertur. Sed coarguitur magnitudine, inanitate, uirium ignauia, sapore piperis. Diosc.

Bdellium.

BDELLIVM alij bolchon appellant, alij madelcon. lachryma est Sarcenitæ arboris. probatur gustu amarum, translucentum, taurini glutinis in morem, intus pingue, liquescens facile, ligni ac sordis expers, suffitu odoratum, ungui simile. Est etiamnum bdellij genus sordidum, nigrum, uberiusculis glebulis in offas cōuolutum, asphalti odore, ex India aduectum. defertur etiam à Petra oppido siccum, resinosum, liuescens, sed facultate secundum,

eundum. Adulteratur gummi. sed ita uitiatum non perinde gustui amaritudinem repræsentat, nec usque adeo suffusionibus odoratum. Diosc.

**BITVMEN** Iudaicum cæteris anteponitur. Cuius Bitumena. probatio est, ut purpuræ modo splendeat, sitq; pondero delectus. sum, ac ualidum odorem uibret. nigrum autem & fordidum, uitiosum est. Adulteratur pice. Gignitur in Phœnice, Babylone, Zacyntho, & Sydone. Liquidum inuenitur in Atragantino Siciliæ, fontibus innatans. quo utuntur ad lucernarum lumina, olei uice. Hallucinantur qui id Sicilicum oleum nominant. nanque liquidi bituminus genus esse constat. Dioscorides.

**BRVTONIÆ** radices succus exprimitur Vre. Bryonia.

Dosis radices Fesceræ seu Alfesceræ, hoc est uitis albae, præscribitur Mesuæ ab aureo uno usque ad aureos duos: & succi eiusdem, à drachma una, usque ad drachmas duas. similiter & Fesceresin, quæ eidem sathonis Arabicæ auctori species est Alfesceræ. Mesue.

**BRITANICÆ** folijs exprimitur succus, qui Britanica igni aut sole cogitur. Dioscorides.

Simili modo ut cantharides, reconduntur **RVPRE** Buprestes: & **STES**, genera quædam cantharidum: & **PINORVM** Pinorum eruæ. quæ supra cribrum suspensum feruēt in cinere paulisper inostæ, reponuntur. Dioscorides.

**BYTYRI** fuligo. Colligendæ ex eo fuliginis ratio Butyri fuligo hæc est: Butyrum in lucernam nouam ingestum accenditur, fictiliq; operculato quod supernè in siphunculi speciem desinat, & infima parte cuniculos clibani modo habeat, crematur. & subinde aliud in absumpti locum sufficitur.

sufficitur, dum coaceruetur fuliginis modus, quem facere institueris. penna post deraditur ad usus. Diosc.

## C

Cadmia.



AD MIAE ex generibus optima est Cypria, botryitis nomine, densa, modicè grauis, et in leuitatem magis declinans, racemosa facie, colore spodij, quæ fracta cinerulenta est, et æruginea. Proxima habetur foris cœrulea, intus candidior, internatus uenarum discursibus, onychitæ lapidi similis. cuiusmodi sunt, quæ è ueteribus metallis effodiuntur. Quædam etiam placodes, id est crustosa, dicitur, segmentis quibusdam perinde quasi zonis cincta, ob quod eam zonitin appellauere. Alia ostracitis nominatur, gracilis, et magna ex parte nigra. sed quæ testaceam faciem habet, terram amplexa est. Improbatur candida. Oculorum medicamenti botryitis nomine, et onychitis, utiles: reliquæ ad emplastra, et farinas quæ cicatricibus inducendis insparguntur. ad eadem Cypria prodest. ex Macedonia uerò, Thracia, et Hispania delatæ improbantur. Gignitur cadmia ex ære in fornacibus candente, fuligine egesta flatu, et lateribus camerisq; fornacum inherente. Prægrandes autem ac ferreæ sunt rudes, ab officinis appellatæ acestides, per summa fastigia cōnexæ et concameratæ, ut quæ ab ære iactantur sursum corpuscula cohæreant, et imbi detineantur. quæ cum spissius insident, in corpus cōcrescunt, et mo-

dò ge

dò genus unum eius, modò duo, modò omnia perficiunt. Extrahitur & cadmia in Cypro è monte qui Solis incli-  
bit, cremato lapide cui pyrite cognomen est. in quo etià  
monte quedam quasi uenæ chalcitis, muscos, forcos, me-  
lanterix, cœrulei, chrysocolle, atramenti sutorij, diphy-  
gisq; inueniuntur. Nec desunt qui cadmiam in lapidum  
sodinis inueniri tradât, falsi quadam lapidum cognatio-  
ne. qualis inuenitur & apud Cumas lapis, nullâ sui um  
ostendens. Illico deprehenduntur, quòd sunt cadmia le-  
uiore, nullumq; alienum mandentibus saporè exhibent.  
commanducatus item lapis, dentes offendit. cadmia, ut-  
pote cum cedat, esum non restituit. Alio autem discerni  
possunt argumento: Cadmia in farinam detrita, & acce-  
to subacta, atque in sole siccata, coit. quod in lapide non  
accidit. Item tritus & igni appositus lapis, profilit, &  
fumum igni similem eiaculatur. cadmia uerò quieta ma-  
net, fuliginemq; luteo colore aut æreo splendentem ex-  
puit, uario zonarum discursu. Insuper lapis ignem ex-  
pertus, atque refrigeratus, colorem mutabit, ac leuior  
multo fiet. sed cadmia nihil euariat, nisi quis eam multis  
diebus cremauerit. Fit & in argenti fornacibus candi-  
dior, ac minus ponderosa, sed uiribus nequaquam com-  
paranda ærariæ. Vritur cadmia superior carbonibus  
obruta, donec translucida spectetur, & ferrei stercoris  
modo bullet. mox extinguitur uino Amineo, quæ ad  
emplastra præparatur: sed quæ ad psorarum medica-  
menta præparatur, aceto. Alij hoc modo exustam con-  
terunt in uino, rursumq; fictili crudo torrent, donec pu-  
mucosa uideatur. iterumq; tritam ex uino, tertio urunt.  
donec



donec prorsus in cinerem redigatur, nihil scabritiæ retinens. hoc spodij uice utuntur. Lauatur autem in mortario trita, effusa subinde aqua, dum sordidum nihil emergat. dein coacta in pastillos, reponitur. Diosc.

Calam<sup>o</sup> odoratus.

CALAMVS odoratus in India nascitur. melior est fuluus, dense geniculatus, & qui assulose frangitur, plena arancorum fistula, albicans, lentus in mandendo, & astringens, ac cum aliquanta acrimonia amarus. Diosc.

Calx uiua.

CALX uiua hoc modo fit: Marinorum buccinorum testas igni condito, aut feruenti clibano, nocte dimittito: postera die, si candidissimæ fuerint, extrahito: sin aliter, iterum urito, usque dum penitus albescant. Frigida deinde restinctas nouo fictili indito, diligenterq; uetere lacinia operculatas, integran noctem finito. Postridie si omnino in calcem mutata uidebuntur, reponito. Fit etiã coctus fluuiatilibus calculis: item ex uulgarì albo lapide, reliquis laudatior. Efficacissima recens, & aquis nondum aspersa. Diosc.

Cantharides.

E frumentis congelatæ CANTARIDES ad reconducendum idoneæ sunt. quæ fictili uase non picato cõduntur, & raro linteo obligato ore, & deorsum conuerso suspenduntur super aceti feruentis quàm acerrimū halitum, donec a stu exanimentur. postea lino transfixæ reponuntur. Potentissimæ omnes uariæ, luteis lineis, quas in pennis transversas habent. promissoq; corpore, crasse ac blattarum modo perpingues. sed inertes ac imbecillæ, quæ uniùs sunt coloris. Dioscorides. Aliqui pennas pedesq; contra potarum ueneficia, remedio esse tradiderunt.

Carda



CARDAMOMVM optimum est, quod ex Coma Cardamo-  
 gene, Armenia, Bosphoroq; deuehitur. In India quoque mun.  
 & Arabia prouenit. Eligi debet plenum, frangenti con-  
 tumax, occlusum, sarctumq;. Quod enim huiusmodi non  
 est, exoletum iudicatur, & gustu acre, subamarum, &  
 odore caput tentans. Diosc.

CASIA, cuius complura sunt genera, iuxta odorifera Casia.  
 ram Arabiam gignitur, crassi corticis sarmento, folijs pi-  
 peris. Eligenda est fuluescens, pulchri coloris, coralij  
 æmula, perquam angusta, longa, crassa, & fistulosa, gu-  
 stu mordens, & cum aliquanto seruore astringens, aro-  
 matica, uinoso odore. cuiusmodi est quæ ab incolis, achy  
 appellatur: ab Alexandria negotiatoribus, daphnitis.  
 Huic præfertur crassa, purpurea, & nigricans, xigir co-  
 gnomene, quæ rosam odore imitatur præcipui in medici-  
 na usus. Secundum locum tenet antedicta. Tertia, cui mo-  
 syletico blasto, id est germi cogno- men est. Reliquæ ui-  
 les, ut quæ asymphemon dicitur, nigra, insuauis, cortice  
 tenui ac rimoso: & quæ darca, & kiltò uocantur bar-  
 baro nomen. Similior huic est PSEUDOCASIA, Pseudocasia.  
 quam ut explicari possit, quæ gustu coarguitur, cum nec  
 acris, nec odorata sit, hærentemq; medullæ corticem ha-  
 beat. Inuenitur etiam lata quædam fistula, mollis, leuis,  
 sirculosa, quæ antedictæ præfertur. Damatur candi-  
 cans, scabra, hircinum uirus redolens, & quæ tenui fi-  
 stula & scabra cute sit. Diosc.

CASIA fistularis, quam Græci veteres

ignorarunt.

Siliquas CASIAE deligere oportet ponderosas, Casia fistu-  
 laris.  
 colla

collucentes, per plenas : quas si concusseris, inclusa intus  
 dos. grana non obstrepant. Dosis medullæ Casiæ, est à  
 semuncia ad fescunciam, id est unciam unam & semis.  
 Mesue.

**Castorium.** CASTORIS eligi debent testes qui ex uno ortu  
 connexi sunt ( fieri enim non potest, ut gemini folliculi  
 in una membrana coniuncti reperiantur ) liquore intus  
 ueluti ceroso, odore graui, & uirtus redolente, gustu  
 acri, mordente, ac friabili, naturalibus tunicis circunda-  
 to. Quem fraude aliqui corrumpunt, conijciētes in follem  
 gummi, aut ammoniacū cum sanguine & castorio suba-  
 ctum, & ita exiccantes. Vanum est quod traditur, testes  
 ab ipsis euelli, & à sese abijci, quum uenatu urgentur.  
 siquidem tangi nequeunt, ita, ut in sue, substricti. Operæ  
 autem precium est, diuisa pelle melleum liquorem cum  
 euestiēte tunica assumere, & siccātū potui dare. Diosc.

**Cedrus, & Cedria.** CEDRVS arbor magna est, ex qua picem colligūt,  
 quæ CEDRIA uocatur. Cedria optima est crassa, per-  
 lucida, grauis odoris. quæ dum effunditur, guttatim non  
 dissipata coit. Fuliginem, quomodo ex pice, congeri o-  
 portet. quæ eandem quam picea fuligo uim præbet. Fit  
 & oleum, à cedria separatum, dum coquitur, uelleribus  
 supra halitum eius expansis, ut in pice. Eiusdem ad om-  
 nia usus. Diosc.

**Centaurium magnum.** CENTAVRII magni succum in Lycia exprimunt,  
 quo pro lycio utuntur. Diosc.

**Centaurium minus.** CENTAVRII minoris succi extrahēdi ratio : Le-  
 gitur herba semine prægnans, & diebus quinque made-  
 facta, decoquitur donec superemineat aquæ. mox ubi  
 refri-

refrixit, linteolo exprimitur. & eieſta herba, iterũ de-  
coquitur, uſque dum mellis craſſitudinem habeat. Non-  
nulli eam recentem grauidanq; contundunt, atque ſuc-  
cum fiſtili non picato exprimunt, & in ſole, lignea ru-  
de aſidue mouentes, inſpiſſant. quod ſi quid concretum  
ſaucibus uſiſis adhæreſcat, detradunt, reliquoq; humori  
permuſcent, noctu diligenter operiũt. nanq; ros noctur-  
nus, liquores coaleſcere non ſinit. Quæ autem ſiccis ræ-  
dicibus aut herbis liquamenta exprimuntur, decocta, ut  
in gentiane mentione retulimus, præparantur. ſed quæ  
ex corticibus humidis, aut contuſis herbis faciſtantur, in  
ſole, uti antè dictum eſt, coguntur. ſic è thapſia, ſic è man-  
dragora, reliquisq; ſimilibus ſuccus, ſic ex acerbis uuiſ  
melligo elicitur. lycium tamen & abſinthium, hypoci-  
ſtis & conſimilia, decocta, eo quo diximus modo, cogun-  
tur. Dioſcorid. Purgat aluũ drachmæ pondere ſume-  
ptum in hemina aquæ, cum exiguo ſaliſ, & aceti; bi-  
lemq; & craſſos humores per aliuũ exigit. Maioris  
uero Centaurij radix duabus drachmiſ, & interdum  
drachma una bibitur Dioſcoridi & Galeno. ſi febris  
ſit, in aqua trita: cæteriſ, in uino. Medetur & morbiſ  
pluriſimis decoctæ ſuccuſ. Meſue. Quod ad electio-  
nem attinet, falſum eſt quod ſcribit Meſue: Nempè mi-  
norem Centauriam meliorem eſſe in omni re. Alia enim  
in re utraq; præſtantior eſt. Tagautiuſ.

CERA optima eſt ſubſulua, ſuppinguiſ, pura, odor-  
rata, & halituſ quadam tenui melleuſ referens, natio-  
ne Pontica, aut Cretica. ſecundum locum obtinet candi-  
dianſ, & ſuapte natura pinguiſ. Candida ſit hoc modo:

Ex ea radunt album syncrumq; atque transfundunt in uas, quod satis habeat marinæ ex alto petiæ, insperfoq; nitri momento, decoquunt. cumq; iterum tertione infra buit, separatim uas refrigerant, ac ceræ pastillum extingunt, deterfa sorde, si qua fortè adhaesit. tum denuò indita noua maris aqua feruet, uti retulimus. Et uase dempto ex igne, fundum ollule nouæ aqua frigida madefactum, in ceram summam suspensa manu intingunt, quò celerius concreseat, Et quaminima portio extrahatur. suscepto primo ceræ orbiculo, iterum uasis inum aqua refrigeratum, tantisper in ceram immitti debet, dum tota excipiat. orbiculi lino consuti, inter uacante spatio suspenduntur. Et inter diu, continuò sub sole, noctu sub luna asperguntur, usque dum perfectè albescant. uerum si eximius ille candor desideretur, eadem faciliari, Et identidem recoqui operæ precium est. Nec desunt qui pro marina, in muria quam acerrima semel aut iterum excoquant. dein laguncula tenui, rotunda, ansam habente, extrahunt. postea orbiculos, substrato affatim cessante heroso, insculant, donec candorem summum contraxerint. Præcipiunt hoc obeundum munus uere, cum sol remissa uehementia humorem pariat, ut non facile liquitur. Dioscorides.

## Cervicornu.

CERVI cornu concisum, crudo fœtili, luto circumlito, Et in furnum indito, uritur donec albescat. id eadem modo elotum, ulcibus oculorum Et defluxionibus salutare est. Diosc.

## Cervusa.

CERVUSA fit hoc modo: Infuso in urceum oris luto, aut fœtile labellum quàm acerrimo aceto, laminam plumbæ

bean supra fictilis spiraculum, subiecta prius arundinea tegete, firmato: superiectusq; uelaminibus, ne balitum expiret acetum, ubi resoluta fuerit, defluensq; deciderit, humorem purum ad summa delatum colato, crassamentumq; transfundito. debet quoque siccare in sole, mox trusatili mola teri, aut aliâs tritum cribrari. postea quod superest duri in tenues partes redigendum, cribrandumq;. uicissim eadem tertio quartoq; facienda. Melior, quæ primò cribrata est, & medicamentis oculi delectus. lorum assumenda: secundum locum tenet, sequens: & reliquæ suo ordine. Nec desunt qui ligneas rudes, in medio uase appendant, & derafo ceu situ imposito, ita ut acetum non contingat, inditoq; operculo circumlinentes dimittunt. post dies decem laxato obturamēto uisunt. cumq; resoluta materia fuerit, reliqua, ut supra diximus, exequuntur. Si autem quis in pastillos uelit digerere, aceto acri subacta, diuiditur in pastillos, qui in sole siccantur. Aestate tamen supradictum opus obeundum est. ita enim candida atque efficax redditur. Quinetiam hyeme paratur, uiscis supra fornios, balnea, aut fornaces impositus, ascendens enim calor, idem quod sol præstat. Laudatissimam fieri putant Rhodi, & Corinthi, aut, Lacedæmone, proximam Puteolis. Torretur hoc modo: Flagrantibus igni carbonibus, fictili nouo, maximè Attico, tritum cerusæ imposito, & assidue uersato. cumq; cinereum colorem traxit, eximens refrigerato, & uitior. Est & aliud urendi genus: Trita patinis nouis supra prunas imponitur, & ferulacea rude mouetur, donec colore simulis sandarachæ fiat. Extractaq; ad usus mini-

stratur. quæ uerò ita parata est, sandyx à quibusdam dicitur. Lauatur cerusa cadmiæ modo. Diosc.

Chalcitis. CHALCITIS præfertur similis ari, friabilis, nec lapidosa, nec inueterata, intercurfantibus oblōgis uenis,

Pforicon. splendentibusq; . Diosc. PSORICON appellatum ē Chalcite fit medicamentum, duabus eius partibus, cum una cadmiæ additis, & ex aceto tritis. oportet autem in fictili, obruere fimo, diebus quadraginta, per Caniculæ ardores, sic enim fit acrius. Idem quod Chalcitis potest. Alij pares utriusque portiones in uino terunt, & eadem prosequuntur. Vritur Chalcitis fictili nouo, uiuis carbonibus superposito. modus autem uestionis in bu midioribus est, dum ipsa Chalcitis bullas excitare desierit, & perfectè inaruerit: in reliquis uero dum mutata in roseum colorem fuerit, & sanguineū aut inuiatū colorem contraxerit, tum demum eximenda est: infidens autem spurcitia flatu expellenda, mox reponenda. Torretur etiamnum per flatis carbonibus, usque dum luteo colore palle scat: aut fictili subditis candentibus prunis, subinde uersata, donec igni conflagret & colorem nu tet. Diosc.

Chelidoniū maius. CHELIDONII maioris folijs, caule, radice, succus exprimitur incumte æstate, & siccatus in umbra digeritur in pastillos. Diosc.

Chrysocolia CHRYSOCOLLA laudatissima Armeniaca, colorem porri quā simillimè reddens, secundum locum sibi uendicat Macedonica: & proximum Cypria. quo in genere præfertur pura. damnatur, quæ terram aut caltulos collegerit. Ratio lauandi hæc est: Tusam infusa aqua,



aqua, mortario expassa manu ad pilam uehementer fricato, & statim quum confederit, colato. alteram infundens aquam, rursum terito. Diosc.

CICUTAE succus exprimitur confusus cacumini= Cicuta.  
bus, priusquam semina & comæ siccescant. qui sole densatur in pastillos. Efficacissima uis Creticæ, Megarensi, mox Atticæ, & in Chio & Cilicia nascenti. Diosc.

Hallucinantur qui CINNABARIN minio eandem Cinnabaris. esse existimant. Miniū enim in Hispanijs ex lapide quodam argenteæ arenæ permisto, temperari solet. alioqui non dignoscitur. fornacibus autem in florentissimum flagrantissimūq; colorem permutatur. in metallis uerò strangulantiū halitum eructat. itaque facies incolæ uasis obueclant, ut per illas spectent, nec respirando noxium acrem attrahant. eo pictores ad sumptuosa parietum ornamenta utuntur. Cinnabaris uerò ex Aphrica deferitur, & magno constat. haftenus inuenitur, ut uix uersicoloribus pictorum lineis satisfaciāt. intento colore nec diluto præditam. quare quidam sanguinem esse draconis existimauerunt. Vim habet cinnabaris hæmatitæ lapillo eandem. Diosc.

CINNAMOMI genera plura, patrium sibi nomen Cinnamomum.  
uendicantia. Præfertur tamen Mosyliticum, quod casia, cui Mosyliti nomen est, aliquam referat effigiem. Sed in eo genere recens, nigrum, ex uinoso in cinereum uergens, læue, tenuibus ramulis, ac frequentibus nodis cinclum, per quum iucunde olens. Optimi ferè indicium, iucundi odoris proprietate constat. Inuenitur enim cum optimo, eoq; quod peculiare est, odor rutæ aut cardamo



mo proximus. Insuper, acre, mordens, & cū calfactio-  
ne quadam tenuis salsum, quod non citō conficanti aspe-  
rum, aut frianti lanuginosum, lauibus tamen interno-  
dijs appareat. Si certior fieri uoles, uellito ab radice sur-  
culum. facilis est huiuscemodi probatio: nanque frag-  
menta miscellanea quædam esse uidentur. Quæ autem  
melius spirant, suo halitu cum uires primum consulun-  
tur, olfactum explentia, deterioris dignotionem impe-  
diunt. Est etiamnum montanum, crassum, pumilum, sula-  
uescens admodum. Tertiū à Mosylitico, per quā sua-  
uiter olet, nigrum, fruticosum, paucis intercedētibus ge-  
niculis. Quartum, fungosum, canalicans, affectu tubero-  
sum, uile, ac friabile, magnam habens radicem, quæ ca-  
siam plantæ repræsentat. Quintum genus, odore nares fe-  
riens, subrusum, & cortice fuluæ casie simile, tangenti  
firmum, minus ueruosum, deiusa radice firmatum. Iis  
quæ thuris, casie, myrti, aut anonæ odorem spirant, nu-  
mus suauitatis inest. Deligito scabrum, album, rugosum:  
at læue, & lignosum circa radicem, ut inutile reijcto.

Est etiamnum simile aliud, cui pseudocinnamo cognio-  
men est, inualidi odoris, soluturumq; uirium. Vocatur  
etiam zingiber, cum tamen sit xylocinnamomum, præ-  
bens quandam cinnamoni faciem. Est autem lignosum  
cinnamomum, samenta longa robustaq; ferens, odore  
longè cinnamomo inferiore. Sunt qui xylocinnamomū  
à cinnamomo genere differre dicant, quod a natura eius  
abhorreat. Tritum uino excipitur, umbræq; siccatum,  
quō diutius eduret, reconditur. Est & quoddam cinna-  
momum, quod aliqui pseudocinnamomum appellant,  
per quam

per quàm denso atque crasso sarmento, longe tamen inualidius cinnamomo, & odore & gustu. Diosco-  
rides.

CNICVS redigitur in offulas, quas placentulas uocant, adiectis succo amygdalis, nitro, aniso, & melle decocto, quæ aluum emolliunt. Hæ in partes quatuor finduntur, quæ nucis iuglandis magnitudinem impleant, è quibus ante coenam duas uel tres sumpsisse satis est. Ratio temperadi hæc est: Cnici candidi sextarius, amygdalorum tostorum & delibratorum cyathi tres, anisi sextarius unus, aphronitri drachma una, cum carnibus triginta caricarum. Cnici semen tunditur, & succus exprimitur. Diosc. Semen Cartami ex sententia Mesue Cartami deligendum est, candidum, planum, hoc est læue, grandiusculum, & plenum, cuius medulla est unctuosus & pinguis, cortice tenui. Paulus coquit drachmas quinque dosis. medullæ Cartami, cum Ptisana, & paucis salibus, ut educat aquam. Seminis tusi succus adiectis amygdalis, nitro, anetho, & melle decocto, cogitur in placentulas Dioscoridi, quæ aluum emolliunt. Hæ in frusta seu globulos quatuor finduntur, qui nucis iuglandis magnitudinē impleant, è quibus duas uel tres ante coenam sumpsisse satis est.

COCCVM optimum gignitur in Galatia & Armenia. deinde Asia & Cilicia. ultimum ex omnibus Hispanicum. Nascitur quoque in Cilicia, è quercubus, cochlearum exilium similitudine, quod illius regionis mulieres ore legunt, & coccum uocitant. Diosc.

COERYLEVS lapis præcesit in Cyaneo.

Cæruleus lapis.

Colocynthis duplex genus apud Me-  
suen.

Mesue duplex genus COLOCYNTHIDIS con-  
stituit. Nempè marem & formosan. Mas grauis, du-  
rus, asper, nigricans, & lanuginosus est. Formana el-  
dem auctori præfertur mari, præsertim magna, siue ut  
dicunt grossa, leuis, laxa, candida, lenis, & perfecte ma-  
tura: & cuius pars interior, siue medulla, pulposa, laxa,  
leuis, hoc est nõ aspera, & insigniter alba est. Colo-

**Actius.** cynthidis medulla Actio eligenda est, alba & mollis.  
Siccior uero & nigricans, tanquam mala reijcienda.  
Optima Venetijs emittit Colocynthis, & quæ ex orien-  
talibus regionibus, utpote calidioribus, ad nos aduehi-  
tur. Quæ apud nos nascitur, inefficacior est, & ægre al-  
uum soluit. Cæterum probatissima sylvestris huius Cu-  
cubitæ medulla, siue, ut loquuntur pulpa antequam in-  
usum assumatur, primum incidenda est. Deinde terenda  
diligenter, & sæpius cribranda. At usus tempore ruri-  
sus cum mulsâ in mortario exquisitissime subigenda. Id  
enim illi, inquit Actius, peculiare est, ut trita antequam  
madescat, subtilissima appareat: sed post mulsæ infusio-  
nem ita intumescat, ut qui uideat cribratam, munime pu-  
tet. Quoddâ igitur frustulum eorum quæ intumuerint,  
sæpe uentri aut stomacho inheret, sæpius tamen intesti-  
norum anfractibus implicatur. Cumq; sit naturaliter a-  
cris & mordax, ulcerat intestina, & ob cõsensum ner-  
uis afflicum inducit, torminaq; parit & contractiones.

Cucurbitula  
syluatica dili-  
gentissime te-  
renda.

Propterea exquisitissima diligentia ad ultimam minu-  
tiem redigenda est. Sed mulsio prius aut iute decoctio  
infunditur, tum exiccata in puluerem redigitur. Paulus  
& Auicenna, quem est Mesue seculus, ipsam Colocyn-  
thida

thida etiam plurimum teri iubent. Quoniam ( ut inquit Paulus ) nisi exacte teratur, asperæ eius partes interioribus hærentes, ulcera excitant, quibus nervi compatiuntur. Serapion autem contrarium, sed male, asserit, eam uidelicet non esse multum terendam. Dosis pulpæ Co= error.  
locynthidis ad summum est decem ceratiæ Mesuæ. Pau= dosis.  
lus drachmam integram dare non ueretur, quæ eiusdem Mesuæ.  
sententiæ, pendet ceratiæ decem & octo. Datur Actio Aetius.  
Colocynthidis medulla scrupulorum duorum pondere, ex duobus mulsæ cyathis. Imbecillibus tamen, inquit, scrupulus sufficit. Quatuor obolis sumpta purgat Dio= scoridi melle cocto, myrrha & nitro excepta, atque in catapotium coacta.

CONYZÆ genus tertium reliquis infirmius est. Conyza.  
Dioscorides.

CORALLIVM laudatissimum, rubens, colore an= Corallium.  
therici aut sandycis saturatæ, nec secus terenti facile ce= dens, æquabili usquequaq; concremento, rursus algæ aut fuci marini odore, quam ramosissimum, forma fruticis, cinnamomi æmulum. Quod autem in lapidis duritiâ coit, scrupulosum, inane, & lacunosum, utiosum exi= stimatur. Quod Antipathes uocant, corallium esse arbi= Antipathes.  
trantur, specie tantum distans. est autem colore nigro, arboris figura, ramosum magis. Vires supradicti habet.  
Dioscorides.

COSTVS præcellit Arabicus, candidus, levis, exi= Costus.  
ma odoris suauitate. Secundum locum sibi uendicat in= dicus, levis, uber, ut ferula niger. Tertius est Syriacus, grauis, colore buxus, & odore feriens. Optimus est re=

cens, albus, abunde plenus, densus, aridus, à teredibus non erosus, sine graueolentia, gustu calidus, & mordens. Sunt qui admittit helenij comageni præditis radicibus, adulterent. quod deprehensu facile est. Siquidem neque gustu feruet helenium, neque ualidum odorem ubrat, ut caput tentare possit. Diosc.

Cotonea  
mala.

COTONEA eligi oportet uera, quæ sanæ sunt rotunda, parua & odorata. quæ uerò struthia dicuntur, magna quidem sunt, sed minus utilia. Diosc.

Crocodili fi-  
mum.

CROCODILI terrestris finum crocodileam uocant, quæ mulieribus colorem nutrit in facie, nitoremq; seruat. Optima est candidissima & friabilis, anyli modo, minime ponderosa, in humore statim eliquescent: quæ cum teritur, fermenti acorem quadam tenuis refert. Adulterant eam sturnorij fimo, quos captos oryxæ pascunt. ipsumq; non dissimile uendunt. Alij anylum aut cimoniam muscent, & adscito anchusæ colore per rarum cribrum paulatim exprimunt, ut se contrahat in uerniculo rum speciem. qui siccati pro crocodilea ueneunt. Diosc.

Crocomag-  
ma.

CROCOMAGMA fit expressis urguenti crocini odoramentis, & in formas digestis. Optimum est odoratum, modicè myrrham olens, graue, nigrum, ligni ex pers, leue, subanarum, quod madefactum croci colorè reddit, gustatumq; uehementè dentes ac linguam inficit, nullus durans annus. quædè est, quod à Syria deservitur. Dioscorides.

Crocum.

CROCVM, optimum in medendi usu Coryceum, recens, & boni coloris, paulū candidi gerens in capitulo, oblongum, omnibus suis partibus constans, non frigile,

gile, plenum, à quo detractum est nihil, quod madefactū manus inficit, nec situm redolet, aut cariem sentit, suba- cre. sin huius generis non est, aut uetus, aut humore per- fūsum creditur. Secundus locus datur Coryceo, è tractu Lyciæ contermuno. Tertius Lycio, è monte Olympo. dein ex Aegibus Actoliæ. Cyrenaicum & Centuripiū inter Sicilica omnia uiribus infirmus est. Omnium natu- ra oleracea. Itali tamen ob succi copiam, & coloris ue- nustatem, tingendis mortarijs dicauerunt. quibus de cau- sis magno uenditur. Vtilissimum in medicina quod antè descripsimus. Adulteratur immisto crocomagmate tuso, atque etiam sapæ subtili: contrita, quò pondus adiciatur sinul argenti spuma, aut plumbagine. sed maleficiūmprehenditur puluerulento aspectu, & desi-uti odore. Dioscorides.

CYANEVS, id est COERVLEVS. Cærulei ori- go ex ærarijs metallis in Cypro. copiosior ex arena li- torali, secundum quosdam sub cautos specus maris inue- nitur: qui magis probatur. Eligi debet inebriatus. Vri- tur ut chalcitis. Lauatur ut cadmia. Diosc. Scrapio præfert, qui perfectissimum colorem cyaneum habet, & guttas aureas admixtas, quiq; alterum lapidem mixtum non habet, nec facile frangitur. Nostri pharmacopole lapidem hunc imperfectissimum ostendunt: quippe cui eius color desit perfectus.

Animaduertendum est communi lapidis stellati no- menelatur a Cyaneum sinul, & Marchasitam, hoc est pyriten esse complexos Arabes. Dosis lapidis stellati Mesue est à drachma una usq; ad drachmas duas & se- mis.

Cyaneus, id est, Cæru- leus lapis.

Lapis stellat<sup>9</sup> & Marchali- ta.

Dosis lapidis Stellati, id est Pyritis & Cy- anci.



mis. Reperio apud Galenū, & Paulū, ac reliquos alios scriptores medicos, Cyanon siue lapidem Lazuli, acri facultate esse præditum, & purgatoriā ac discussoriam uim habere. Pyriten uero quem Marchasitam uocant, nullus unquam (quod saltem nouerim) inter purgatoria medicamenta reposuit. Hic autem ualde discutit tumores, sanguinemq; in grumos concretum: cuius loco, cum eius copia non est, molari utuntur medici.

**Cyclamen.** CYCLAMINI succus exprimitur iuxta radice, & dosi radice ad mellis crassitudinem decoquitur. Diosc. Cyclamini radix cum hydromelite pota, pituitam per inferna detrabit. Eadem cum passo aut diluto mulso trium drachmarum pōdere epota, arquat morbum, id est istemritiam discutit, siccata & scyllæ modo concisa reponitur.

**Dosis alterius Cyclamini. i. Sigilli marie.** De altera Cyclamino (quam Sigillum Mariæ uocant) scribit Dioscorides, quod huius acini drachmæ unius pondere, in uini albi cyathis duobus, per quadraginta dies epoti, lienem per urinam & aluum paulatim absument. Dosis Arthanitæ Mesuæ est, ab acris duobus usque ad drachmas quatuor, & proprie succi eius.

**Aëtius.** Aëtius radice cyclamini minutissime tritæ drachmas tres uel quatuor, pro uirtutis ratione è mulsâ propinat, ad bilem & pituitam ducendam. Sed huic per sudorem præcipue purgat, seu potius euacuat.

**Cypirus.** CYPIRVS optima est grauißima, densa, fractu contumax, plena & aspera, odoris cum quadam acrimonia iucundi, qualis est Cilicia, Syriaca, & quæ à Cycladibus insulis petitur. Aliud Cypiri genus tradunt in India nasci, gingiberis effigie, quod manducatum croci uim reddit,



reddit, gustu amaro, illiūm psilothrum est. Diosc.

CYPHI thymiamatis compositio est, dicata dijs, quā Cyphi thymiamina  
abunde Aegypti sacerdotes utuntur. In antidota misce-  
ri solet. suspiriasis datur in potu. Permultae componen-  
di rationes, quarum una haec est: Sumito cyperi dimi-  
dium sextarium, cum pari baccarum iuniperi adulte  
modo: uuae passae pinguis, exemptis uinaceis, minas  
duodecim: resinae repurgatae minas quinque: calami &  
iunci odoratorum, & aspalathi, singulorum minas:  
myrrhae duodecim: uini ueteris sextarios nouem, cum  
duabus mellis minis. uuam passam detractis uinaceis tu-  
sam, cum uino & myrrha subigito: caetera tusa & cri-  
brata adijcito. die uno humorem combibere finito: dein  
mel coquito, dum sibi glutinis asciscat crassitudinem. eli-  
quatum resinam accuratē permisceto cum reliquis dili-  
genter contritis, & in fictile uas recondito. Diosc.

CYPRVS optima nascitur in Canope, & Ascalo= Cyprus.  
ne. Diosc.

D



IPHRYGIS tria genera est. Diphryges.  
se creduntur. Quoddā enim me-  
tallicum est, quod in Cypro sola  
gignitur. lutosum nanque extra-  
hitur, ex luto cuiusdā inibi spe-  
cus: extractum, sole siccatur,  
mox circumpositis sarmentis u-  
ritur. diphryges ideo uocatum est, quod & à sole & à  
sarmentis uratur, arescat, & ferme torreatur. Alterum  
perfecti aeris, quasi subsidens fex est. siquidem post fri-  
gidē

gidæ aquæ offusionem, ut suprâ retulimus, cum de flore æris differeremus, sublato ære, fornacũ ima p. arte cohaerens id genus inuenitur, & adstrictiõnẽ & gustum æris habens. Tertium sic fit: Lapidẽ pyriten, ut calcem multos dies cremât in camino: cumq; colorem rubricæ contraxerit, eximẽtes recondunt. Quidã tradunt, hoc ex sola materia quæ lapidẽ æris gignit, fieri: quãdo in dictis æreis assuta & in scrobes translata peruritur. tunc enim ambientem scrobis locum cõprehendit, & exemptis lapidibus nihilominus inuenitur. præfertur quod sapore æris reddit, æruginisq; adstringẽs, & uehementer exicans linguam. quod sibi exusta ochra nõ uendicat: quæ cremata, diphrygis uice uenit. Diosc.

Dipsacum. DIPSACI radix tusa & decocta in uino, usq; dũ sit crassitudo ceræ, sanat rimas sedis & fistulas. Medicamentum ærea pyxide recondendum. Diosc.

Dracūculus. DRACUNCULI radix mensibus effoditur, lotaq; frustatum cõciditur, & lino traiecta, siccatur in umbra, & ita reconditur. Diosc.

Dulcis radix. DULCIS radice succus exprimitur è radicibus, qui densatur lycij exemplo. Diosc.

## E

Ebenus.



BENVS optima habetur æthiopica & nigra, nullos habens uenarum discursus, factitij coloris læuore. cum frangitur densa apparet, mordens gustu, atque astringens. suffitur iucundo odore supra carbones, sine fœtore medio.

tedio. recens autem ad ignem prolata, ob pinguitudinē accenditur, & trita ad cotem flauescit. Altera est Indica, internatis segmentis candicantibus, & modice fuluis, item frequentibus maculis. cæterum prior, bonitate antecedit. Apud quosdam sesamina, aut spinea ligna consimilia pro ebano ueneunt. quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, & in purpureas assulas resoluuntur, nihil mordacitatis in gustu, nec redolentiæ in suffitu præsentia. Diosc. Ebenus uritur in fœtili nouo donec in carbones redigatur. Lauatur plumbi usti modo, & ita siccis scabrisq; lippitudinibus conducit. Diosc.

E fructu syluestris cucumeris, fit medicamentum quod ELATERIUM uocatur, ad hunc modum: De Elaterium. cerpti cucumeres, qui tacti protinus exiliunt, seruantur nocte una. postridie imposito supra craterē rariore cribro, utrisque manibus prehensi, sigillatim supino cultro, sursum uersus aciem habente, finduntur, atque per cribrum humor in subiectum uas exprimitur: simulq; cænosum quod hæsit cribro, quò facilius excidat, eliditur. quod ita pressum est, residere sinitur, atque in uicinior peluum demittitur. coaceruata autem in cribro segmenta, dulci aqua perfunduntur, & denuò pressa abiciuntur, humor in pelui agitatur, & linteo opertus, soli exponitur. dumq; steterit, tota supernatans aqua cum humore concreto, effunditur. hoc uerò identidem fieri solet, donec existens aqua liquecat: qua stillatim exhausta, sedimentum mortario suscipitur, & conterendo cogitur in pastillos. Sunt qui ad hauriendam protinus succi abundantiam, cribratos cineres humi inspargant, & medium

cavantes, triplicatum linteum obiciant, per quod elaterium cum sua humiditate diffundunt, siccatumq; in pila, ut dictum est, conterunt. Aliqui pro dulci aqua marina perfundentes, ita eluunt. Alij in nouissima lotionem, delectus. mulsam aquam respergunt. ELATERIVM opti-

Tempus durationis Elaterij.

mum esse constat, laeue, non ponderosum, cum candore leniter humectum, gustu amarissimum, quodq; lucernarum luminibus obiectum, facile flagret. Porraceum tamen scabrumq; si turbidum spectetur, atque erui cinerisq; plenum sit, graue & uisiosum esse solet. Nec desunt qui cucumis succo, amyllum immisceant, ut candelam ipsum & lenitatem imitetur. Elaterium usu purgationum à bimatu incipit esse tempestiuum Dioscoridi, duratq; decennio. Mesue conseruatur solum triennio, & post sex menses administratur. Theophrastus ducetos annos uim eius pollere adfirmat. Quo uetustius, eo esse melius dixit Plinius.

posis.

Maxima portio Elaterij est solidus obolus, Dioscoridi: minima mensura, semiobolus. Pueris sufficit diachalcon, id est calci duo, hoc est pondus granorum quatuor. Si maiore copia sumatur, periculosum est. Bilem pituitamq; alterutra parte extrahit. Vetandi autem sunt dormire, qui potant.

Epithymii.

EPITHYMVM nasci plurimum in Creta & Syria Mesue scribit. Cui etiam auctori praefertur Cretense, subrufum, & acuti, ut loquitur, odoris. Diosc.

posis Epithymi.

Mesue pulueris Epithymi drachmas septem exhiberi posse statuit. Cum tamen ueteres multo minorem Dioscor. quantitatem praescripserint. Dioscorides namq; quatuor tantum

tantum drachmas concedit cum melle ac sale & aceti exi-  
 guo. Idē pondus exhibet Galenus in sero lactis uel mul-  
 sa, libro decimoquarto methodi medendi. Oribasius in  
 suo compendio uix drachmas tres transcendit. Aëtius  
 tantum scrupulos duos triti & cribrati, ætate uigentibus  
 offert. Paulus tamen Aegineta libro septimo dandas esse  
 drachmas quinque cum lactis hemina contritas permut-  
 tit. Plinius uero lib. 26. cap. 8. ad sex usque drachmas  
 progreditur. Auicēna potionem Epithymi quatuor esse  
 aureos præcipit: adeo ut nemo sit præter unum Mesuē,  
 qui ad septem usque drachmas progredi ausus sit. Pro-  
 inde consultum erit, ut quinque tantum uel summum sex  
 drachmas, idq; paucissimis concedamus. Potio uero  
 ipsius Epithymi infusi seu macerati offerri potest, ab un-  
 cia una, usque ad uncias duas.

Galen.

Oribas.

3

Paulo.

5

Plinio.

6

Auicēna. aurei

4

Legitima do-

sis drachmæ.

5

Dosis infusi

epithymi.

ERVINAE paranda farina ratio hæc est: Vberio-  
 ra grana candidaq; deliguntur, permiscendoq; aqua re-  
 sparguntur, donec sufficienter combibant. postea torren-  
 tur, usque dum hians cortex disrumpatur. molitaq; fa-  
 rinario cribro incernuntur. postremo farina recondi-  
 tur. Diosc.

Erui na fa-

rina.

EUPHORBIVM libycæ arbor est, ferulæ speciem  
 habens, quæ in monte Atlante, iuxta Mauritaniam inue-  
 nitur. ea acerrimo succo turget. cuius eximium fetuorē  
 expauescentes incolæ, ouillos uentres elutos, arbori cir-  
 cumligant, & eminus caule contus incidunt. confestimq;  
 è plaga, perinde atq; uase quodam, in uentriculos copio-  
 sus lactis humor effluit, præter id quod humi sparsum,  
 uulnus ei aculatur. Duo succi genera. unum orobi ma-

Euphorbiū.

gnitudine, sarco collæ modo emicat. alterum in uentricu-  
lis concrefcit, atque uitrum ſpectatur. Eligendum eſt  
translucens, & acre. Euphorbium adulteratur ſarco-  
collæ & glutini miſtione. ſed difficile quidem experi-  
mentum. quippe cum leui guſtu, os accenſum diu deti-  
neat, adeo ut quicquid ori obijciatur, plane euphorbium  
reſpiat. Eius inuentio tempore Iubæ regis Libyæ co-  
gnita extitit. Dioſc. Paulus drachmam unam exhi-  
bet euphorbij, cum melle cocto, ad pituitam & aquam  
educendam. Plinius tres obolos ex aqua aut mulſo. Ra-  
ſis, Serapion & Auicenna, dicunt tres drachmas inter-  
ficere. Quadriennio conſeruatur. Meſuæ annuum per-  
nicioſum eſt.

Dofis Eu-  
phorbij.

## F

Fæx.



ÆX eligenda maxime à ui-  
no uetere, Italico : ſin minus, ab  
alio conſimili. Fæx aceti uiribus  
longè acrior eſt. Crematur ut  
alcyonium, antè diligenter ſic-  
cata. Sunt qui noua teſta igni lar-  
go urât, uſque dum penitus in-  
cendatur. Alij uiuis carbonibus ſæcis glebam obrunt,  
& idem opus proſequuntur. Experimentum eſt legitima  
uſtionis, ut acris nitore inalbeſcat, linguamq; tactu  
urere uideatur. Eadem urendæ ſæcis aceti ratio. Sed re-  
centi utendum eſt, quoniam celeriter exanimatur. proime  
de non niſi in recõditorio, & uaſe aliquo reponi debet.  
Lauatur, ut pompholyx: & oculorũ medicamentis clo-  
ta, ut ſpodos, adijcitur. Dioſc.



FEL omne curatur hoc modo: Recens præligato ore Fel.  
 folliculi lino tandiu demissum in feruentem aquam, dum  
 quis spatium trium stadiorum percursaret, mox exem=  
 ptum siccatur umbroso loco, aspergincin non redolente.  
 Sed quod ad oculorum medicamenta adijci solet, ligatum  
 lino in uitreũ uas, quod mel habeat, immittitur, circum=  
 uoluto ad os uasis lini principio: & operto uase reconsti=  
 tuitur. Efficacius fel marini scorpionis esse uidetur, &  
 piscis callionymus, marinæ testudinis, hyænæq;: itē per=  
 dieis, aquilæ, gallinæ cādideæ, & sylvestris capræ. quod  
 priuatim prodest contra suffusiones incipientes, & ocul=  
 lorum caligines, argemas, & genarum scabritias. ouil=  
 lo, sullo, hircino, atque iasino, turinum multo effica=  
 cius. Diosc.

FICVS ex cinere tam sylvestris quàm satiuæ lixi=  
 uum fit crematis ramorum cauliculis: quod subinde ma=  
 cerari opus est & inueterascere. siquidem inter cau=  
 stica intelligitur. Diosc.

FICI sylvestris & satiuæ lacteo succo idem præstat Fici sylvestris  
 succus ē teneris ramis sylvestris fici, qui lacte prægnan=  
 tes, silente adhuc oculo tusi exprimuntur: & siccatus in  
 umbra reponitur. Diosc.

FOENICVLII succus caule & folijs exprimitur, & Fœniculi  
 in sole siccatus, in medicamenta adijcitur, quæ ad excitan=  
 dam oculorum aciem commodè temperatur. Extrahitur  
 succus ad eadem ualens, etiam semine uiridi ramulisq;  
 & radicibus prima germinatione incisis. In Iberia quæ=  
 ad occidentem spectat succum reddit gummi similem.  
 Caulē medium, dum herba floret rustici decidunt,



igniq; admovent, quò facilius ui caloris exudans, gummi remittat. quod efficacius succo est, ad medicamenta oculorum. Dioscorides.

Confectio succi fœnogræci ex Aëtii  
libro septimo, capite 15.

Fœnum græcum.

FOENOGRÆCVM diligentissimè purgari oportet, deinde plurimum abluui, postea in aqua dulci purissima die ac nocte madefactum in fistili exactè decoqui, uis tãq; in decoctione uas æneum. Postridie effusa priori aqua, & alia pura coniecta ad ignem splendidum fumo carentem decoquito. ideo uero primam & secundam æquam abijcimus, ut omnis inde amaritudo eximatur. tertio igitur purissima aqua adiecta, et exquisitissimè operata ad liquidioris mellis consistentiam decoquito, inde per lintum excolabis, fœnogræcum nequaquã exprimens, sed eo tantum succo contentus, qui sponte defluet, quem ad prædictos usus seruabis. Seruari autem in alteram diem, uel quàm longissimè in tertiam potest, ulterius enim moratus acescit. Sed ubi ulcera satis purgata sint, à succo fœnogræci abstinebis. Cum hoc succo collyria dissoluuntur, ubi ulcera oculorum sordida sunt: & si abundent sordes, mel addetur. Lentorem habet, & relaxandi uirtute pollet. Hæc Aëtius.

Fucus marinus.

FVCI marini generibus uti humidis conuenit, prius quàm exarcescant. Diosc.

Fuligo.

FVLIGO qua pictores utuntur, ex uitrarijs officinis colligi solet. siquidem ei palma tribuitur. Diosc.

Fumaria electio.

Meliorem FVMARIAM existimat Mesue, cuius herba

herba uiridis & tenera est, folia quoq; tenera & plana,  
& flos subuiolaceus. Et melius (inquit) tempus collectio-  
nis herbe eius & operationis succi ipsius est principiu  
ueris: & seminis eius, finis ipsius ueris. Potio succi <sup>modus exhi-</sup>  
fumi terre, est Mesue, ab uncia media ad duas. Ego au- <sup>bitionis.</sup>  
tem uix puto esse cuiquam tam mollem uentrem, qui ea  
quantitate leniatur. Auicenna usque ad octo uncias ex-  
hibet. Multi sunt qui Auicennæ etiam modum excedūt.  
Decoctum eius exhibetur ab uncijs decem usque ad quin-  
decim. Et puluis à drachmis tribus usque ad quinque.

G



AGATES præferendus, qui Gagates  
celeriter accenditur, & odorem <sup>lapis.</sup>  
bituminis reddit. Niger est ple-  
runq; & squalidus, crustosus,  
perquam leuis. Vocatur locus in  
Cilicia & annis Gagas, in cua-  
ius faucibus ij lapides inueniun-  
tur, proxime oppidum Plagiopolin. Diosc.

GALBANVM succus est nascentis in Syria ferule, Galbanum.  
quod nonnulli metopium uocāt. Maximè laudatur car-  
tilaginosum, merum, thuris effigiem præbens, pingue,  
munimè lignosum, retinens nonnihil adiecti seminis, &  
ferule, graui odore, neque ualde humidum, neque nimis  
aridum. Adulteratur faba fresa, resina, & ammoniaco.

Si purgare galbanum uoles, in feruentem aquam de-  
nuttito. namque cum liquefactum fuerit, eius sordes flui-  
tabunt. quæ hoc modo faciliè separabis: mundo lina

teo raroq; alligatum in fithili aut ærea pyxide ita pendat, ut innum uasis ne tangat: opertoq; uase in feruidam aquam demittito. sic enim sincerum, ueluti per colum eliquescet, & lignosum in linteo remanebit. Dioscorides.

Galla. GALLA fructus est quercus. Aliqua omphacitis appellatur, parua quidem sed tuberosa, solida, nullo foramine peruiua. altera plana, leuis, perforata. Eligi debet omphacitis, quæ efficacior est. Diosc.

Gallinacei ueterisius. IVS è uetere GALLINACEO aluum deiecit. Ab icctis itaque interancis silem conijci oportet, & consueto uetere decoqui in uiginti sextarijs aquæ, donec ad tres heminas redigantur. totum id refrigeratum sub dino, datur. Aliqui incoquunt olus marinum, mercurialem, cum,

Galli gallinaei delectus. cum, aut filiculam. Diosc. Gallus in hunc usum eligendus est rufus & antiquissimus (quo enim antiquior eo melior censetur) salax & in coitum pronus, pugnax, & animosus, mediocris habitus inter pinguem & macrum. Talem igitur Aletryona, id est gallinaceum gallum, diebus aliquot fursure cibato, uel ut consulant alij, melle & modico sale, deinde ipsum cursu & uerberibus usque ad lassitudinem fatigato: nisi malis eundem, contra alterum gallinaceum etiam pugnacem & animosum, dimicando defatigari. Mox abscesso capite exenterandus est, & ut loquuntur, cuiuscerandus, & modo quo supra ex Dioscoride annotauimus in aqua decoquendus. Mesue aquæ mensuram non præscribit, sed ex ea quantum satis est assumit, & coquit, ut rarius uerbis utar, usque ad consumptionem durarum partium.

partiam. Eius autem iuris siue decocti Dosis eidem est <sup>dosisiuris</sup> <sup>circiter libras duas.</sup> Quæ certe quantitas nimium ex= <sup>gallinacci.</sup> cedit. Plinius decoquit gallinaceum hunc gallum decre= pitum in tribus congijs aquæ, donec reducatur usque ad tres cotylas.

GENTIANAE succi extrahendi ratio hæc est: Gentianæ Contusa radix quinque diebus aqua maceratur. postea <sup>succus.</sup> in eadem tantisper decoquitur, dum extent radices. & ubi refriguit aqua, linteo excolatur. mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat: siciliq; reconditur. Dio= scorides.

GINGIBERIS radices eligi debent, quæ teredines <sup>Gingiberis.</sup> non nouerunt. A multis tamen ob id conduuntur, quod celeriter cariem sentiant. Diosc.

GLANS unguentaria nascitur in Aethiopia, Ac= <sup>Glans vngue</sup>gypto, Arabia, & Petra oppido secus Iudæam. Præ= <sup>taria.</sup> fertur plena, recens, candida, quæ faciliè delibretur. Dioscorides.

GLAUCIUM aliqui ex corniculati papaueris gene= <sup>Glaucium.</sup>re fascitari existimârunt, falsi quadam foliorum cognatione. Diosc.

GLUTINVM, quod xylocollau, alij taurocolla uo <sup>Glutinum.</sup>cant, præstantissimum Rhodiaceum, quod ex bubulis co= rris conficitur. id candidum est & translucens. Nigrum uerò minus probatur. Diosc.

ICTHYOCOLLA, gluten piscium, uenter est pi= <sup>Glutinum pi</sup>scis cetacei. Præstat candicans, natione Ponticum, sub= <sup>scium.</sup>asperum, minime scabrum, & quod celerrimè liquefit. Dioscorides.

Gramen. GRAMINIS quod in Parnaso monte gignitur succus, si in uino cum melle pari, & myrrhæ dimidio decoquatur, adijcianturq; piperis & thuris tertiæ portiones, probatissimum erit oculorum medicamentum. id in ærea pyxide reconditur. Diosc.

## H

Hæmatites.



HEMATITES optimus habetur friabilis, saturato colore niger, durus & suapte ingenio æqualis, nulla sorde admista, nulloq; zonarum discursu. Vritur ut Phrygius, sine uino duntaxat. Modus uestionis est, ut modice leuis fiat, & bullis quibusdam intumescat. Sunt qui hæmatiten ita adulterant: Densam glebā rotundamq; scissi lapidis, cuiusmodi sunt quæ eius radices uocantur, in urceum figlini operis, qui seruentem cinerem contineat, condunt, paucaq; interiecta mora eximunt, experiunturq; si trita ad cotem hæmatitæ colorē reddat. quod si ita res se habet, reponunt: sin minus, iterū obruunt, & subinde conspicientes, periculū faciunt. siquidē in cinere diu dimissus, colore mutato diffunditur. Coarguitur male confectus, primū scissilibus uenis. quippe in rectos uenarū discursus resingitur. at hæmatites longē secus se in colore habet. namq; hic floridū reddit: hæmatites uero saturatiorē, atq; cinnabarin imitantē. Inuenitur in Sinopica rubrica. Fit & ē magnete lapide, uehementer ambusto. in Aegypto sponte naturæ cum metallis enascitur. Diosc.

Helcnij

HELENII radix æstate foditur, particulatimq; dissecta siccatur. Idem stomacho utile in passo conditum. siquidem salgamarum paululum siccata radicem, mox decoctam, & frigida aqua madefactam, in sapam conijciunt, & ad usum recondunt. Diosc.

HERMODACTYLVS ille melior censetur Me<sup>lus.</sup> Hermodactylus, qui & foris & intus ualde cãdicat: qui crassus est, & moderatam habet duritiem: quiq; iuxta Scyllam electio. aut Raphanum crescit. Rarus uero, laxus, & levis, imbecillus est uirtutis. At rubri & nigri mali eidem existimantur. Item qui in locis pinguibus, aut humidis nascuntur. hi enim superflua ac flatuosa humiditate secalent. Tempus autem legendis Hermodactylis magis accom<sup>tempus legẽ</sup> modum est uer. Itaque hoc tempore collecti Hermoda<sup>dis Hermoda</sup>ctyli, in usum ante annum dimidium non ueniunt assu<sup>ctylis accom</sup> mendi, ut Arabicæ familiæ scriptores consuluerunt. modum.

Cæterum cum dicit Mesue de rotundo Hermodactyl<sup>Hermodactyl</sup> lo tanquam de meliore se sermonem habiturum, id sane<sup>lus rotundus</sup> intelligendum est. Nempe Hermodactylum rotundum, Meliux. qui Colchicon est Ephemerum, meliorem ac perfectiorem esse, quod ad ea ad quæ ualeat pertinet, ut puta ad articulares dolores. Dosis Hermodactyli ipsi Mesue<sup>dosis.</sup> ab aureo uno usque ad duos. Internus autem uellicat, & grauem stomacho exæstuatione adfert, mustamq; cruorem strigentis in aluum depellit.

HORMINVM syluestre magis uiribus pollet. Horminum. Dioscorides.

HYOSCYAMI tres differentiæ sunt. una semine ni Hyoscyamus gro: floribus penè purpureis: snulacis folijs: cytinis



præduris, & spinosis. alterius semē subflauum, ut irio-  
nis: flores lutei. folia, & siliquæ simpliciores. ambo ma-  
santiam gignunt, & soporem. ideo in communi usu dan-  
nantur. tertium genus, ut quod nullissimum esset, medici  
recepte, pingue, lanuginosum, molle, candidi floris se-  
minisq; in maritimis & uerberibusq; nascens. cuius occasio  
si non adsit, rufum usui pari oportet. iuger, ut deterria-  
mus, improbatur. Recenti senune, caulibus folijsq;  
tusis, succus in sole exprimitur, & exiccato humore, u-  
sus ad animum usque prorogatur. nam facile corruptio-  
nem sentit. Extrahitur etiam ex sicco senune separatim  
in aqua calida tuso, & expresso. liquamentum autem suc-  
co lacteo præstantius est, & magis dolores finit. Contu-  
sa herba recens, addita trimestri farina, digeritur in pa-  
stillos, & reconditur. Diosc.

Hypocisthis. HYPOCISTHIS, erythraion, aut cytinus à nōnul-  
lis cognominata, iuxta cisthi radices nascitur, floris pu-  
nici similitudine. quædam flaua, altera uirens. tertia can-  
dida. Liquatur acaciæ modo. Aliqui tamen exiccant,  
fractantq; macerant, & incoquunt, reliquaq; ut in lycio  
prosequuntur. Vires acaciæ habet. utrum aliquantò ma-  
gis siccet, & astringit. Diosc.

Hyssopum. HYSSOPVM præfertur Hippocrati Cilicium, sed  
è Tairo monte. dein Pamphyliū, & Smyrneum. Ea  
delectus. hyssopus melior est Mesus, cuius odor & sapor ac-  
tiores sunt. ex utroque genere (scilicet hortensi & mon-  
tano) magna eidem præfertur. Tempus autem hyssopo  
colligendo accommodum est, dum incipit florere.

Decoctus ad tertias hyssopi manipulus cum sale, uel



contritus cum oxymelite & sale, pituitas trahit, Plinio.  
Decoctum uero cum aceto nullo, crassum humorē per  
aluum extrahit, Dioscoridi. Ad aluum quoque subdu-  
cendam cum ficis uiridibus detritis, eidem manditur.  
Decocti eius potio Mesue est, a drachmis sex usque ad <sup>dos.</sup>  
decem, & pulueris eiusdem quantitas, a tribus drachmis  
usque ad septem. Marardus maiorem longē quantitatem  
posse tuto dari arbitratur.

## I



INDICI duo genera. Vnum Indicum.  
sua sponte nascitur, tanquam spu-  
ma, germinatione Indicis arun-  
dinibus exiens. alterum insecto-  
rie dant officinae: & est spuma  
purpurea innatans cortinis, quā  
detraham artifices siccant.

Optimum existimatur, quod caerulei speciem præ se delectus.  
bet, succum suum sorbet, & læue est. Diosc.

IRIDI radices subiacent geniculatæ, duræ, odoratæ Iris.  
tæ: quæ frustatim dissectæ, in umbra siccantur, & tra-  
iectæ lino reconduntur. Teredines in uetustate sentiunt,  
tunc tamen odoratiores reddi solent. Diosc. Iris lau-  
datissima apud Illyrios exit, non tamen maritima, sed  
parte mediterranea, septentrionalibus obuersa, ubi radi-  
cis color subrufus, ut in Libyca candidus apparet.

Præfertur Mesue Iridis radix cādida, ruboris quoque Iris Mesue.  
dammodo particeps, grandiuscula, dura, spissa, Violam  
odore referens, sapore acuto & mordicante, & ( ut in-  
ter =

terpretis uocibus utar ) habens nodos breues collectos.

In Gallia funiculo traiectas Iridis ( quam Flammam uocant ) radices, lixiuo macerant, ad exhauriendam succi uim, quo tinearum iniurijs, quibus sunt opportune, minus pateant : dein siccitas recondunt. Plerique sic curatas armarijs indunt, ut suo perquam iucundo odore dosis. uestes commendent. Dosis radicum Iridis Mesue est à drachmis duabus usque ad sex. Dioscorides drachmas septem exhibet ex hydromelite. Paulus uero obolos octo dicit purgare, ut Agaricum, modo non sit antiqua aut perforata. Alijs, duabus tantum drachmis cum melle sumptæ aluum soluunt. Pro Illyrica aut Macedonica, Florentina hodie assumitur. Inter Illyricas & Macedonicas quæ meliores sunt, laudatissima putatur Dioscoridi quæ pumili ferè & densa constat radice, frangenti contumax, subrufa colore, gustu amaro, odore perquam suauis ac sincero, ita ut nullum prorsus situm redeleat : quæ dum tunditur sternutamenta mouet. Secundum locum habet eidem auctori Africana, candida, gustuq; amara.

Iuncus odoratus.

IUNCUS odoratus, in Africa & Arabia nascitur. Laudatissimus ex Nabathæa : proximus Arabicus, quæ aliqui Babylonium cognominant, alij teuchitin : pessimus ex Africa. Eligendus est rufus, recens, floribus refertus, tenuis, rubentibus fragmentis, qui manibus confricando rosæ odorem enutrit. igneæ mordacitatis ad linguam. Floris, culmorum, radicisq; est usus. Dioscorides.

## L



**L**AC probatur candidum, equa-  
li crassitudine, quod ungui instil-  
latum cogitur. Ex omni lacte fit,  
quod schistum, id est scissile, ap-  
pellant. Lac autem fistili nouo  
feruet, ramoq; ficulneo recenti  
mouetur, insparsis, postquam bis  
aut ter efferbuerit, totidem aceti mulsi cyathis, quot sunt  
heminae lactis. ita enim serefcens liquidum ab eo diuidi-  
tur, quod in caseum concreuit. sed cum feruet, ne super-  
fundatur, conueniet sponsia ex frigida continuò fistilis  
labrum detergere, sextariumq; argenteum frigidae aquae  
plenum demittere. Bibitur heminis per interualla singu-  
lis, usque ad quinas, ita ut intercedentibus spatijs, potan-  
tes ambulent. Diosc.

LACTVCAE sylvestris succus ad eadem ualet, sed Lactuca sylue-  
uilibus infirmior. Reponitur in fistili nouo lac eius, an- stris.  
tea, ut in alijs liquaminibus moris est, insolatum.

LADANVM fit ex altero genere cisthi, quod ledon Ladanum.  
aliqui uocant. Siquidem cum cisthi frondes pascuntur ca-  
pra, hirciq; pinguitudinem conspicue barba carpunt,  
& suo lentore uillosis cruribus adhaerentem repor-  
tant. quam depeccantes incolae, colantesq; cognunt in of-  
fas, & ita recondunt. Alij uero attractis funiculis, insi-  
dentem fruticibus lentorem abstergunt, conglomerantq;  
in ladanum. Maxime probatur odoratum, subuiride, fa-  
cile mollescens, pingue, quod arenas non collegit, nec  
squallore obsitum est, resinofum. quale in Cypro gigni-  
tur.

tur. Arabicum uerò Lybicumq; uilius. Diof.

Lana, & lana Succidæ LANAE molles è collo, seminisq; laudatissimæ habentur. Crematarum lanarum cinis medicamentis exquiritur. Vruntur autem mundæ, & carptæ, in fictili crudo, cæterorum more. Nec secus fimbriarum purpurarum flocculi cremari solent. Aliquæ cum sordibus lanas carpunt, & melle irrigant, eodemque modo urunt. Alij in fictili oris patuli, uerucula inter se distantia componunt, & conceptas carminasq; lanas oleo ita suffusas, ut ne stillare quidem possint, assulis tedæ subiectis, & eisdem lanisq; permutatum interstratis, leuiter succedunt, & uisus tollunt. Quod si è tedâ pix, pinguitudine ulla profluxit, collecta reconditur. Lauatur ad oculorum medicamenta. Cincrem in labellis, aqua addita, manibus confricant, & considerare patiuntur: idq; sepius, mutantes aquam, donec linguam astringat, nec mordeat. Diof.

Laserpitium. LASERPITIVM in Syria, Armenia, Media, & Libya nascitur, caule ferulaceo, quem maseptum uocant. Laser è radice atque caule scarificatis colligitur. præfertur autem rufum, translucens, myrrhæ æmulum, non porraceum, odore ualens, suauis gustu. quod dilutum facile albescit. Cyrenaicum si quis degustarit, humorem toto corpore ciet, blandissimo odore, adeo ut ne os quidem gustati nisi paululum spiret. Medicum & Syriacum minus uiribus ualent, & magis uirosam reddunt odorem. Laser omne antè quàm siccescat, adulteratur sagapeno, aut sabæ lonto, quod maleficiū deprehenditur gustu, odore, usu, & dilutione. Caulè aliqui silphion, radicem

ma gudarín, & folia masspeton uocauere. Efficacissimum  
laser, mox folia, postremo caulis. Diosc.

LATHYRIDIS succus tithymalli modo exceptus, Lathyrís.  
eundem effectum præbet. Diosc. Grana huius se= dosis grano=  
ptem aut octo deuorata, aut pota, aluum purgant. Hæc rum catapo=  
cum sicu sicca, uel palmulis sumuntur Dioscoridi. Sed tæ minoris,  
aqua frigida postea sorbenda. Multis abundè grana id est lathyri=  
tria uel quatuor uentrem deiciunt, ut quotidiana rusti= dis.  
corum experientia discitur. Quòd si hæc uera sunt, su=  
bit admirari quomodo Lathyrís grana uicena in aqua huius senten=  
pura, aut malsa semel pota, hydropicos sanare quidam tie fuit Plini?  
memoriæ prodiderunt. Nimis enim excellere mihi hæc  
dosis uidetur. Folia cum gallinaceo iure, aut oleribus de=  
cocta, eandem habent seminibus operationem, ut nobis  
auctor fuit Diosc.

E LENTISCO liquamentum ita fieri solet: Folia, Lentiscus.  
cortex & radix in aqua coquuntur, & ubi abundè co=  
cta refrigeratæq; sunt, folia abijciuntur. aqua denuo co=  
quitur, donec mellis habeat crassitudinem. Diosc.

LIGUSTICO pro pipere utuntur indigenæ, ad Ligusticum.  
obsonia. Adulteratur semine quodam simili. quod facile  
gustu discernitur: amarum enim est. Alij semen fœnicu  
li aut seselis admiscetes, ligusticum dolo utiant. Diosc.

LILII sciliorum succus adiecto melle aut aceto in Liliū.  
æreo uase coquitur, ad ulcera uetusta, & recentia uula  
nera. Diosc.

LORA, quam deuteriam, alij potimon appellant, sic Lora.  
ri solet, adiectis metretis tribus aquæ, in uinacea, quibus  
triginta uini metretæ extractæ fuerint: calcatis uinaceis,  
expres=

expressoq; decocto ad tertias parteis, & additis in singulos congios modi eius qui remansit, binis salis sextarijs. post hyemem transfunditur in uasa. Lora intra annum utendum. etenim celeriter exolefcit. Cōuenit & agris quibus timemus noxam uini, coacti sæpe desiderijs eorum obtemperare. item à longa ualetudine se recolligentibus. Fit & uinum quod adynamon uocant, loræ uires habens, hoc modo: Pares aque & musti mensura coquantur molli igne, donec absumatur aqua. quod, ubi refrixerit, elutriatum, picato uase reconditur. Alij mærinæ & celestis aquæ, mellis & musti pares miscent portiones, decapulant, & quadraginta diebus insolant. quo ad annum utuntur ad omnia eadem. Diosc.

**Lycium.** LYCIUM nascitur plurimum in Cappadocia, Lycia, & plerisque alijs locis. aspera loca amat. Succi extrahendi ratio hæc est: Rami cum radiculis tusi & ante per multos dies macerati coquantur, tum abiectis lignis itidem liquor, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id lycium, adiecta decoctioni amurcæ, aut absinthij succo, aut felle bubulo. Innatans spuma inter coquendum exempta, oculorum medicamentis additur. reliquo ad alia utuntur. Simili modo fit lycium, semine expresso & insolato. Optimum quod uri potest, resinumq; rubentem spumam ostendit, glebis extrinsecus nigris, intus, cum frigeris, rufis, odore minime uiroso, cum amaritudine adstringens, crocino colore, cuiusmodi Indicū est, cæteris præstantius. Diosc.

**Lyncis vrina.** LYNCEIS irinam, quam lyncurium appellant, simulac excernitur, glaciari coiréue in calculi diuturnam, uulgo



uulgo creditum est. quare quod de ea proditum est, uerum esse conuincitur. est enim quod à nonnullis uocatur succinū pterygophoron, quod pēnas alliciat. Diosc.

M



**MAGNES** lapis optimus, qui Magnes. ferrum facile trahit, colore ad caeruleum uergente, densus, nec admodum grauis. Diosc.

**MALABATHRVM** *arbi-* Malabathrū.

trantur aliqui esse Indici nardi folium, falsi quadam odoris co-

gnatione. per multa enim nardum olent, quemadmodum pphū, asarum, niris. secus autem res se habet. Nanque malabathrum folium sui generis est, quod Indiae gignunt paludes, lentis palustris modo innatans aquis, sine radice. Id collectum statim lino transsulitur, & siccatum reconditur. Tradunt siccatis aestiuo feruore aquis, humum aridis fruticibus uri: quod ubi non euenerit, ne amplius quidem renasci. Laudatur recens, ex candido nigricans, delectus. integrum, nec fragile, odore caput feriens, quod diu in suauī odore permaneat, & nardum sapore imitetur, nullo salis gustu. Infirnum uerò & minutim contusum, praesertim si cariosum uirus olet, uitiosum est. Easdem nardo sortitur uires, sed efficacius omnia praestat. Vri nam uehementius ciet, ac stomacho magis prodest malabathri uis. Diosc.

delectus.

**MANDRAGORAE** succus fit e cortice recentis ramū Madragoras dicis tuso, & praelis subiecto: qui insolatus ubi concre-



uerit, fiftili reconditur. Malis quoque succus depromitur, sed aliquanto ignauior. Delibratur radix, & traiecitur lino cortex, ad usum suspenditur. Scarificata punctusq; multifariam aperta radice, erumpens lachryma, cauo uase recipitur. liquamentum autem succo lacteo praestantius est. sed non ubique, ut experientia docet, radices lacteum succum delachrymant. Diosc.

Manna. MANNA illa optima censetur, quae recens est, splendens & candicans, gustu melleam dulcedinem repraesentans, nullos surculos aut foliola implicans. huic proxima est subcitrina. pessima est fusca, coenosa, antiqua. Adulteratio. Impositores Mannam adulterant cum saccharo & folliculus senae. Sed fraus detegitur, quod procedente tempore mollescit, & liquefit. Itaque tamen si Manna ijs quibus infederit ita pertinaciter aliquando haereat, ut non nisi cum fragminibus eorum decerpatur, ad dolum tamen euitandum, praestat eam eligere quae nullis lignorum aut foliorum fragmentis admixta est. Dosis Mannae Serapioni est à drachmis decem ad uiginti: Mesuae à drachmis sex usque ad quindecim: Alijs ab uncia una dari potest ad uncias tres.

Marrubium. MARRUBII succus folijs tuis exprimitur, & sole cogitur. Diosc.

Lentiscina. Lentiscus resinam gignit, quae LENTISCINA cognominatur, & ab aliquibus MASTICHE. Optima & copiosissima in insula Chio prouenit. Praefertur nitedulae modo resplendescens, & candore Turrhenicae ceræ similis, adulta, retorrída, friabilis, odorata, stridorem ædens. Viridis autem inferior est. Adulteratur thuris resina

resinæq; pineæ nucis mustura. Diosc.

MEDVLLA laudatissima est ceruina. mox uitulina. Medulla. post hanc taurina, dein caprina, & ouilla. Colliguntur æstatis exitu, cum appetit autumnus. quippe cum alijs anni temporibus concrementum sanguinis, & ueluti caro friabilis, in ossibus inueniatur. nec facile cognosci potest, ni quis eam ossibus extrahat & recondat. Curantur recentes, adipis modo, aquæ respersu subactæ, selectisq; ossibus tantisper elotæ, & in linteum expressæ, donec aqua sincera emanet: & detergsa sorde pinna, siqua innatet, liquatæ in duplicato uase in pilam exprimuntur. & ubi coiere, omni fæce, quæ ad ima sidit, detrasa, fictili nouo reponuntur. quod si libet incuratus reponere, facito omnia quæ de anserum & gallinarum adipe demonstrauius. Diosc.

Principem locum obtinet MEL, quod Atticæ regio= Mel. nis est, præcipuè ex Hymetto, mox Cycladibus insulis, & è Sicilia, cognomine hybleum. Magis probatur dulcius & acre, odoratius, subflauum, nec humectum, graue, & minimè fluxum, quod ob sequacem lentitiam non facile abrumpitur, tractumq; resilit in digitos. Primatum tenet in mellis genere uernum. deinde æstiuum. hybernum uerò, utpote quod crassius constet, deterrimum reputatur. ceraginis halitum expirat. Diosc.

MELANTERIA genuinæ est originis, quædam in Melanateria. faucibus cuniculorum quibus æs eruitur, salis modo, con crescit. alia uerò in summa facie supradictorū locorum coit, quæ terrena est. quinetiam inuenitur in Cilicia, & alijs quibusdam regionibus, fossilis quædam. Præstat,

quæ sulphuris colorem trahit, lævis, pura, æquabilis,  
 & quæ contactu aquæ confestim nigrescit. Vim caustica  
 cam eam obtinet, quam & misy. Diosc.

Melilotos, siue Sertula câ  
 pana.      MELILOTOS, siue SERTULA Campana lutea  
 datissima in Attica & Cyzico & Chalcedone nata, cuius  
 ius color uicinus est croco, boni odoris. Nasctur & in  
 Campania circa Nola, colore in luteum languescente,  
 odore infirmo. Diosc.

Misy.      MISY assumendum natione Cyprium, auri simile,  
 durum, quod friando auri colorẽ imitatur, & stellæ mo  
 do splendet. Vim habet & uersionem cum chalcitide ean  
 dẽ, præter quàm quod psoricũ ex eo non conficitur, ex  
 cessus defectusq; ratione tantũ diffrens. Aegyptiũ autẽ  
 cæteris præstat, utpote quod efficacius habeatur. sed ad  
 ocularia medicamenta multo supradicto inferius. Diosc.

Molybdæna.      MOLYBDÆNA optima est flaua, argenteæ spumæ  
 æmula, modicè splendens, cum teritur rufa, cocta cũ oleo  
 iocineris colorem trahit. Vitiosa est quæ aërem, aut colo  
 rem plumbeũ refert. Gignitur ex auro, & argento. Est  
 etiam quædã fossilis ad Sebastia, & Corycũ inuẽta, quo  
 in genere probatur, quæ lapidosa nõ sit, aut recremen  
 tosa, sed nitens, & flaua. Vim habet spumæ argenti, aut  
 recremento plũbi simulẽ. Vritur, lauaturq; eodẽ modo.

Mori succus.      MORI succus. decoctus autem æreo uase atq; insola  
 tus, adstringẽtiõ redditur. Diosc. Sed inolefcit uis eius,  
 adiecto scissili alumine, galla, croco, & myrrha. itẽ my  
 rica semine, iri, & thure. Immatura mori poma sic  
 cantur, tusaq; acinorũ rhois uice obsonijs muscentur, ut

Mori radix. coliacos iuuent. MORI radix circiter mense incisa, fa  
 cto in

elo in ambitu scrobe, succum emittit, qui postmodum con-  
cretus inueniri solet. Diosc.

BRYON, id est MYSCVS, à quibusdam splachnon Bryon.  
appellatur. in cedro arbore, populo alba, & quercu in Muscus.  
uenitur. Optimum est cedrinum: proximum populneū.  
in quo genere candidum & odoratiùs præstat, nigri-  
cans improbat. Diosc.

MYROBALANI lutei seu flauī, quos citrinos uo= Myrobalani  
cant, ex herbaceo colore flauescētes, eligendi sunt spiss= vel myroba-  
si, graues, seu ponderosi, exili nucleo, cute crassa, & lana secundū  
gummosi. Cepuli, deligendi sunt, ampliores, grauior= Arabes.  
resq; ex fusco rufescentes, hoc est subnigri, uergentes Cepuli. 2.  
ad ruborem, carnosī, spisso cortice. Empelatici, siue Empelatici. 3  
emblici eligi debent, cute ossibus hærente, lapillorū pe-  
nè figura, carne ampliore, minutis ossibus, densi & gra-  
ues. Belethzici, eadem quasi forma spectantur qua em Belethzici. 4.  
pelatici. eligendi ergo sunt maiores, crassiores, cortice  
densi, & pōderosi. Nigri, quos à colore caruleo uul Nigri. 5.  
gus Indos nominat, eligendi sunt solidi, sine nucleis, oli-  
uæ forma, ponderosi. hi à recētiore Græcia Damasonij  
uocantur. Ea omnia Myrobalanorū genera seu dis-  
ferentiæ, ab officinis ostenduntur. Quibusdā genere neu-  
tro effertur, & hoc ordine digeruntur, Lutea seu fla-  
ua, Inda, Cepula, Empelatica, Belethzica. Dosis My dosis.  
robalanorum est à drachmis duabus ad semunciam, uel  
drachmas sex in infusione: & à drachma una ad duas  
in substantia, ut uoluit Mesue. Myrobalani Actio, bi-  
nūm, aut ternūm denariorū pondere triū peculiariter su-  
peruacuū capitis humorē exhauriunt: sed flaua, bilē fla-

uam : atrā, nigra detrahunt : quēadmodū pituitā cepuli.

Myrrha. MYRRHA lachryma est arboris, quæ in Arabia gignitur, Aegyptiæ spinæ non dissimilis. è cuius uulnere defluit lachryma in subiectas tegetes. alia circum caudicem concreuit. Dicitur ex his aliqua pediasimos, præpinguis, quæ expressa, stacte emittitur. alia gabirea, pinguisima, læto & pingui solo nascens. ea copiosam suadat stacten. Omnium prima est, quæ troglodytica appellatur, accepto cognomine ab loco, in quo prouenit, splendens, subuirdis, ac mordēs. quinetiā legitur tenuis quædam, quæ à troglodytica secunda est, bdellij modo molilis, uerum odore grauiuscula, apricis nascens. Alia caucalis cognominatur, præter modum exoleta, nigra, & retorrida. Omnium deterrima, quæ ergasima dicitur : pingui carens, cano situ obducta, acris, ad gummi inanginem uergens, & uiribus eius proxima. improbatur aminnea cognomine. ex ijs pastilli fiunt, sed è pinguibus pingues, & odorati : è siccioribus haudquaquam pingues, & inodorati. minus odore pollet, quæ oleum non admisit, cum in pastillos digerebatur. Adulteratur macerato gummi aqua, in qua myrrha maduerit. Eligenda est recens, squallore obsita, leuis, undique concolor, quæ confracta uenas unguium modo candidas & læues ostendat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciens. superuacua & inutilis est pōderosa, coloris picei. Diosc.

Fit è myrrha, perinde atque thure, fuligo, & ut postea ostendemus, ad eadem conueniens. Diosc.

Myrrha Bæotica.

Bæotica MYRRHA, dissecta radix est arboris eiusdem in Bæotia nascentis. Melior est quæ myrrham odore

odore representat. Diosc.

MYRTI baccis uirentibus succus exprimitur, item Myrtus. folijs adfuso uetere uino aut aqua celesti. Cuius recens-  
tus usus est. Nam exiccatus planè cariem sentit, & uires  
amittit. Diosc.

MYRTIDANVM dicitur adnatum inaequabile, uer Myrtidanū.  
rucosum intumescensq; & concolor. quod perinde quā-  
si manus myrti caudicem amplectitur. magis quàm myr-  
tus adstringit. tusum addito austero uino reponitur, coa-  
ctumq; in pastillos siccatur in umbra: multo efficacius  
& folio & semine, cerato, pēsis, in seſsionibus, cataplas-  
matis admustum, ubi adstringendum aliquid est. Diosc.

N



ARDI duo genera: unum In Nardi gene-  
dicum, alter ū Syriacum appella ra.

tur, nō quòd in Syria proueniat,  
sed quòd montis in quo oritur,  
pars una ad Syrios, pars altera  
ad Indos flectitur. Ex hoc Syria  
ci genere præcipuum est recens

& leue, largā gerens comam, flauum colore, perquā  
odoratum, ac cyperū redolens, breui spica, anaro sapo-  
re, linguā siccante, quod diu in sui odoris gratia perma-  
neat. Ex Indicis autē nardum quoddam Gangitis uoca-  
tur, à fluuio Gange, apud quem enascitur, montem præ-  
terfluente. quod genus ob multā loci, in quo prodit, uli-  
ginem, uiribus infirmius est, atq; procerius adolescit, plu-  
res ferēs spicas ab unica radice, comosas, unaq; conuolu-  
tas, ac grauiter olentes. Montanum autē odoratius, spica

breui ac mutila, odore cypero uicino, cæteras habens Syriaci dotes. Est & genus quoddam cui Sampharitico nomen locus indidit, frutice breui, in magnas se spargens spicas, candidiore interim medio caule, hircorum uirus supra modum redolente, quod improbat. Madefactum uendi solet. quod uitium ex eo deprehenditur, quod candida sit spica & squallida, nulloq; puluere obsita. Adulteratur stilbio cum aqua aut palneo uino, inspissationis ponderisq; causa inspirato. Intueri autem oportet si luteum radicibus insideat, & incerniculo puluerem excutere, eluendis manibus utilem. Diosc.

Nardum Celticum.

NARDI Celtici cauliculorum & radicū duntaxat usus est, & odoris suauitas. unde pridie fasciculos aqua ablueri expedit, & exempta terra paulo solo atq; humenti subiecta charta reponere, postridie repurgare. siquidē utile, cū aceroso, alienoq; propter humoris um, non excutitur. Adulteratur imposita herba simuli, que hirculus uocatur, ab odoris grauitate: sed facilis cognitio. nanque herba candidior est, sine cauliculo, minoribus folijs, radice neq; amara, neq; odorata, uti uerū nardum est. Itaq; radices atq; cauliculi, abiectis folijs triti secerantur, uino excipiuntur, digerunturq; in pastillos, & ita fictili nouo diligēter operto, afferuari debent. Laudatur maximē recēs, iucūdi odoris, radice numerosa coherens, plenū, nec fragile. Ad eadem quæ Syriacū pollet: sed uehementius urina cit, & stomacho utilius est. Diosc.

Nitrum.

Præfertur NITRVM leue, roseo colore, aut candido, in foramina debiscens, perinde quasi spongiosum quiddam. quale ex Bumis affertur. Diosc.

NITRI



NITRI spuma optima esse putatur, leuissima, glebo-  
sa, friabilis, colore penè purpureo, aut spumosa, & mor-  
dens. qualis ex Philadelphia Lydie defertur. secūda est  
Aegyptia, quin & in Magnesia Cariae gignitur. Vim  
& uestionem salis habet, tan nitrum quam spuma eius.  
Aliqui supradicta carbonibus urunt, subiecta prius testa  
nova, donec incandescant. Diosc.

O



ENANTHE uocatur uitis Oenanthe.  
syluestris fructus, cum floret.  
Recondi debet fictili non pica-  
to, collectique, substrato linteo,  
in umbra siccatur. Laudatissima  
in Syria & Cilicia & Phœni-  
ce. Diosc.

OESYPVM uocant Græci, succidarum lauarum pin-  
guitudinem. Cuius parandi ratio hæc est: Succidæ mol-  
les, radícula non curatæ, calida aqua lauantur, & qui-  
buscunque sordibus expressis, & in Labellum oris am-  
pli coniectis, aqua infunditur, magnoq; impetu ligula, uti  
respumet, agitatur, aut lignea rude ualidiusculè contur-  
batur, quò largius sordida spuma colligi possit, deinde  
marina respergitur. & cōsidente pingui quod superna  
tabat, collectoq; in altero fictili uase, denuo aqua in Label-  
lum fusa agitatur. spuma iterum mari perfunditur, &  
denuo eximitur. hoc tantisper fieri solet, dum consum-  
pta pinguitudine nihil prorsus spumæ extet. collectum  
æsopum manibus emollitur. & si qua insedit spurcicia,

confestim demitur. exclusaq; sensim omni aqua, recentiq; affusa, manibus misceatur, donec admotum lingue cessum, adstringat leuiter, nec mordeat: atque pingue candidumq; spectetur. tum in fictili uase conditur. Verum omnia fruido sole fiant. Nonnulli excolatum pingue frigida aqua eluunt, & manibus, non secus atque ceratum mulieres, confricant. ita enim candidius redditur. Alij elotis lanis & sordibus quibuscunque exemptis, ac lenito igni in æneo uase ex aqua decoctis, pingue quod supernatat collectum, aqua, ut diximus, lauant: colatumq; in fictilem patellam, quæ calidam aquam contineat, limteo operiunt, atque soli mundant, donec candidum fiat, & satis crassum. Alij bidui spatio aqua effundunt, non uamq; adiiciunt. Melius est læue, radícula non curatū, quod succidarum uirus oleat, & si manu in concha fricetur cum aqua frigida, albescat, nihil in se duri aut concreti habens. ueluti quod cerato aut adipe adulteratur.

Oesypum in testa noua torretur, donec redactum in cinerem, pinguitudinem amittat. Ex eo etiam fuligo colligitur, uti demonstrauimus. quæ in oculorum medicamenta commode addi solet. Diosc.

Oleæ æthiopica  
lachryma.

OLEAE Aethiopica lachryma scammoniae similis est, fulua, stillis exilibus constans, mordax. quæ autem ammoniaci, aut gummi similitudinem refert, colore nigricans, nec gustu mordens, superuacua est. Nostrates oleæ, oleastrisq; similem lachrymam sudant. Appellatur autem Aethiopica, & agrestis olea. Diosc.

Oleum candidum.

OLEVM candidum fit hoc modo: Album colore nec anniculo uetustius, in nouum fictile oris patuli funditur,

centum

tentū heminarum mensura, & sub solē media quaq; die  
cōcha refunditur: ex altoq; demittitur, ut assidua deuolu  
tione, istūq; agitatū respumet: octaua die fornū græcū  
mundum quinquaginta denariorum pondere, calida aq  
qua madefactū donec emollescat, in supradictū oleum  
deijcitur, ita ne extillet aqua. postea tedæ præpinguis  
picæ, assulatim cæsæ æquale pōdus adijcitur, & trans  
actis octo diebus, oleum concha mouetur. Vbi candorem  
contraxerit, in uas nouum uetere uino affusum recondi  
debet, substratis fertulæ Cāpanæ corollis drachmas un  
decim pendentibus, cum pari iridis pondere. sin minus,  
rursus soli mandandum, & idem munus obeundum, us  
que dum inalbescat. Diosc.

OLEAE silyuestris exprimitur succus tuis folijs, affuso uino aut aqua, siccatusq; sole in pastillos digeritur. sed longē ualidior ad recondendum succus habetur, qui cum uino quā cum aqua expressus est. uruntur cum floribus folia, ut spodij uicem cinis præstet, in cruda ola, oblito ore luto, usque dum figlinum percoquatur. resinaq; uino & rursus subacta, eodem modo uruntur. postremo cerusæ modo elota coguntur in pastillos. Huiusmodi cinerem in medicamentis oculorum constat spodio non cedere, sed eisdem uiribus præditum esse putandum est. Foliorum satiue oleæ eadem uis intelligitur, sed aliquanto inferior. unde ocularibus medicamentis ob suam nutiorem uim conuenientior est. Sudor ligno uirenti accenso manans, illitu sanat lichenas, furfures, & scabiem. Diosc.

OLEI sic: onij componendi ratio hæc est: In lebetem  
Oleum Sic.  
oris ouium.

oris lati sturno inductum, funditur olei albi quod crude oliue reddiderūt, congius unus, aque semicongius. leni id igne coquitur, leniter mouendo. at ubi bis effebuit, & subtracto igne refrixit, innatis oleum concha decapulatur, & adiecta noua aqua confertur, & reliquis ut diximus peractis reponitur. In Sicronia maxime fieri consuevit, Sicronij inde accepto cognomine. Calafioriam ad quendam usque modum uim habet. Febri ac neruorum uitij prodest. scumae ad commendandum faciei nitorem eo utuntur. Diosc.

Oleum omphacinum.

Omphacinum appellatur OLEVM, quod ex immaturis oliuis exprimitur. Praestat recens, odoratum, quod non mordeat. Tale unguentorum compositionibus idoneum intelligitur. Diosc.

Omphacium

OMPHACION, succus est acerbae uuae, nondum maturefcentis e Thasia uite, aut Anunaea. Oportet autem ante canis ortum, expressam melliginem in rubro aere, linteo cooperto, insolare, usque dum cogatur: semperque quod ceruici uasis coactum haesit, reliquo humori permiscere. noctu a subdialibus locis in lectu referri. quandoquidem nocturni rores ipsum concrefcere non sinunt. Eligendum est flauum, friabile, uehementer adstringens, & linguam mordens. Sunt qui coquendo melliginem cogant. Diosc.

Opium.

OPIVM optimum habetur graue, & densum, gustu amarum, odoratu soporiferum, quod facile aqua diluitur, laeue, candidum, neque asperum, neque grumosum, quod inter colandum non ut cera coeat, & in sole diffundatur. dein admotum lucernus, non atra luceat flamma,

extin

extinctum deniq; odoris vim conseruet. Sed opion glaucio, gummi, aut sylvestris lactucæ succo, adulterant. Verum glaucio fucatum, in dilutione croci colorem reddit: lactucæo succo fictum, exiliter spirat, & asperius spectatur: gummi uitiatum, splendescit, & infirmum est. Nec desunt qui eò dementiæ deuenerint, ut adipem ei admiscerent. Fictili nouo torretur ad oculorū medicamenta, dum mollius, atque rufius appareat. Diosc. Vide plura in PAPAVERE.

P



ALMA, quam aliqui Elaten Palma elate. aut Spatham appellant, fructus Spatha.

palmarum adhuc florētium, inuolutū est calyxq; quo in spissamenta unguentarij utuntur.

Optima habetur odorata, astringens, ponderosa, præclusa, intus

pinguis. Inuolutusq; in ea elate fructus, quem suo amplexu fouet, elate etiam uocari solet, & ab aliquibus borassus. Adstringit, & spathæ effectus præstat, non sic unguentis expetitus. Alba medulla caudicis recens in cibo, aut decocta eadem facit quæ borassus. Diosc.

Nuclei PALMARVM, cæterorum more cremati Palmarum in crudo fictili, & uino restincti, cinere loto, spodij uinucem efficiunt. nuclei. muscenturq; in calliblephara. quod si non iustam unctionem acceperint, denuo cremandi. Diosc.

PANACES nascitur in Cyrene Libyæ, & Macedo Panaces. nia. Excipitur succus incisa radice, recenti caulū pullulatu. ea candidū succū emittit, qui siccatus in summa cute croceum

crocceum colorem contrahit. Effluentem autem succum excipiunt, folijs excauato solo stratis, quæ siccata tolluntur. Simili modo caule messibus inciso, profluentem succum eximunt. Meliores ex radicibus, albæ, rigentes, distentæq; siccæ, quæ cariem non sentiant, aromaticæ, feruentes gustu. Fructus ex media ferula cibo idoneus est. sed ex agnatis stolonibus, ab usu cibario abhorret. Maxime in hoc succi genere probatur, quamamarissimus, interne albus, aut subfuluus, foris ad croci colorem incli nans, leuis, pinguis, friabilis, tener, statim in aqua elique scens, graui odore. niger improbatur, ac mollis. Adulteratur ammoniaco aut cera. Sed synceri experimentum est, si digitis in aqua friatus resoluator, & lactescat. Dioscorides.

Pancreatium.

PANCRATIVM scillæ uires & præparationem habet. eodemq; pondere in morbis efficaciter assumitur. cui tamen nutior quàm scyllæ facultas inest. Radicis succus cum erui farina digeritur in pastillos, qui hydropicis splenicisq; cum hydromelite, commodissimè dantur. Dioscorides.

Papaueris calyces.

PAPAVERIS calyces tunduntur uirides, & digeruntur in pastillos, qui siccati ad usum reconduntur. Capita quoque per se in aqua coquantur ad dimidias, iterumq; adiecto melle, dum humor coëat in eclegmatis lentorem. id medicamentum in tussi, arteriæ fluxionibus, & cœliacorum affectu, doloris leuamentum præbet. efficacius tamen redditur, addito hypocistidis succo, & acacia. Dioscorides.

Papaueris nigri capita & folia.

DE MECONIO & OPIO. Aliqui capita ipsa, nigri



nigri PAPAVERIS & folia tundunt, & prælo exprimunt, terentesq; in mortario, digerunt in pastillos. id Meconium uocatur, multum opio ignauius. Porro opij Meconiũ & faciundĩ ratio hæc est: Cũ ros in eo exaruerit, cultro <sup>Opium.</sup> decussatum in stellas, ne penitus adigatur, ex obliquo in rectum summa cute incidere oportet, lachrymam excutentem, digito in concham abstergere; nec multo post redire, ut concreta inueniatur. etenum quæ tum, aut postero die etiam offenditur, in uetere pila teri debet, & in pastillos cogi. cum tamen inciditur, retrocedendum est, ne uestibus succus deradatur. Diosc.

PEPLI fructus tusus & seruescens reconditur. Peplis. Pepli semine poto, aluus soluitur. Media potio est dolis. acetabuli mensura in aquæ heminis tribus: & cibus inspergitur, obsonijsq; ad molliendam aluum. Peplus colligi, & reponi ac dari, uti peplos, & sale condiri solet. Easdem habet uires. Diosc.

PEPONIS succus cum semine, adiecta farina, sic= Pepo- catus in sole cogitur in smeignata, quæ faciem repurgat, & nitorem asserunt. Diosc.

PEVEDANI tenera radix cultello conciditur, Peucedanũ. profluensq; è plaga succus umbræ mandatur. in sole siquidem confestim euanesceit. Colligitur capite prius & naribus rosaceo persusis, ne capitis dolor premat, & uertigo sentiatur. assatione radix inutilis fit. Tamen lacquim succus radice & caulibus extrahi solet, sicuti è mandragora. uerum inefficacior succo lachryma habetur, & uelocius expirat. Interdum etiam concreta inuenitur lachryma, thuris similitudine, caulibus radicibusq; adher



adhærens. Præfertur succus è Sardinia & Samothrace, colore rufò, odore graui, feruens gustu. Diosc.

Phrygius lapis.

PHRYGIUS lapis, quo infestiores in Phrygia utuntur, à qua nomen accepit, nascitur in Cappadocia. Optimus habetur pallidus, modicè grauis, non solida corporis compage, intercedentibus albis segmentis, ut in cadmia. Vritur autem uino optimo persusus, uiusq; carbonibus obrutus, perflatur assidue follibus, donec inutato colore rufescat. rursus extractus eodem uino restinguitur. hoc iterum & trinis uicibus faciendum. attendendū tamen, ne minutim confringatur, & in fuliginem euanescat. Lauatur ut cadmia. Diosc.

Phu.

PHU adulteratur radice rusci ammissa: sed maleficium deprehenditur: quoniam hæc dura est, & frangenti contumax, sine ulla odoris gratia. Diosc.

Piceæ & Pini fuligo.

PICEAE & PINI fuligo ad calliblephara, & librarij atramenti confectiōnem excipitur. Diosc.

Picis liquida fuligo.

PICIS fuligo liquida fit hoc modo: In lucerna noua quæ ellychnium habeat, nonnihil picis incendio, lucernamq; fictili uase in clibani speciem conformato, superius in angustum fornicato, inferius perforato, ut clibani esse solent, operito, & adoleri finito: consumptoq; liquore nouum infundito, quoad sufficientem usui fuliginem collegeris. Diosc.

Picinū oleū

E pice fit quod VISSELLAEON appellant, separato liquore aquoso, qui supernatat pici, sicut serum lactis. Nam expansa, quādiu pix coquitur, supra cortinam uellera pura madescunt, acceptoq; halitu eius exprimuntur in uas. Quas pix liquida, præbet utilitates. Diosc.

Piper

**PIPER** nigrum, utpote quod tempestiua maturitate Piper nigrū. collectum sit, odoratum esse constat, candido suauius, acrius, & ori gratius, necnon ad condimenta utilius. sed candidum, & adhuc in acerbum uergens, albo & longo infirmius est. Eligi oportet grauisimum, plenum, nigrum, sine multis rugis, recens, minime fursurosus. Inueniuntur etiamnum in genere nigri semina nutrimento defecta, cassa, inania, nunimūq; ponderis, quod uocant brasma. Diosc.

**PISCIVM** fluuiatilium pinguia perunctis oculis clausa Piscium fluuiatilitate adferunt, si in sole liquecant, & melli admisceantur. Diosc.

Nascitur in Apolloniatarum agro circa Epidaurum quæ PISSASPHALTOS appellatur. Ea Cerauijs Pissaspfaltū. montibus deuoluta, impetu fluminis rapitur, æstuq; in litus expuitur, illic coacta in glebas. nustum bitumini picem redolet. Diosc.

**PITYUSAE** (alsebram uocat Mesue, nostri esu Pityusa. Lem) corticis radice dosis est, à ceratjs duobus usque ad dosis septem, & lactis ab uno ad tres. Quæ nimis est exigua quantitas. Dioscorides namq; radice pityusæ drachmas duas, fructus unam, succi cochlearium, foliorum ternas drachmas exhibet.

**PIX** arida. liquida pix decocta in spissam coit, quam Pix arida. uocant aliqui palimpissam. quo in genere quædam uisci modo lentescit, boscas cognominata. altera sicca est. Probatur pura, pinguis, odorata, subrufa, resinosa. Talis Brutia & Lycia, picis resinæq; simul naturam habentes. Diosc.

Plumbum  
clotum.

**Lotura PLUMBI** sic fit: In mortarium plumbeum aquam iniiciens, pistillo plumbeo terito, donec nigrescat aqua, & limi modo crassescat, aut lutulenta reddatur. limi teolo deinde colato, aquam superinfundens, quo facilius quicquid est resolutum incerni possit. hoc iterum facito, usque dum satis tibi habuisse uideatur. ubi consederit, priore aqua effusa, nouam adijciens, ut cadmean lauato, donec nulla extet nigritia. postea in pastillos cogens reaponito. Quidam scobem mundi plumbi lima quassitam, mortario pistilloq; lapideis terunt, aut manibus cum aqua paulatim adiecta fricant, donec nigrescat. mox ubi id pessimum icrit, effusa aqua, colligunt in pastillos. nam tritum uehementer, ceruse simile redditur. Alij elimate scobi modicam plumbaginem adijciunt: affirmantes ita clotum plumbum praestantius esse. Diosc.

Plumbum  
vstum.

**Vritur PLUMBVM** sic: Super quam tenuissimas plumbi laminas, fictili nouo inditas, sulphur inspargito, additisq; alijs rursus laminis, interiecto semper sulphure, usque dum uas expleueris, succendito. flagrans autem plumbo, ferrea rude uersato, donec perfecte redigatur in cinerem, nihilq; e plumbo non usum haeserit. tum demum obstrictis naribus, eximito. alioquin halitus plumbi noxius sentitur. Aut elimate plumbi scobem in olla cum sulphure urito. Alij laminas in fictili crudo, ut dictum est, imponunt fornaci, aut foco, & circumlinentes operculum, dato exili spiramento, urunt. Alij pro sulphure ccrusan aut hordeum inspargunt. Alij integras laminas imponentes, acri igne utuntur, & rudicula ferrea continue mouent, dum in cinerem soluantur. sed diffi-

cilis

cilis huiusmodi ustio, & si uehementius uratur, contrahit spumæ argenti colorem. magis tamen nobis placet prima urendi ratio. Plumbum ustum lauatur ut cadmia, & reconditur. Eosdem effectus habet, quos plumbum elotum, sed nullo acriores.

PLUMBI recrementum, quod scoriam uocant, optimi Plumbi recrementum est, densum, fractu cōtunax, cerusam planè repræsentans, nihil plūbosi habēs, quod ad luteū colorem accedit, & uitri splendorem imitatur. Eadem quæ plumbū exustum potest, sed magis adstringit. Lauatur in mortarijs infusa aqua, & refusa summa aquæ parte, quæ luteū colorem duxit. idq; sæpius, dum recrementum absumentur. dein ubi confederit crassamentum, aqua effusa, digeritur in pastillos. MOLYBDOIDES lapis à plumbi similitudine dictus, respondentem recremento uim habet, & eodem modo lauatur. Diosc.

mentum.

Molybdoides lapis.

POLIVM melius est montanum. Diosc.

Polium.

Melius & efficacius est POLYPODIVM quod in uetustis arborum, & maxime montanarum quercuum nascitur, quàm quod in petris inuenitur. Hoc enim superfluam habet humiditatem, & (ut inquit Mesue) indigestam, quæ flatum, nauſeam & stomachi subuersionē excitat. Illi autem querno Polypodio bonitatis notas octo Mesue attribuit, sed obscure multum, & non conformiter bonis auctoribus. Deligendum itaque censemus Polypodium illud, quod eas habeat proprietates, quas illi supra ex Dioscoride & Plinio assignauimus. Dosis Polypodij est Mesuæ à drachmis duabus usque ad aureos quatuor. Actius expurgatæ radicis scrupulos sex,

Polypodiū. delectus.

Boni polypodij notæ obscurè traduntur à Mesue.

Dosis polypodij.

qui in aqua mulsa præferbuerint, exhibet. Orib. drachmas duas coquit in ptisanæ succo, datq; bibēdū succum. Sunt qui unciam integram sine noxa dederunt.

Pompholyx. POMPHOLYX specie sola, non genere, à spodio distat. Siquidem SPODOS nigricat, & plerunque pondrosior est, palæarum pilorumq; plena, quasi purgamentum quoddam, quod ab ærariarum officinarum paumentis & fornacibus euerritur. Pompholyx uerò pinguis est, & candida, usque adeo leuis, ut in auras euolare possit. Cuius duo fluxerunt genera. unum ad aeris colorem uergens, subpingue: alterum magnopere candidum, summamq; leuitatem natum. Candida sit pompholyx, quoties in perficiendo ære, fabri præstantiorem facere uolētes, detritam cadmiā cumulatius insperserint. Namq; tenuissima fauilla, quæ effertur, in pompholygē coit. Cæterum pompholyx non ex æris modo materia & fabili industria facitatur, sed ex cadmia quoque, ad gignendam ipsam, eximie follibus proflata. Cuius faciundæ ratio hæc est: In domo gemina contignatione operata, fornax extruitur, iuxta quam mediocris fenestra ad tabulatum à supernis partibus pateat. domacily paries fornaci proximus, tenui foramine ad fornacem usque perforetur, ad excipiendam follis natem. ostiū mediocre habeat, pro exitu ingressuq; artificis fabricatum. domuncula altera huic coniuncta sit, in qua & folles & flator suo munere fungantur. deinde carbonibus in camino succensis, assidens artifex cadmiā particulatim fractam inspargit, à locis supra infurnibulum extructis. idē negotium obit inferne artificis minister, simulq; carbo-

nes adijcit, usque dum indita cadmiæ copia prorsus absorbitur. itaque egesta suffitu tenuis pars & levis materiae in summam domum euolat, & parietibus, tectis, fornicibusq; adhærescit: conflatum autem inde corpus, inter initia erumpentibus aquarum bullis sinule prodit, postea maius incrementum capeffens, glomusculis uellerum simile redditur. ponderosus autem in ima loca se recipit. sed hoc fornacibus effunditur, illud domus pavimento coheret. quod tenuiore deterius existimandum est, ideo quod multum terræ collegerit, & spurcitia in aceruatione refertur. Sunt qui hoc modo tantum fieri spondium arbitrantur, de qua antè dictum est. Optima creditur Cypria, quæ accepto aceto halitum artis præstat, colore aliquantum piceo, sapore cœni horrido: & si fraudem non experta flagranti carbone inferuescit, æreum colorem contrahit. Aut edictis autem notis, diligenter attendendum est. Siquidem à nonnullis adulteratur taurino glutine, ouillo pulmone, aut marino, aut crematis groffis, & quibusdam consimilibus. Quod facile cognitu fuerit. quippe nihil in ijs probandis inuenietur eorum, quæ antè dicta sunt. Pompholygem in commune ita lauari oportet: Ligatam linteo mundo modiceq; raro, aut siccam, aut aqua respersam, in labellum demittito, quod imbrem contineat, & huc atque illuc fasciculum deferens, immergito. ita enim limosa pars eius ac utilis effluet, & omne sedimentum in linteolo remanebit. postea residere sinens, aquam cum cinere colis incernito, & non uan infundens, agitato, & effundito: mutata tantisper aqua, & colata, dum arenosi nihil sidat. demum aquam



exprimito, & siccatum cinerem recondito. Alij, quatum maxime fieri potest, siccant, & manibus in aqua conterunt, dum mellis crassamentum inutetur. deinde linteofaucibus excepturi uasis obtento, aut laxius illigato, coalant: & quò facilius transeat, infusa per linteum largiore aqua, cinerem conturbant. mox spumofum, quod traiectum est, & supernatat uasi, concha excipiunt, & fœculi nouo ad usus recondunt. quod uerò resedit, sensim cribratū, in aliud uas transfundunt, relicto arenoso quod pessum ierat. rursus lapidosa sidere patiuntur, & in uas aliud excolant. hoc identidem faciunt, donec cinis merus & arenæ expers inueniatur. Alij paulatim integram in aqua respergunt, arbitrati arenas lapillosq; suo pondusculo degrauiatos, pessum ire: pilos autem & paleas leuitate sua in sublime attolli. cæterum cinerē medium separent, & in pilam coniectū, ut cadnuan, eluunt. Quint etiam lauatur uino Chio marina aqua diluto, modis quos supra diximus. & ita redditur adstringentior, quàm aspidium. quis elota. Quòd si spodon torrere libet, diligenter tritam & irrigatam aqua, colliges in pastillos, fœculique nouo, subiectis leuibz prunis, orbiculos continuo uertibus, dum assiccati fuluescant. Neque ignorandum, ex auro, argento, plumboq; fieri spodion. uerū post Cyprum, plumbeum maxime commendatur. Quoniam spodos sæpenumero desideratur, necesse est ostendere, quæ simili uirtute pollicant, ut in spodij locum suffici possint, antispoda uocant: quoq; modo sumi debeant. Folia itaque myrti, cum floribus & baccis immaturis, in fœcule erudum coniecta, indito opereculo continua foramina habent

de spodij succidaneis.

habente, uruntur fornacibus, donec figlinum percoquantur. iterum in fictile aliud crudum transferuntur: quod ubi perassatum fuerit, exempta lauantur ad usus. Idem quoque fit è termute sylvestris oliuæ, si habeatur: sin secus, satiuæ cum suis floribus, aut malis cotoneis dissectis, & detractis ossibus, aut gallis, aut laceratis lintcolis, itè ex moris immaturis, id est candidis, in sole prius arefactis, aut terebintho, aut lentisco, ænanthe, aut mollibus rubi folijs, uel è buxi coma, uel pseudocypero cum flore. Alij ficulneas frondes in sole antea siccatas, eodè modo parant. alij taurinum gluten. alij succidas lanas asperas, pice aut melle irrigatas. Quæ omnia in spodij uicem usurpantur. Diosc.

POPVLVS resinam fundit, quæ in malagnata additur. Lachrymam populorum commemorant quæ in Padum amnem defluat, durari, ac coire in succinum, quod electrum uocant, alij chrysophorum. id attritu iucundum odorem spirat, & aurum colore imitatur. Diosc.

Propolis.

PROPOLIS eligi debet flaua, odorata, syracæ refectis, in uehementi ariditate mollis, et mastiches more ducti delectus. In alueariorum foribus, cerosæ naturæ inuenitur. Dio.

PRVNIS prima laus à Damasco Syriæ monte cognominatis, tribuitur, nigra cute, carne suauis, rotundo ligno, exili nucleo. Hæc iam pridem, ut Plinius inquit, in Italia nascuntur. Proxima datur (Ibericis) quæ ab Iberia & Hispania deuehuntur. Inter Damascena optima Electio. censentur Galeno, quæ sint mediocriter adstringentia, magna & laxa. Decocta in melicrato, plus mellis habente, uentrem molliunt, magis quæ si melicratum superbibatur:

dehinc uinum dulce, & prandium differatur. Aluū etiā  
 Pruna pran- cientes si sola manduntur: sed prandiū inchoare debēt. Sa-  
 dium inchoa- tus autē est decocti prunorū tam satiuorum quā sylvē-  
 redebent. strum singulos cyathos sumi. Sed sylvēstria aluum &  
 modus deco- strum singulos cyathos sumi. Sed sylvēstria aluum &  
 ti prunorū. tormina sistunt, præsertim in uino austero decocta. Me-  
 sue decoctum prunorum exhibet, usq; ad libram unam.  
 Porro quo dulciora sunt pruna, eo magis uentrem emol-  
 liunt. Ea Græcis (coccy-mella) nomenclantur.

Pforicum.

PSORICVM. uide CHALCITIS.

Psyllij gene-  
 ra duo apud  
 recentiores.

PSYLLIVM. Recētiore duo eius genera statuerūt.

Psyllium ma-  
 xime cōmen-  
 datur semine

unum calamo exili & longo, in cuius spica cōtinetur se-  
 mē, pulicis colore, et magnitudine. Alterū sarmētosum,  
 floribus canino capiti similibus, fabaceis capitellis, seme-  
 ne pulicis effigie, radice tenui & superuacua. Psyllium  
 maxime cōmendatur semine, in medicina: Plurimo enim,  
 inquit Aëtius, usui est. Psylliū ueteres neq; Græci, neq;  
 Latini, per os exhibuerunt, sed extrinsecus tantū ad mol-  
 liendū refrigerādumq; imposuerūt. Modus parādæ mu-  
 scillaginis Psyllij, ex Tralliano & Aëtio est requirēdus.

Pumex.

PVMICIS probatio, ut magnopere leuis, spongio-  
 sus, scissilis, nec arenosus, item teri facilis, & candidus.  
 Crematur flagrantissimis carbonibus obrutus, & ubi can-  
 duerit, extractus, uino resinguitur odorato: iterumq;  
 incensus extinguitur: & tertia uestione exemptus, & per  
 se refrigeratus, ad usus conditur. Diosc.

Punicum mā-  
 lum domesti-  
 cum & sylue-  
 stre.

PVNICI māli domestici & syluestris flores, id est,  
 cytini & balaustia exprimuntur, ut succū remittant, in-  
 star h̄y pocisthidis, cuius etiam uires reserunt. Diosc.

Pycnoco-  
 mon.

PYCNOCOMI succum si libet eximere, tusa radix  
 in fistili

in fictili mergitur, & agitata aqua, quod supernat pin-  
na selectum, exiccatur. Diosc.

PYRITES lapidis genus est, à quo æs conflatur. Pyrites.  
Eligi debet æris similitudine, facile scintillas ædens. delectus.

Vritur sic: Melle irrigatus molli pruna, continuo fla-  
tur follibus, donec rufescat. Alij in multos carbones igni  
candentes, lapidem copioso melle persusum deiciunt,  
& ubi ad fuluum colorem uergeri cœperit, extrahunt:  
efflatoq; cinere, rursus madefactum cremant, donec æ-  
quabiliter assiccatus, friabilis reddatur. Siquidem sæpe  
facies summa solum uritur. Ita crematus, siccatusq; re-  
cōditur. Si eloto opus sit, lauari debet ut Cadmia. Diosc.

## R



RESINA liquida è pinu & pi- Resina liqui-  
cea, à Gallia & Heturia conue- da è pinu &  
hi solet. atque olim à Colophone picea.

petebatur: hinc Colophonæ si-  
bi cognomentum uendicauit. A  
Gallia quoque subalpina: quam  
uernaculo nomine Laricem appel-  
lant incolæ. Ea in linctu, & per se, magnopere prode-  
tusi ueteri. Colore inter se distant. siquidem alia candi-  
da est, alia oleosa, alia mellei liquoris similitudine: ut la-  
rigna. Cupressus etiam liquidam fundit resinam, quæ ad  
eamdem pollet. Quæ uerò aridarum generi ascribuntur,  
quædam ex pineis nucibus, aliæ abiete, aliæ picea & pi-  
nu exierunt. Eligi debet longè omnium odoratissi-  
ma, translucens, non retorrída, neque diluta, quandam

electio.

cera faciem præbēs, & friabilis. E picea & abiete resina, cæteras antecedunt. odoratæ enim sunt, atque thus odore imitantur. Præstantiores à Pytiusa insula deferuntur, quæ secundum Hispaniam sita est. Sed quæ è picea, nucibus pinis & cupressso manarunt, nihil ad illas, nec tantis viribus potiuntur. Veruntamen eorundem gratia quorum & illæ sumi solent. Lentiscina terebinthinæ respondet. Vritur resina omnis liquida in uase quadruplæ capacitatis ad humorem, qui infunditur. itaque resinæ congius, in duobus aquæ pluuiæ coquitur, subiectis leuib. prunis, resina assidue mouetur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis & retorrida reddatur, ac digitis cedat. Cæterum ubi refrixit, in fictile non picatum, quod aconitum uocant, id est non illitum, reconditur.

Fiet etiam eximij candoris, si resina omnis cliquata præcoletur, quò sæculenta sordes excernatur. Vritur quoque sine aqua, primum lento igne: & ubi coire cœperunt, maior carbonum strues supponitur, & triduo citra intermissionem discoquantur, usque dum antedictas naturæ suæ notas exuerint. mox, ut dictum est reponuntur. Aridas unius diei spatio decoxisse satis est. Fuligo è resina perinde atque thure excipitur. Diosc.

Rha barbari  
apud mesien  
tria genera.

RHABARBARVM. Tria eius genera fecit Mesue: Indicum, quod rauedsceni appellat, omnium optimum. Barbarum, quod secundum in bonitate locum obtinet. & Turchium (ita enim uocat) multo alijs inferius & inefficacius.

boni Rhabar  
bari notæ.

Laudatur Rhabarbarum Mesuæ,

1 Subnigrum vergens in ruborem.

- 2 Graue cum sua raritate.
- 3 In quo dum frangitur, inuenitur disgregatio, ex rufo & glauco.
- 4 Quod colorem reddit ad crocū inclinantem.

Non eget correctione, quæ fit per spicam Rheon hoc nostrum barbaricum: tum quod conuixtas habeat uires, tum quod uera spica caremus: & ea qua hodie utimur, horribilis ualde saporis est. Dosis seu quantitas communis, nostri Rheubarbari in infusione, ut loquuntur, est à drachma una ad drachmas duas uel tres ad summum. In substantia à drachma una ad drachmam unam & semis. Itaque modus Mesuæ in dando Rheubarbaro, perniciosus est. ipsum enim exhibet à drachmis duabus & semis, usque ad drachmas decem: quæ quantitas non potest sine discrimine semel dari.

RHAPONTICVM optimum habetur quod terebines non sensit, si gustatu cum remissa adstrictione lenitescat, manducatumq; colorem reddat pallidum, aut ad crocum inclinantem. Diosc.

RHIV liquamentum fit ex aridis folijs, ad crassitudinem mellis in aqua decoctis, ad eadem, ut lycium conueniens. Semen eisdem effectus exhibet. aqua in quo semen maduit decocta, cogitur coitq; efficacior ipso semine. Gummi desert, quod dentium canis imprimatur ad dolores finiendos. Diosc.

RICINVS. ριόν. Grana eius triginta numero, putaminibus purgata, potu pituitas, bilem & aquas per aluum deiciunt Dioscori. Sed iniucunda admodum est & molesta purgatio. Siquidem stomachum uehementer subuertit. Hinc serè semper accidit, ut qui hæc grana sumpt

non eget correctione.

Spica uera caremus.

modus exhibitionis.

Rhaponticū.

Dosis granorum palmæ christi, id est Ricini.



Superstitio-  
sum.

sumpserint, per superna & inferna purgantur. Sunt ta-  
men qui huius effectus (uomitionis inquam & purgatio-  
nis per alium) causam aliam assignāt, nempe quod dum  
hæc grana euelluntur, alia sursum, alia deorsum ducta  
sint. Dicunt enim rusticas mulierculas pro comperto ha-  
bere, si quis semina deorsum trahens, euulserit, & ea co-  
mederit, per inferna purgari: si uerò sursum, per su-  
perna. Quod an uerum sit, uiderint huius commenti as-  
sertores. Atque hæc de catapotia maiore dicta sufficiant.

Rosarum  
succus.

ROSARVM recētibus folijs succus exprimitur, de-  
sectis scilicet unguibus (sic appellātur candidæ foliorum  
partes) reliquum in pila premi & teri debet in umbra  
donec cogatur: & ita ad oculorum circumlitiones re-  
condi. Siccantur etiamnunc folia rosarum, continuo uer-  
sata, ne muceant, neue situs infideat. Diosc.

Rosei pa-  
stulli.

ROSEI pastilli, rhodides Græcis, hac ratione con-  
ficiuntur: Rosarum uiridium, quæ nullo antea humore  
madefactæ extabuerint, drachmæ quadraginta, Indicæ  
nardi drachmæ decem, myrrhæ drachmæ sex, tritæ di-  
geruntur in pastillos, qui trium obolorū pondus aequēt.  
siccati; in umbra, in fictili non picato, atque obturato  
reconduntur. Alij adijciunt costi drachmas duas, iridis  
Illyricæ totidem, & uinum Chium cum melle muscent.  
Mulieribus monilium uice collo circumdato usui sunt.  
Dioscorides.

Rosarū quæ  
præferenda.

ROSAE. Inter rosas ea præferenda est quæ colorem  
habet exactè rubrum. Tam alba quàm rubra præstan-  
tior habetur, quæ folia habet pauca, & leuia, seu, ut lo-  
quuntur, plana.

Succus. Succus rosæ melior est qui ex com-  
pleta

pleta atque omnino absoluta rosa exprimitur, aut educitur. Sicca rosa magis est adstrictionum particeps. uitanda autē omnino quæ corruptionē sensit. Rosæ præsertim recentes, decoctionem non sustinent, per hanc enim facultas earum deterforia ac purgatoria tota expirat, & deperit. Succus uero earūdem, modice decoctus, subtilior euadit, & magis absterforius, ut auctor est Mesue. Dosis potionis succi rosarum ipsi Mesue, est ab uncia una usque ad uncias duas cum saccharo. Si cū sero lactis sumatur, satis est uncia una. Potio uero syropi, ex succo rosarum, aut infusione earum facti, eidem est, ab uncijis duabus usque ad quinque. Dioscorides & Galenus, succum rosarum non ad alium quam ad oculorum usum reponunt. Folia decem recētia, aluum ciuidam decies duxerunt, ut refert Rasis. Sicca autem folia, quia ab eis recessit amaror, laxatiua non sunt, sed styptica, & adstringentia. Apertus error est apud Mesuem, qui per albas rosas solutionem fieri nullam scripsit. Rosæ nanq; de sceni uocatæ, & uulgò apud quosdam Damasæ, cum albiſsimæ sint, cæteras in purgando excellunt. Tagautius.

Dosis.

Mesue error.

Rosæ damasæ.

## S



AGAPENIVM ferulacæ Sagapeniū. herbe succus est, quæ in Media nascitur. Optimum est translucens, fuluo forinsecus colore, & intus albo, nescio quid inter laser & galbanum redolens, gustu accri. Diosc.

Neque

Neque autem mirum uideri debet de SAGAPENO si Chalbani seu Galbani odore referat, cum hæc duo naturæ adeo propinquæ sint, ut Chalbani mutetur in Sagapenum, ut Galenus scribit, libro de Antidotis. Porro omnes Dioscoridis Sagapeni notæ in nostro uocato Sagapeno reperiuntur. Nascitur etiam in Italia Plinio, et nunc etiam in Apulia. Medum tamē cæteris est præstantius, et efficacius. hoc Venetias per Alexandriæ nauigationem ad nos adfertur: quod certe alij odorem habet uerius quam porrorum. Veri Sagapeni probatio est Galeno, si aqua infusam aut uino, statim dissoluatur.

Sagapenum  
opumum.

Sagapenum  
purgatoriū  
non esse.

Græci Sagapeno uim purgatoriam non adscribunt. Scripsit quidem Dioscorides ipsum crassum ex pulmonibus pituitam expurgare. Verum nemo est inter Græcos aut Latinos, qui per uentrem inferiorem purgare unquam dixerit. hoc igitur et inuentum sit Arabum. Tamen cautius.

Sal. SAL fossilis efficacior est. communiter, si est candidus, calculus uacans, et perspicuus, densus, æquali compage: peculiariter ammoniacus natione laudatur, si modo findi facile possit, et in recta segmenta diduci. In marino sale eligendus est, candidus, æqualis, densus. Probatissimus in Cypro fit, et Salamæ Cypro, et Megaris, in Sicilia et Africa. Sed inter dicta salis genera lacustris præfertur. sed multo ualidissimus est Phrygius, non nunc lapæus, aut triteus, aut gaitæus. Vritur fictili, diligenter opertus ne exiliat, conditusque prunis, usque dum effruescat. Aliqui fossilem subactio polline obliniunt, et carbonibus subiiciunt, usque dum eius crusta exuretur.

tur.

tur. Solet & sal communis hoc modo uri: Aqua semel abluitur, & siccatus in ollam coopertam mittitur, subdito igne, moueturq; donec iam non exiliat. Spuma salis. Spuma salis. Lapis, spumosi maris lanugo siue ramentum est, in exilibus petris inuentum, cuius uis eadem quae sali. Diosc.

SALIS flos flumine Nilo defluit. lacubus tamen quidam innatat. Assumendus, qui crocei coloris est, odore ingrato, ceu garri. interdum longe magis uirus olet, gustuq; mordacior, & pinguius lentus. Fucatus autem rubrica, aut scrupulosus, improbatur. Præterea syncerus non nisi oleo resoluitur: adulteratus nonnulla ex parte, etiam aqua, diluente facitium colorem. Diosc.

SALICIS excipitur succus qui manat ex ea, cum flos Salix. ret, exciso cortice. in plaga enim concretus humor inuenitur, qui ad purganda quae obstat oculis, suam uim præbet. Diosc.

SAMIA præfertur candida, leuis, tangenti lingue Samia terra. glutinis modo adhærescens, mollis, succosa, friabilis, cuiusmodi est quam aliqui collyrion uocant. Duae enim species eius. unam antea diximus. altera aster appellatur, crustacea, & cotis modo prædensa. Vritur ac lauatur ut cretria. Vimq; consimilem habet. Diosc.

SAMIVS lapis, in Samia terra inuenitur, quo aurifuges utuntur poliendo auro, ut resplendeat. Probatur candore, & duritia. Diosc.

SAMPSUCHVM in Cypro & Cyziceno laudatur Sampsuchum. secundum sibi locum uendicauit Aegyptium. Amaracum gens Sicula & Cyzicena appellat. Diosc.

SANDARACHA probatur rufa & saturator, & Sandaracha. aliena

aliena materia uacans, friabilis, cinnabaris colore, sulphuris uirus redolens. Dos eadem & ustio, quæ auripigmento. Diosc.

Sarcocolla. SARCOCOLLA lachryma est arboris in Persia de nascentis, pollini thuris similis, rufa, gustu amara. Adulteratur admisto gummi. Diosc.

Scammonia. SCAMMONIAE legitur ad hunc modum succus: Capite exempto, radix in testudinis speciem cultro excavatur, quo fit ut in cauum confluat succus, qui conchis demum excipitur. Alij scrobes in terra concamerato sinu fodiunt, in quos, subiectis iuglandium folijs, profundunt succum, siccatumque extrahunt. Laudatur autem scammonium leue, nitidum, rarum, & colore quamsimillimum taurino glutini, fungosum, tenuibus fistulis, quale ex Mysia regione Asiae deportatur. Nec attendere solum par est, si linguae tactu albescat (hoc enim euenit adulterato, quod admisto fit tithymali lacte) sed longè magis antea narratis. item si non uehementer linguam exurat. id quod musti tithymali argumentum est. natione autem Syriacum, & Iudaicum deterrima habetur, grauius, densa, erui farina & tithymalo uitata. Diosc.

Scammonium quoniam cæteris præstat, quod in Colophone (quæ Insula est Ionie, Appollinis oraculo nobilis) gignitur, ideo & Colophonium nominatur. Itaque eiusmodi succus, qui in quotidiano medicine usu ad purgationes præstantem & maximam uim habet, ad hunc modum colligitur Dioscoridi: Capite radice exempto detractoue, radix ipsa in modum testudinis inuersa, cultro excavatur. Quo fit ut in cauum, seu cauernulam ipsam,

modi 2. colli-  
gendi scammonium, ex dio-  
scoride.

ipsam, lachryma siue succus cōfluat, qui deinde conchis  
excipitur. Alij fornicem seu scrobes in terra concame-  
rato sinu fodiunt, in quos subiectis nucum iuglandum fo-  
lijs, succum effundi patiūtur, quem inibi resiccatum de-  
num tollunt. Quatuor modos colligendi eiusmodi suc-  
ci posuit Mesue, secundum autem modum hunc Diosco-  
ridis omisit. Primus est, radice in terra adhuc manente,  
incisa, & excauata, ut modo ex Dioscoride dictum est.  
Secundus, radice euulsa, & incisa. Tertius, contritis ra-  
dicibus & expressis. Quartus stipite & folijs simul con-  
tritis. qui autem hoc ultimo modo exprimitur, ac colli-  
gitur succus, ad uirorem spectat, & grauis est odoris.  
Quod tertio modo legitur ac seruiatur, scammonium ni-  
grum est, crassum & ponderosum siue graue ipsi Me-  
sue. Sed qui secundo modo ex radice Scammonie pro-  
fluit succus, colore subalbido aut uario conspicitur. Cæ-  
terum quæ modis his omnibus profunditur lachryma,  
uel lento atq; moderato igne eidem Mesue decoquitur,  
uel in sole exiccatur, & in trochiscos seu pastillos, quos  
impresso sigillo obsignare solebant, digeritur, atque sic  
usui reseruatur. Nunc uero quod in officinis ostēdi-  
tur Scammonium, neque in pastillos conformatur, neque  
sigillo ullo obsignatur. Porro radix ipsa circa canis  
ortum excauatur Plinio, libro 26. cap. 8. ut in ipsam,  
sic ut modò dictum est, confluat succus, qui sole siccatus  
digeritur in pastillos. Vis bimo nec ante nec postea. Me-  
dicinas omnes exacuit, & stomacho (ut Galenus scri-  
bit) inimicum est, atque eius dissolutionem facit. Recen-  
tior autem Græcia, & officina nostra, lachrymā hanc,

modi 4. ex  
mesue.

1

2

3

4

tempus colli-  
gendo scam-  
monio accō-  
modum.  
tempus dura-  
tionis.



quo minus stomachum offendat, in cotoneo malo deco-  
 Quant: atque tam illa Dacrydion, quasi dicas lachrymu-  
 lam, uocat: hæ uerò corrupto uocabulo diagredion ap-  
 pellant. Tagautius. Plinio uero commendatur natio-  
 ne Colophonium, Mysium, Priennense, specie nitidum,  
 & quàm simillimum taurino glutini, fungosum tenuissi-  
 mis fistulis, citò liquefcens, uirus redolens, gummosum,  
 lingue tactu lactescens, quàm leuissimum, cum diluitur  
 albefcens. Verum enim uero non solum hoc experimen-  
 to niti conuenit, ut lingue tactu aut cū diluitur albefcat:  
 hoc enim etiam euenit adulterino, quod ammisso sit Ti-  
 thymali lacte: sed fidelior probatio Dioscoridi & Plin-  
 io fit, à gustu, ne ualde linguam accendat, ac uehemen-  
 ter deurat, id quod permisti tithymali (inquit Dioscori-  
 des) est argumentum. Tithymalus nanque linguam ex-  
 calfacit Bulbi more. Deterrimum uero habetur Scam-  
 monium Dioscoridi, natione Syriacum & Iudaicum,  
 graue, densum, Erui, id est, Orobi farina, & Tithymali  
 succo utitatum. Quinque conditiones desiderantur  
 Mesue in bono scammonio. Nempe ut sit splendens uel  
 subalbida, aut uaria: lingue attactu, & cum diluitur, la-  
 ctescens, siue albefcens (sed hoc experimentum ut dixi-  
 mus, fallax est) tenera ac friabilis: leuis: boni odoris,  
 cum tamen Plinio illud laudetur, quòd uirus redolet.  
 Actio inodora est & insuauis Scammonia. Dosis ul-  
 tima scammonij per se, Mesue sunt grana duodecim.  
 Actio scrupuli duo, uel, ut inquit, pro uirtutis ratione  
 maior aut minor. Galeno & Oribasio exhibetur pōdes  
 re drachmæ unius. Dioscorides quoque integram drach-  
 mam

chman non ueretur offerre: sufficere tamen ad soluenda aluum dicit duos obolos. Quod si efficacius purgare uelis, quaterni oboli, cum duobus ueratri nigri, & Aloës drachma una, si ipsum Dioscoridem sequamur, dari possunt. Ego, inquit Marardus, licet nunquam sim ausus tantum dare, duodecim tamen grana transcendere non sum ueritus, scioq; quosdam scrupulum integrum hausisse sine noxa.

**SCHISTOS** lapis in Iberia Hispaniæ gignitur. Schistus lapis Probaturn maxime, qui croci colorem emulatur, friabilis, suapte natura fissilis, concremento & alterno coherentium uenarum, discursu, pectinum modo, ammoniacofali similis. Vim exhibet hæmatitæ, sed ad omnia infirmioreni. Diosc.

**SCILLA** uim acrem atque feruentem habet. affatur Scilla. ad multa utilioreni esse constat. Polline ad crustam subacta, aut luto oblita, in clibanum cõjicitur, aut carbonibus obruitur, donec obducens crusta sufficienter intosta fuerit. quæ exempta, si non emollescat, altero polline simili, aut luto circumlinitur, & eadem quæ prius sunt. nam quæ ita non affatur, interaneis maxime noxia est. Torretur item in olla, indito operculo, quæ in furnu demittatur. Sumi etiam solet quod maxime est medium, di reptis uiuo tenuis tunicis. quod frustatim confectum coquitur, mutata sæpius aqua, donec ipsa nec amaritudinē nec acrimoniam habeat. Traiecta q; lino frusta siccantur in umbra, ita ut ne ulla quidem parte se contingant. his scille segminibus ad oleum, uinum, aut acetum scillinum utitur. Diosc.

**SQUILLA.** Ea squilla melior censetur, quæ & dâ coris, & amaroris, atq; acrimoniæ particeps est: quæq; candidissima est, & in locis liberis nascitur. Addit Mes sue & quæ parè habet. Sola enim (inquit) uenerosa est. Quod si id uerum est, nemo unquam tuto Scylla utetur, **obis.** nisi qui præsens fuerit dum effoderetur. Dosis acetii squillitici Mesuæ est à drachmis quinque usque ad duas decim. Oxymelitis uerò potio est ab aureis sex usque ad tres uncias. & trochiscorum scylliticorum à drachmis duabus usque ad quatuor. Ex Dioscoridis uerò sententia datur Squilla cochlearis unius uel duorum mensura, ad alium leniendam. Idem tribus obolis in eclegmate coctam exhibet ad uarios affectus.

**Scordium.** SCORDIVM efficacius Ponticū, Creticumq; Exprimatur eo etiam succus. Diosc.

**Sene.** SENE. Aëluario seruesciti ius potius, quam tritici su-  
**obis Sene.** rina propinatur. Pulueris modus, eidem auctori, drachma: in decocto, senuncia: macerati, seu, ut dicunt, infusi potio communiter exhibetur à drachmis tribus ad senunciam. Mesuæ ab aureis tribus ad unciam unâ. Decocti ex Sene uncia mediocriter purgat Manardo. Sera pio, ut Aëluarius, dat tritici Sene drachmam unam, decoctæ quinque. Ceterum cum Sene nostrum Gallicum purgandis corporibus ualere, multa iam experiëntia com probatum sit, non erit certe officinis tanquam inutile interdicendum: sed cum inefficacius sit altero quod orientale uocant, & in communi est usu, maiore paulo mensura erit exhibendum, ne sua expectatione & qui sumunt, & qui instituant, frustrentur. Purgant autem efficacius

ficacius senæ filiquæ (quos folliculos uocât) quàm p<sup>er</sup> d<sup>ia</sup> p<sup>ia</sup>, id est folia: quod ipsum præter Mesuæ auctoritatē, & experientia comprobât, & ratio etiam dicat, ob contentorum scilicet in eis seminum potentiam.

SERVM optimum habetur, quod ex lacte caprarum <sup>Serum.</sup>  
iuuenum, nigrarum, recenter fortarum, & bono pastu <sup>Seri lactis o-</sup>  
uentium, assumitur. Secundum locum obtinet, quod ex <sup>pumæ notæ.</sup>  
ouillo lacte separatur. & tertio loco habetur bubulum.  
Quauis temperatissimum lac muliebre sit, mox caprilum, hinc asinum, ouillumq; postremo uaccinum. In se uerò consideratum probatur magis, recens, non corruptum, boni odoris atque saporis. Dosis seri Mesuæ <sup>dosis Seri.</sup>  
est ab uncis sex usque ad libram unam. Paulus Aegineta dari uiris iubet sextarios duos, pueris unum.

SINAPIS recenti semine expressus succus in sole Sinapi. siccatur. Diosc.

SOLANO hortensi, & haliaccabo succus extrahitur, qui siccatuS in umbra reconditur, ad eadem ualens. <sup>Solanū hortense.</sup>  
Dioscorides.

SORI existimantur aliqui melanteriam esse, aber<sup>ant</sup> <sup>Sori.</sup>  
rantes. siquidem sui generis est fori, ei non absimile. uerum forei uirus inest graue, & nauseam mouens. Inuenitur etiam in Aegypto, & alijs quibusdam regionibus, ut in Libya, Hispania, & Cypro. Præfertur Aegyptium, quodq; frianti nigrius apparet, in multa foramina debiscentes, suppingue, insuper adstringens, & olfactu deuotione q; magnum uirus olens, ita ut stomachus in uomitiones effundatur. Quod autem friatum scintillas minus modo non emittit, & alterius generis esse, & inua-

lidum censendum est. Vin & unctionem supradictis simi-  
lem habet, scilicet ut musy & chalcitis. Hec autem ferè  
omnia, & alia quæ unctionem experta non sunt, per uisus  
ualidiora esse existimantur, præter salem & uini fecè,  
nitrum, calcè, & consimilia, quæ cruda remissiora sunt.  
Combusta enim uiribus efficaciora redduntur.

Spartion &  
Genista.  
Seminis geni-  
stæ dosis.  
Dosis spartij.

De SPARTIO & GENISTA. Genistæ semen  
in folliculus Phasiolorum modo nascens, purgat sesqua-  
drachma in aquæ mulsæ quatuor cyathis potu matutino,  
Plinio. De Spartio scribit Dioscorides, quòd flores  
& semina eius purgant per superna, eliebori uice, citra  
periculum, quinis obolis in aqua mulsæ siue melicrato  
pota. Semen quoque ipsum exinanit aluum trahendo.

\* aliàs, in ace-  
ro. Plin.

Sed & ranis eius cum folijs in \* aqua maceratis pluri-  
bus diebus & iustis, succus elicitor, Ischiadicis & angina  
laboratibus utilis, unius cyathi potu ieiunis. Quidam  
falsilagine, uel marina aqua macerare malunt, & subter  
Ischiadicis in aluum dare. Detrahitis cruenta, strigine-  
taq; intestinorum. Sed super his nihil attentet Pharms-  
copola, medico inconsulto. Dosis Albrabin Mesuæ, &  
proprie florum (inquit) est à drachmis duabus usque ad  
quinq; & seminis à duabus drachmis usque ad quatuor.  
Dioscorides, ut diximus, ex semine & floribus spartij  
dat quinque obolos, Plinius sesquidrachmam, id est dra-  
chmam & dimidium genistæ exhibet.

Spongix.

E SPONGIIS alias mares appellauere, tenui sicut  
la, spissas: quarum duriores tragos nominarunt. forma-  
nas autem, quæ contrarias dotes habent. Vrinatur eas, ut  
alcyonium. Cinerem in oculorum medicamentis laus-  
re nil

re utilius. Candidæ cura fiunt, è molliſſimis recētes, per æſtus tinclæ ſalis ſpuma, quæ petris cohæret, inſolantur inuerſæ, hoc eſt parte caua ſurſum ſpectante: & qua abſciſſæ fuerunt, deorſum. ſi uerò æſtiua ſerenitate ad lunam ſternantur, perſuſæ ſalis ſpuma, aut maris aqua, maximum candorem referent. Dioſc.

STYRAX lachryma eſt arboris malo cotoneæ ſimiæ Styra-  
lis. Præfertur ſordescens, flauus, reſinoſus, albicantibus  
grumis, quæ implurimum in ſua odoris gratia permanēs.  
qui dum mollitur, melleum liquorem reddit. qualis è Ca-  
taballus, Piſidia, & Cilicia deuchitur. Deterior niger,  
ſi ſiſoſus, friabilis, canoq; ſitu obduſtus. Cæterum la-  
chryma inuenitur gummium ſimilitudine, perlucida, &  
myrrhæ emula. uerum per pauca manat. Adulteratur  
ligni ſcobe, quam uermiculi erodentes excuſſerunt, mel-  
le, & iridis ſedimento, & quibuſdam alijs. Alij ceram  
aut adipem odoribus imbutum, ſagrantiſſimis ſolibus  
cum ſtyrace ſubigunt, & per laxa cribri ſoramina in fri-  
gida aqua uermiculos exprimunt, uenundantq;. Styra-  
cē hunc quoniam in uermiculorū ſpeciem contrahatur, ſco-  
leciten cognominant. quem tanquam ſyncerum imperiti  
approbant, non animaduertentes ad præcipuam odoris  
fragrantiam. ſiquidem acer admodum eſt, qui adultera-  
tionis uitio caret. Styra-adoletur, & igni torretur,  
ut fiat ex eo, ueluti ex thure fuligo: ad eadem cōueniens,  
ad quæ thuris fuligo. Dioſc.

SULPHUR optimum exiſtimatur uiuū, quod apy= Sulphur.  
ron uocant, nitedulæ modo ſplendidum, perlucens, nu-  
mè lapidoſum. Probatur in genere ſulphuris ignem



expertis, quod iuret, ac præpingue spectatur. Plurimum in Melo & Lipara gignitur. Diosc.

Sycomori  
succus.

SYCOMORI succus primo uere tenera arbore, atquequam fructum ferat, eximitur, lapidis ictu summo cortice desquamato. si enim altiore plaga uoletur cortex, nihil effluet. Spongia aut uellere lachryma excipitur: quæ siccata & in pastillos coacta fistili uase reponitur. Dioscorides.

T

Tamarindi.  
delectus.



A MARINDI Mesueo præstantiores sunt nigri, non tamen exacte lucidi siue splendentes, teneri, murti cum uillis, recentes quoque & pingues non aridi, dulcissimi, saporis unosi.

Adulteratio  
tamarindorum.

Adulterantur adnuxione carniū prunorum, sed fraus delegitur nigredine non splendente in ipsis apparente, humore luxuriante, & prunorum tum odore tum sapore. Si incalescant, aut

conseruatio.

humefcentur, putrescunt. optime conseruantur in uase utreo, exacte obturato, & in loco sicciore. Imbecillius. Lam uim habent purgatoriam, proinde eorum decoctum exhiberi potest ab uncis duabus usque ad quinque.

Terebinthina.

TEREBINTHI resina ex Arabia petraea deferatur. Prouenit etiam in Iudea, Syria, Cypro, Apbica & Cycladibus insulis. Sed præuaret candida, perlucida, utreo colore & in cæruleum uergente, odorata, terebinthum olens. Terebinthina resinas omnes antecedit. proxima lentiscina, & è pinu, & abiete. has sequitur è picea

picea & pineis nucibus resina. Diosc.

Terebinthina quomodo vratur. Ex Aë=

tio lib. 13. Cap. 99.

TEREBINTHINAM uſtam cyphi recipit. Vri=

tur autem hoc modo: Terebinthinam conijce in ollam,

& triplum, aut etiam amplius aque infunde, & ad ignē

adhibe, nihilq; omnino mouēdo coque: ubi uero conſum=

pta fuerit aqua, & terebinthina attenuata ac inualida

reddita, ut digitis confringi poſſit, eam tolle atque in an=

tidoti confectionem aſſume. Si uero inſumpta aqua, ad=

huc mollior appareat terebinthina, aliam aquam ſuper=

funde, rursusq; ad ignē adhibe, donec friabilis reddatur.

Ex Ampelitide TERRA, quæ pharmacitis nomine, Terra Ampe=

in Seleucia Syriæ naſcitur, laudatur in primis nigra, pi= lius.

ccæ longos carbones reſerens, modicè aſſuſoſa, æquabili

ſplendore, quæ detrita, accepto oleo, ſtatim cliqueſcit.

Vitioſa cenſetur candida, & cinerea, quæ in liquorem

non reſoluitur. Diosc.

CHIA eligi debet candida, uergens ad cinereum, Sa Terra Chia=

miæ ſimilis. eſt autem cruſtoſa, albaq; ſed fictitijs formis

diſſerens. Viſ eadem quæ & Samæ. Diosc.

CIMOLIAE duo genera: candida, & ad purpu= Terra Cimo=

reum inclinans. Optima exiſtimatur quæ innatam habet lia.

pinguitudinem, taclūq; frigida ſentitur. Diosc.

ERETRIADES duæ ſunt, una uehementer alba Terra Ere=

eſt, altera cinericia. Optima habetur ad cinereum colo= trias.

rem uergens, perquam mollis, quæ ſi per ær ænenta tra=

ſum ducatur, lineam uioſaceam reſert. Lauatur ut ceru=

ſa, aut hunc in modum: Teritur ſeorſum, & cum aqua,

Et ubi pessum icrit, humor leuiter excolatur. siccata solum  
libus, iterū teritur interdū, adiecta aqua, ut uestpere con  
fidat. antelucanis colo excernitur, Et demum in sole tri  
ta, si fieri potest, digeritur in pastillos. Quod si ista de  
sideretur, pastilli magnitudine ciccris in fistile perfora  
tum conijciuntur, oreque uasis diligenter obturato, supra  
carbones candentes continenter follibus perflantur. ubi  
uero cinis in fauillas se conuertit, aut æreum colorem  
contrahit, exempti reconduntur. Diosc.

Terra Lem  
nia.

LEMNIA TERRA cuniculoso in specu nata ē Lem  
no insula, palustri loco defertur, inibi electa, Et caprino  
sanguini permista. quam incolæ cogunt in pastillos, Et  
imagine capræ signant. unde Et sphragida ægos, hoc est  
sigillum capræ appellauere. Diosc.

Terra melia.  
Terre omnis  
electio.

Ex omni MELIA TERRA Et omni alia in uniu  
sum, eligi debet, recens, mollis, non lapidosa, friabilis,  
quæ cum humorem attigerit, faciliè resoluatur. Diosc.

Terra Selinu  
fia.

SELINVSIA eadem quæ Chia præstat, maxime  
laudatur, quæ uehementer resplendet, candida, friabilis,  
Et humore dilui celerima. Diosc.

Tithymalus  
Characias.

E CHARACIA TITHYMALO appetente uindemia  
rum tempore, succus congestis ranulis, mox dissectis,  
Et uase conclusis, excipitur. Aliqui adycium ferinam  
erui, Et in pastillos digerunt, qui erui magnitudinem  
impleant. Alij in aridas ficos, ternas quaternasue guttas  
instillant, ut cum his inarescant, quas ad usus recondunt.  
Per se etiam tusus in pila, Et in pastillos coactus repo  
nitur. Porro cum extrahit lac, neque quo uentus aspi  
ret, stare quengquam, neque manus oculis admouere con  
uenit,

uenit, sed antequam colligas, corpus, praesertim faciem, collū, scrotumq; genitalis, adipe, aut oleo cum uino perungere. Fauces autem exasperat. quapropter catapotia cera aut decocto melle, oblini par est, & hoc modo dari. binas tamen ternasue ficos, purgationis gratia sumpsisse, satis est. Characiae tithymali legitur semine autumnō, & siccātū sole leuiter tunditur, seruefactūq; loco mundo reponitur. Folia item siccantur. Diosc.

TITHYMALI foeminae succus ut maris colligitur.

TITHYMALVS paralius similiter, & similes ad Tithymalus  
usus, ut mas, reconditur. Paralius.

TITHYMALI helioscopij colligitur succus, semēq; Tithymalus  
ut aliorum. Helioscopi.

TITHYMALIS cyparissiae & dendroidi, eadem Tithymalus  
uis quae reliquis, similiterq; reconduntur. Diosc. Cyparissius.

THAPSIAE lactis extrahendi ratio haec est: Facto Thapsia.

in ambitū scrobe, cortices inciduntur: aut radix in fornix  
speciem in se excauata, cooperiitur, quō merus succus  
confluat. oportet illuc sequenti die se conferre, & con-  
gestum succum extrahere. Tunditur etiam radix in pi-  
la, & succus organo per quallum expressus, fiefili cras-  
so insolatur. Aliqui folium unū terunt, sed inualidior hu-  
iuscemodi succus. Hoc autem interest. quoniam qui ab  
radice manauit, grauius olet, & humidus permanet: & fo-  
lis autem extractus, exiccatur, atq; teredinum iniuriā  
sentit. Qui succum colligit, stare debet non obuersus uen-  
to: aut potius, cum dies apricus est, & à flatu fileat. quo-  
niam ob halitus acrimoniam facies uehementer intume-  
scit, nudaq; corpora inuadunt pustulae. ob id prius li-  
quido

quido cerato & adstringente, nudas partes illinunt, & ita muniti accedunt. Diosc.

Thus. THVS in ea gignitur Arabia, quæ thurifera cognominatur. Primum tenet in eo genere masculum, stagonias appellatum, suapte natura rotundum. tale autem indiuiduum est, candidum, cum frangitur, intus pingue, in suffitu statim ardens. Indicium uerò fuluescit, & colore liuet, sed rotundum industria facilius, nam in quadrangulares formas dissectum fidelibus uersant, donec rotunditatem contrahat. uerum huiusmodi ibus tempore statim uescit, quod atomum aut syagrum appellant. Secundum locum habet Arabicum, & in Smilo nascens, quod alia qui copiscum uocant, munus multo & fuluius. Est & genus aliud, cui anomite cognomen est, alioqui candidum: quod dum mollior, mastiches more digitis cedit. Adulteratur in itinere, pini resina & gummi. quod facile deprehendi potest, siquidem suffitum gummi flammam non eiuculatur, & resina in fumum euanescit. thus uerò statim ardet. idem maleficium odor prodit. Diosc. In fistili mudo thus crematur, flagrans glebula succensum à lucerna, donec exiatur. post perfectam unctionem operire oportet, usque dum restinguatur. sic enim in cineres non redigitur. Aliqui ollulam æneo uase cauo circa medium perforato cingunt ad excipiendam fuliginem, ut in eius mentione mox ostendemus. alij crato fistili luto oblito, & in fornacem indito cremant. Fistili etiam nouo uiuacibus prunis torretur, dum non amplius bullet, aut pinguitudinem uaporum emittat. facile enim comminuitur, quod perustum non est. Diosc.

Fuliginem THVRIS sic facito: Forcipicula lucer= Thuris fuli-  
 nus accensas singulatim thuris glebas in nouam fœtilem 80.  
 ollam concavam imposito: & æreo uase in medio per-  
 forato, deterfa diligenter forde, obtegit. alteram admo-  
 ueto, ex altera eius parte aut utraque, subiectis quater-  
 nùm digitorum altitudine lapillis, quò facilius perfpici  
 queat, si urantur. & qua locus capax fuerit, glebulara a-  
 lias supponito. & antea quàm prorsus prior gleba re-  
 stinguatur, aliam imposito: donec sufficientem fuliginem  
 uidearis cœgisse. Continuo tamen externæ æramenti  
 partes spongia, aqua frigida madefacta, abstergantur. ita  
 enim temperato æris seruire, fuligo omnis inhærebit.  
 que alioqui per leuitatem decidua, thuris cineribus ad-  
 misceatur. Derasa itaque fuligine, cinis cremati thuris  
 seorsum substrahendus est. idem opus, quoad satisfaciũ  
 tibi uidebitur, obeundum. Simili modo è myrrha, re-  
 sina, styrace, reliquisq; lachrymis, fuligo excipitur, ad  
 eadem conueniens. Diosc.

Præfertur THVRIS cortex crassus, pinguis, odora Thuris cor-  
 tus, recēs, leuis, mûnime scaber, sine mēbranis. Adultera <sup>tex.</sup>  
 tur admisto pini aut nucis eius cortice. sed horum index  
 ignis est. siquidem reliqui cortices suffiti nequaquam in-  
 cenduntur, sed sine odore fumum eructant. thuris uerò  
 cortex ardet, & cum odoris fragrantia uaporem ei ac-  
 latur. thuris modo iuritur. & uis eadem que thuri, sed  
 ualidior astringentiorq; . Diosc.

Manna THVRIS probatur candore, micarum fræ Thuris māna  
 quentia, & puritate. Vim habet eandem, quan & thus,  
 sed in ualidiufculam. Sunt qui cribrata pini resina, ac  
 polline,



polline, aut cortice thuris confusi adulterant. sed hæc igne deprehenduntur. Neque enim æquè suffitu aerium vaporem, sed fuliginosum & impurum expuit, & per mustum suaevolentiae halius uirus habet. Diosc.

**Thymelæa.** THYMELAEAE folia, quæ peculiariter encorum appellantur, per messes colligi debent, & siccata in umbra recondi. Quibus dare libeat; antea tundere, & neruos eximere conuenit. Thymelææ farina uix acerbe succo excipitur, & in pastillos diuiditur. Hallucinatur, qui coccon guidium fructum esse chameleæ existimant, decepti quadam foliorum similitudine. Diosc.

De Thymelæa iterum, & chameleæ,  
quæ Arabum est mezereon.

**Cnidij gra-** Granum CNIDIVM ob nimiam acrimoniam cum  
**num.** deuorandum datur, pane aut adipe sepultum infunditur,  
**dos is chame-** alioqui gulâ & fauces accendit. Aluum purgat CHA  
**lææ.** MELAEAE, pituitum enim bilemque detrahitis, folijs in  
duabus partibus absinthij decoctis, succoque cum melle  
poto. Dioscoridi eosdem humores per aluum exigit, fo-  
lijs præsertim cum duabus partibus absinthij, hydromela  
**nota.** litæ exceptis, & in catapodio deuoratis. Sed catapodia  
eiusmodi, quotquot fuere deuorata, eadē forma qua sue-  
runt ingestæ, redduntur. Omnino enim in uentre non uin-  
**Thymelææ** Thymelææ rami Thymelææ cum suis folijs, & bac-  
**modus, siue** cis, leui igne decoctis ad deicienda aquosa corporis re-  
**dos is.** crementa: ad extenuandū quoque lienē, incremētū uitio la-  
borantē. Sed hæc medicorū sunt, non pharmacopolæarū.

Dosis

Dosis MEZEREI in decoctione datur Mesue à drachma media, ad drachman unam : in puluere à duobus ceratijs ad quinque . Paulus dat quatuor drachmas

Chamelæe in aqua mulsâ coctas, purgareq; dicit ut Eleborus. Cnidia uero grana à uiginti usque ad triginta.

THYMVS. Decocti dosis est Mesue à drachmis quinque usque ad decem, & pulueris ipsius à drachmis duabus usque ad quatuor. Mediocrementum sustinet decoctionem. si diu ac curiose teratur, magis urinas ciet, & minus aluum exinanit . Colligi in flore thymum oportet, & in umbra siccare.

TRAGACANTHA præstat pellucens, gracilis, læuis, sincera, & subdulcis. Diosc.

TRAGI herbarum racemorum acini tunduntur à pleuris, & in pastillos digesti asseruantur : quibus utuntur, cum opus est. Diosc.

TRAGORIGANVM optimum est Cilicium, & Cretense, & Smyrneum, & in Chio Cooq; proueniens.

TURPET. τούρπη. Si de re tam ambigua, ac tam controuersa semel statuendum est, quatuor uel fortè quinque res erunt, nomen Turbit suscipientes : Radix uidelicet Tripolij, de qua tractat Serapion sub nomine Turbit, quod & Caricamon uocat . Radix Pityusæ, quam Actuarius Turpeton, & quidam Dioscoridis interpretes Turpet uel Turbet appellarunt . Radix itè Alypiæ, quod cādidum Tourpeton idem Græcus auctor Actuarius cognominat . Radix præterea Tithymali feminæ Myrtilibus nuncupatæ, quod myrtili folium ferat, quæ

nunc

nunc passim sub Turbit nomenclatura utuntur medici,  
 9 Et eorum scilicet. Et quantum demum, (nisi penitus  
 somnium est,) quod radix est arboris, quam folio ferule  
 mesue som- consistare dixit Mesue. Ceterum tanetsi Arabes inter  
 nium. se, & cum Græcis in descriptione Turbit dissentiant,  
 omnes tamen easdem ferè vires illi attribuunt, ut ex co-  
 rum scriptis licet deprehendere. pariq; mensura frè  
 dos turbit. ipsum exhibent. Scrapion & Mesue contritum biben-  
 dum offerunt à drachma una usque ad drachmas duas,  
 in decoctionibus uerò usque ad drachmas quatuor.  
 dosistripolij Radix Tripolij duabus drachmis in uino potanda da-  
 tur, Dioscoridi. Pityusæ radixalui deiectionem mo-  
 Pityusæ mo- litur duobus denarijs in uino etiam pota, Plinio. datur  
 dus. Dioscoridi in aqua mulsadrachmis duabus. Alypion  
 uel Alypia aluum soluit, in aqua mulsadrachmis duabus, addito sa-  
 le modico. Minima potio est duarum drachmarum: me-  
 dosis Alypie. dia quatuor: maxima sex, ea purgatione, quibus datur  
 è gallinaceo iure. Depellitur atra bilis semine, Dioscori-  
 di, si mensura Epithymo pari, cum sale & aceto suman-  
 tur. Verum interanea leniter exulcerat. Datur autè Epi-  
 thymum ipsi Dioscoridi acetabuli mensura ad quatuor  
 drachmas, cum melle, sale, & aceti exiguo. Purgat an-  
 tem maximè bilem atram, qua purgata animi tristitia in  
 melancholicis pellitur: à qua uis seu facultate potuit illi  
 nomen fieri. Est enim Græcis Alypon, quod tristitia do-  
 loreq; caret aut liberat. Si nostrum Turbit, quo pas-  
 sim hodie utimur, radix sit Tithymali femine, ut pu-  
 tatur, drachmæ pondere iuxta præscriptam à Dioσκο-  
 ride quantitatem siue mensuram, in hydromelite potan-  
 da da-

da dabitur, ut per inferna trahat.

## V



ERATRI albi radices mes<sup>se</sup> Veratrū albū.

sibus colligendæ. Optimum habetur candidum, friabile, carnosum, modicè extentum, nec tamē iunci modo mucronatum, quod frangendo puluerem enuttit, & tenuem habet medullam, gustu

non admodum feruens, neque saluam subinde cibus. huiusmodi autem strangulat. Primatum Cyrenaicum tenet. Galaticum autem & Cappadocicum, candidiora, & puluere quodam obsita, celerius strangulatus mouet. Dioscorides.

Cæterum, modum unum præparandi ELLEBORVM inuenerunt longè facillimum. Raphanis dissectis inserere iubent Elleborum, rursusq; comprimere raphanos, ut uis pertransseat, atque eo lenimento dare. Hoc autem uomitione magis purgat, præsertim non præparatum. Apparent autem res uisu terribiles in uarijs ipsarū uomitionum coloribus. Sed & subdite quoque ex eo balnei (suppositoria uocant) cum aceto uomitiones concitant, atque eliciunt. Herophilus Elleborum fortissimè duci æquabat: concitatis enim inuis omnibus, ipsum in primis exire affirmabat. Ideo & errauisse antiquos, parcius id præbendo, cum celerius erumperet quod largius daretur. Reddi post quatuor quoque horas incipit, totum opus septenis peragitur horis. Themison bis

modus præparandi Elleborum album.

Elleborus albus uomitione purgat.

Herophilus alborum fortissimo duci æquabat.

Dosis veratri albi.

nas non amplius drachmas offerebat, sequentes quater-  
nas dedere. Atque hæc de ueratro albo dicta sufficiant.

Radices non uere, ut uoluit Mesue, sed mensibus cola-  
ligendæ sunt: quæ sole in usum ueniunt Dioscoridi.  
Itaque ipsi tenuissimæ radices breuesq; leguntur, sicuti  
et Plinio, ac uelut decurtatæ etiam hæ. Quod et Me-  
sue innuit cum ait, Et melior pars radices sunt fustes.  
Nam summa quæ est crassissima, cepis similis, canibus  
tantum datur purgationis causa, Plinio. Veteres radicem  
corticemq; carnosissimum, ut Barbarus annotauit, elige-  
bant, quo tenuior eximeretur medulla. Hanc humidis  
spongys opertam, turgescientemq; in longitudinem sin-  
debant: deinde fila in umbra siccabant, ijs utentes. Nunc  
ramulos à radice sua quam grauissimæ corticis, ita dan-  
tes. Inciditur et nunc Elleborum, et cribratur: cortex  
remanet, hoc summoto medulla cadit.

Veratrum ni-  
grum.

VERATRUM nigrum radicibus cohæret nigris, te-  
nuibus, à capitulo cepæ simili confibratis. quarum est  
usus. in collibus, asperis, et sitientibus locis enascitur.  
Optimū est quod ex huiusmodi petitur terris, ut ex An-  
ticyra. Nigrum inibi probatissimum gignitur. Eligi de-  
bet corpulentum et plenum, in quo tenuis sit medulla,  
acre gustu, feruensq; cuiusmodi est in Helicone, Parna-  
so, et Aetolia natum. attamen Heliconium præcellit.  
Emedullantur radices eius ueratri albi modo. Diosc.

delectus.

Elleborum nigrum maximè probatur Dioscoridi,  
quod in Anticyra, quæ in Locride siue Phocide sita est,  
prouenit. Eligitur carnosissimum, habitissimumq;, hoc  
est maximè corpulentum et plenum, medulla tenui, acre  
gustu,

gustu, feruensq; . Cuiusmodi est ( inquit Dioscorides )  
Helicone, Parnaso, & Aetolia natum. Quinquam boni-  
tas prima Heliconio tribuitur. Hoc perinde atque album  
cmedullatur.

**VIOLAE** succus, & Syropus ex ea confectus, eo= Viola succ<sup>o</sup>.  
dem, quo & flores & folia, modo aluum leniunt. Ea electio.  
assumi debet quæ prima se ostendit, cuius uirtus, nec à ca-  
lore resoluta est, nec à pluuia diluta, dissipatæ. Pos= dosis.  
tio decocti uiolarum est Mesuæ, ab uncijis quatuor usque  
ad octo. Succu uerò ab uncia una usque ad duas, & sy-  
ropi ab duabus uncijis usque ad quatuor. Condiuntur e-  
tiam uiolæ cum saccharo & melle; ex ea autem condi-  
tura dari potest ab uncia una usque ad tres uncias. Mi-  
xta autem saccharo minus, melli uero magis absterforia  
est. Proinde & minori quantitate assumenda.

**VIPERINAE** carnes, esui sic præparantur: Detra= Vipera.  
cta cute, caput caudaq;, quoniam carne uacant, amputa-  
ri debent. quippe commentitium est quod præcipitur,  
certam utrinque mensuram præcidi oportere. reliquum  
uerò corpus exemptis interaneis elotum dissectumq; dis-  
coquitur cum oleo, uino, salis exiguo, & anetho. Sal ex  
eis ad eadem conficitur, sed inefficacior est. uina autem  
uipera in fictile nouum demittitur. adiiciuntur salis ca-  
ricarumq; tritarum, singulatum quinque sextarij, mellis  
cyathi sex. mox fictilis operculum luto oblinitur, & for-  
nacibus inassatur, donec sal in carbones redigatur. qui  
postea trius in pulueris faciem, reconditur. Plerunque,  
ut ori gravior fiat, immiscetur nardi spica, aut folium, aut  
malabathri momentum. Diose.



**Viscum.** VISCVM optimum est recens, intus porraceum, extra solum quod asperi nihil, aut firsurosi conceperit. Fit acinis in robore nascentibus, buxco fruticis folio. contusum acinum lauant, & postea in aqua decoquunt. sunt qui commanducando ipsum efficiant. gignitur quoque in malo, pyro, & plerisque alijs arboribus. quinetiam inuenitur in quorundam fruticum radicibus. Dioscorides.

**Vnguis odoratus.** VNGVIS odoratus laudatissimus, qui à rubro mari deferitur, candicans, pinguis. Babylonius nigrescit, atque minor conficitur. Diosc.

APPARATVS SIMPLICIVM  
MEDICAMENTORVM  
FINIS.

# De compositione me-

## DICAMINVM GENE-

### RALIVM,

#### EX PAVLO AEGINETA.

### De Paſtillis.



ASTILLI Græcè trochisci à figura nominantur. Tres sunt eorum species. alij nanque sunt potabiles, alij in aluum dantur, alij delinuntur. Ex his igitur qui potantur, alij comprimunt aluum, aut sanguinem, aut

aliam quampiam fluxionem, refrigerando, aut astringendo, aut opplendo, aut desiccando eam cohibentes: quemadmodum qui constat spina Aegyptia, & qui seminibus, confimilesq;: Alij dolorem sopiunt, uel quòd sensum obstupefaciant, uti crocodes dictus, uel quòd humores diffundant, ueluti ex aromatis confecti: alij lienem, aut renes, aut iecur obstructione liberant, ut qui ex amaris amygdalis conficitur. Eorum uerò qui in aluum induntur, nonnulli acrimoniam obtundunt. ut in torminibus intestinorum, quemadmodum ex pompholyge, amylo, terra samia, ex cremore ptisanæ aut eiusmodi aliquo præparati. nonnulli alui aut sanguinis profluuium astringunt, sicuti qui alumine, acacia, & omphacio constant, qualis est Philippi, quiq; ex spina constituitur Aegyptia,

cum rosarum aut plataginis infusi succo: nonnulli adu-  
rentes, dysenteriae, quam ulcera depascentia exercent,  
idonei: ex sandaracha, auripigmento, calce, charta com-  
busta, confecti. Inferentur autem cum succo lenticulae aut  
oryzae, sic ut intestinum prius muria cloium sit, & gerat  
cibum & potum antea assumpserit, ne aliquid medica-  
menti uirtutis reliquum, ad stomachum rapiatur. Ceterum  
utiles sunt pastilli qui ab inferioribus partibus injiciun-  
tur, ad affectus pouissimum, qui infra umbilicum insistant.  
Nam superius uis ipsorum peruenire non potest. At qui  
declinuntur simuleis illis uireis obinient, uerum astringen-  
tes, in herpete, papulis, quae dicuntur exanthemata, in-  
tertriginibus, sanguinis eruptionibus, & fluidis ulceri-  
bus proficiunt: cuiusmodi est Andronius & Polydæ. qui  
uero obtundunt, carbunculis & maleficis ulceribus ex-  
pediunt: utpote leucus dielus, & dialotarion. uetres, si-  
cut iam comprehensi, cuius generis habentur & Faustia-  
ni, serpentibus naturalium & sedis ulceribus, pterogys,  
& carnosissimum uilijs accommodantur.

De medicamentis quibus aridis utimur,  
xeria dicuntur, & Smegmatis.

**A**ridorum medicamentorum, quae sunt & cataplas-  
mata ab inspergendo uocantur, alia ulceribus con-  
gruunt, alia cuti applicantur: ex his quae ulceribus fa-  
ciunt, quaedam cauis carnem inducunt, quaedam excre-  
scentia reprimunt, quaedam cicatricem generant, quaedam  
erunt exeduntque, nonnulla sanguinem coeherent. Quae  
igitur carni generanda sunt, uel repurgando sordida,  
carnem

carne[m] creant, ut quæ constant ex eruo, aristolochia, iride, panace, myrrha, thure, aloë, uel humiditatem suam perfluam desiccando, ueluti quæ fiunt ex ære, diphyrge, squama, charta cōbusta, piceæ cortice, & spina, quæ & ipsa cicatricem obducunt: uel acrimoniā rosionemq; obtundendo, qualia sunt ex pompholyge, amylo, cerussa, speculario, ostreis crematis, terra sania, & consimilibus, & quæ compositorum ex his uireis habēt. Ex reprimentibus lenia quidem sunt, quæ constant squama æris, quæ misy, chalcitide combustis, & galla: ualentiora uerò sunt, quæ atramēto sutorio, ærugine, misy, chalcitide, ignem non expertis. Vrentia uerò exedentiaq; fiunt ex calce, auripigmento, sandaracha, & fece uini combusta, quam uocant spheclen, hoc est sæculam: atque hæc omnia componuntur. cæterum in tenuissimum redacta pollinem, si ulceribus inspergantur minus rodunt: si spissiora, magis. Sanguinem reprimentia aut astringendo, aut refrigerando, aut siccando, aut opplendo, aut urendo faciendoq; crustam, illum coërcent, quorum materiam capite de Pastillis sumus exequuti. At eorū quæ cuti admouentur, alia abstergunt, exteruntq; , ut ex cimolia, pumice, lomento, fermento hordei, peponum carne, & salis flore confecta: alia extenuant & discutunt, qualia fiunt ex ueratro, alcyonio, sulfure, herba pediculari, sinapi, pyrethro, cachry, terra lemnia, sepiæ testa: atque hæc, assumpta calce & auripigmento cum liquore aliquo, pilis abolendis idonea & smeigmata fiunt. Quædam capiti admouentur, ut fluxum ex co ruentem desiccent, cuiusmodi sunt ex nitro, sale, galla, malicorio,

Et id genus alijs præparata. omnia uero smeigmata cui non inunctæ accommodari debent.

De medicamentis liquidis quæ illinuntur, ad  
oris uitia, unde stomatica dicuntur,  
ac guttur accommodatis.

**Q**uanto rarior molliorq; est cutis, quæ corpus totum obtegit, quàm oris tunica, tanto etiam magis stomaticorum medicaminum usus euariat. Quum igitur inflammatio incipit, ea requiruntur medicamenta, quæ humoris influxum repellunt, cuiusmodi sunt, arida quædam, omphacium, galla omphacitis, succus rhu, et hyssopisibidis, alumen, cortex piceæ et thuris, balaustia, et generatim omnia quæ astringunt, ita ut insuauem inegratamq; et lethalem uim non representet. liquida uero, succus mororum, tum quæ batina, tum quæ sycamuna dicuntur, item nucum uiridium corticis, et mali punici, præsertim acidi, et malorum cotoneorum, mustum, ac mineumq;. mel autem per initia solum ut medicamenta adhereant temperatur. At quum humor substituerit, muresceri debent quæ concoquant et mediocriter dissipent, cuius generis est crocus, myrrha, et dulcis radicule succus. Ac per totum id temporis quod inter principium et declinationem intercedit, recte nuscetur utrumque et repellens et discutiens: et primum quidem superabunt repellentia, deinde digerentia: in morbi declinatione solum uti digerentibus absq; astringitione oportet, qualia sunt nitrum, aphronitrum, origanum, hyssopum, thymus, nepita,

nepita, iris, besafa, consimuliaq; . liquor autem tunc sapa esto, tum quæ ex musto decocto, tum quæ ex caricis & palmaris conficitur, ipsumq; dulce mustum cum melle: ubi uero ueluti reliquæ quædam inflammationis remanserint, etiam sulphur ignem non expertum miscebimus: succos autem primum cum melle incoquimus, dum liquidioris mellis spissitudo fiat, inde sic arida in tenuissimam pollinem pertrita inspergemus, postea modicè coquemus, quoad omnia exactè in unitatem cogantur, quo facto in uitreum uas medicamentum transfundemus.

### De collyrijs & agglutinamentis.

**V**aria ocularium medicamentorum materies existit, etenim liquores, succi, semina, fructus, particule stirpium, & metallica his inferuntur: ex quibus alia acrimoniam leniunt & ueluti opplent obstruuntq; utpote pompholyx, spodium, amyllum, plumbum, terra samia, cadmia, eaq; omnia lota, & candidus oui liquor. Quibus ita utendum est, ut caput prius uacuationem experiat: Nam si repletum fuerit, melius est ne oculorum tunice humoribus distente perrumpantur. Alia contrariam his naturam obtinent, nempe acrem, recludendis uacuandisq; ijs quæ diu impacta fuerunt accommodata, quemadmodum liquores Cyrenæicus, Medicus, sagapenum, euphorbium & consimilia. Nonnulla sordidis ulceribus abstergendis conueniunt, qualis est squama æris, ipsumq; æs, chalcitis, misy, fori, flos æris, stinni, concremata omnia. Quædam his uicina sunt, smectica ab exterendis sordibus appellata, cuiusmodi est auria



pigmentum, sandaracha, & lapidis asij flos. Sunt & astringentia, atq; ex his quæ mediocriter id faciunt ne-  
hementer lippitudini, ulceribus, & defluctionibus con-  
ducunt, nempe rosarum folia, & flores, & fructus, spi-  
ca nardi, phylum, crocus, glaucium & hypocisthis.

Quæ uehementiorem astringendi uim representant,  
oculorum claritati conducentibus potissimum medicinis  
muscuntur, cuius generis est omphacium, acacia, balau-  
stium, saluæ punice flos, & galla. Alia concoquunt,  
discuntiq; ut myrrha, crocus, castoriū, lachryma thu-  
ris, fœnugræci succus. Porro ex cōpositis oculorum  
remedijs, alia delinuntur, simplicemq; appellationem ha-  
bent, alia xerocollyria, alia hygrocollyria uocantur.

Quæ igitur delinuntur omnem comprehensam mate-  
riā recipiunt, omnibusq; conferunt affectibus: ceterum  
uere præsertim præparari debent, æstate siquidē uirtus  
ipsorum perspirat euanescentq; hyeme species gelu rigi-  
dæ temperari nequeunt. Conterere autem ea oportet li-  
quore non copiose affuso, ne metallica subsistant, arom-  
ata supernatent, uerū modicè, ut sordium modo conte-  
ratur. Aqua uerò pluuialis erit, tum quod tenuis sit, tum  
quod modicè astringat. Sin uino aut succo aliquo leui-  
gentur, teranturq; eadem, metallica sanè longo tempo-  
re, quæ autem succo constant, exiguo leuigantur. de-  
mum ubi satis leuia euaserint, gummu adijcietur, in for-  
mamq; redacta, uasis maximè æreis aut uitreis reponen-  
tur. Ceterum ijs quæ è succo conficiuntur, protinus  
uili licet: metallica uetustate redduntur meliora. Porro  
inter collyria arida quædam consumunt exteruntq; cal-  
los,

los, ficos, unguis, scabiosaq; uitia, è chalcitide, æruginè  
 & misy composita. Quædam lachrymas mouent, oba  
 structionibus & hebetudini accommodata. quæ tum ex  
 bis tum ex pipere & spica nardi fiunt. Sunt quæ præ  
 seruent tueanturq; oculos ab humorum influxu, cuiusmo  
 di ex lapide phrygio, sarcocolla, glaucio, aloë, cadmia,  
 summi, croco: omnia in tenuissimum pollinem coacta o  
 culis applicantur. At liquida collyria fiunt ex melle  
 Attico, opobalsamo, oleo ob uetustatem tenui, sceniculi  
 succo, diuersorum animalium felle, liquore cyrenaico,  
 alysq; compluribus. Conferunt hebetudini, suffusioniq;  
 incipienti, cum extenuent, calefaciât, purgentq;. Vtendû  
 bis est, & omnibus acribus, ubi caput repletionè caret,  
 sub dio, aëre puro, aquilonio, non nimis frigido, neque  
 item calido nimium. At agglutinamēta quæ anacolle  
 mata Græcè dicuntur, ex medicamētis præparantur quæ  
 obstruunt, opplentq;, glutinant, compingūt, aut refrige  
 rant, aut astringunt, siccantue, qualis est farina pollen,  
 māna, terra samia, myrrha, cochleæ, acacia, opium, cum  
 candido oui liquore. glutinantur autem fronti in quibus  
 humor nō intra caluatia delitescit, sed extrinsecus fluit.

De Emplastris, & medicamentorum quæ  
 ipsis immittuntur cōctione, tum qui ce  
 ræ modus cum oleo esse debeat, ex com  
 mentariis Antylli.

**M**edicamentorū quæ Emplastrā ingrediuntur, alia  
 sunt terrestria, utpote metallica, lapidumq; &  
 terræ

terre species, feces, cinis, & conchyliæ. alia sunt olea-  
 menta, alia lachrymæ, alia liquari possunt: quædã liquo-  
 res, quædam succi sunt, semina uerò, herbas, & radices  
 pauca recipiunt. Cæterum ex ipsis emplastris nonnul-  
 la sunt uulneraria, quæ enema, quòd cruetis iniiciantur:  
 colletica, quòd glutinent: & catagmatica, quòd fracturis  
 accomodentur, appellamus. Constare autem ex siccanti-  
 bus non summè, uerùm secundi ordinis absoluti, & ter-  
 tij incipientis, oportet, cuiusmodi sunt salix, quercus, cu-  
 pressus, piceæ & tedæ cortices, myrrha, thuris lachry-  
 ma, bitumen, aloë, aristolochia, cinis sarmentaceus, ceru-  
 fa, spuma argenti & pleraq; ex metallicis. Coqui debêt  
 quousq; manus amplius non inquinèt. Porro quæ ci-  
 catricem ducunt emplastra & ipsa ex siccantibus cõpo-  
 nuntur, uerùm efficacioribus quam glutinatoria, quod ge-  
 nus est æs combustum, squama tum eius, tum ferri, æru-  
 go, chalcitis, æris flos combustus, alumen, galla, plumba-  
 go, cadmua, pumex, & ostracea. Digredientia uerò &  
 calefacientibus & siccantibus modicè fiunt, nempe ari-  
 stolochia, thapsia, cleo ueteri, & raphanino, melle, opo-  
 balsamo, pice, resina terebinthina, galbano, sale combu-  
 sto, salis flore. Quæ emolliunt, ex argenti spuma, adi-  
 pibus, medullis, oleo ueteri, propoli, ammoniaco, styra-  
 ce, galbano, bdellio, mastiche, resina terebinthina, uel ra-  
 dice althææ & cucumeris syluestris, præparantur.

Siccantia, ex sulphure, nitro, sale, cinere, & bitumine.

Ad extrahendum accommodata, fiunt ex sale, nitro,  
 propoli, ærugine, fermento, stercore, sulphure, terebin-  
 thina. Quæ concoquunt, ex cera, ladano, uua passa,

anomo,

amomo, croco, thure, pice, mastiche Aegyptia, styrace, myrrha, galbano, butyro, hyssopo, adipe, ærugine.

Pus mouëtia, ex hydrelæo, polline, pane triticeo, chōdro, butyro, adipe suillo & uitulino, thure, pice, resina.

Quæ uerò leniunt dolores, argenti ssuma cōstant, ce-  
russa, oleo, anetho, chamæmelo, amylo, cera tracta. Iā  
uerò enæma dicta, recentibus adhuc uulneribus & fra-  
cturis iniici debent, adiuuariq; è summa spleniorum par-  
te spongys posca madentibus simul illigatis, solui tertio  
quoque die, & rursus eadem splenia non alia accommo-  
dari oportet. At quæ emolliunt, extrahūt, digerunt,  
concoquunt, & pus præterea mouent, post cataplasma-  
tum ceratorumq; usum adhibentur. Quæ leniunt e-  
tiam, per initia statim, summis potissimum partibus ap-  
plicantur. Cæterum quomodo coquantur, deinceps ex-  
quemur.

## Quomodo medicamenta quæ Emplastra ingrediuntur coqui debeant.

### ÆR V G O.

ÆR V G O uiridibus emplastris post coctionem in-  
ijcitur. In aliquibus autem neutiquam ollæ inditur,  
sed cum aceto detritæ ipsi, manentiq; in pila reliqua su-  
perfunduntur. In melinis emplastris, cum semicocta est  
confectio immittitur: nam moderatam consecuta co-  
ctionem, melinum colorem efficit. At in his, quæ dipro-  
sopa & dichroma dicuntur, per initia statim æruginem  
incoquimus.

Alumen

## ALUMEN.

Alumen plerunque post coctionem additur, peculiarē rem uero coctionis modum nullum habet.

## MINIVM, CADMIA &amp; POMPHOLYX.

Minium in fine admiscetur, Cadmia & Pompholyx per initia immittuntur.

## ALOE.

Aloë post coctionem inspergitur.

## AVRIPIGMENTVM &amp; SANDARACHA.

Auripigmentum, & sandaracha in coctionis fine iniiciuntur.

## AES crematum.

Aes crematum non protinus ab initio ad coquendum iniicitur, sed ubi emplastrum semicoctum fuerit. finis coquendi est, quum color ipsius, nisi admodum exiguum indatur, superat, & emplastrum rufum efficit.

## - ARGENTI spuma.

In medicaminum coctionibus argenti spuma cū oleo decoquetur. conuenit autem leuigatam rursus ex oleo conterere, ut sordium fiat spissitudo. inde leni igne excoquere continenter mouendo. Initio igitur intumescit, & in bullas attollitur: ubi uero iam ferè satis incocta fuerit, colorem facii similiorem recipit. Modus coctionis est, quum à tumore subsidit, & manus non inquinat.

## ATRAMENTVM Sutorium.

Atramentum sutorium in media coctione emplastro inditur, coctum uero uehementiorem eius colorem efficit, & si quia ei non resistant, nigrum.

## APOCHYMA, pix nauibus deraſa.

Apochyma læuigatum cribroq; ab excrementis ſuis ſecretum emplaſtro, poſtea quàm coctum fuerit, inſpergitur. Si autem molle fuerit, cum oleo miſcetur. ſed prima ratio coquendi exactior eſt, quòd ſcilicet in ſecunda pondus non conſeruetur.

## AERIS FLOS.

Aeris flos ſimiliter æri coquitur, ſed eo modo qui communis eſſe coctioni ſolet.

## AMMONIACVM.

Ammoniacum circiter median coctionem inijcitur: detritum uerò, ſi poteſt fieri, & in tenuem redactum puluerem inſpergere conuenit: ſi minus, cum liquore quodam læuigatum inijcere: ſi emplaſtrum cruentis uulneribus adaptabitur, cum aceto, aut uino: ſi fiſtulis aut ſtrumis, omnino cum aceto: aut ſi molle futurũ eſt, quælia ſunt quæ ano accommodantur, cum aqua: inde in ſordium ſpiſſitudinem coactum alijs refrigeratis inſundere, ne eſſeſcunt.

## BDELLIVM.

**B**DELLIVM in læuorem pertritum, emplaſtro ab igne iam ſublato inſpergitur: at ſi pingue exiſtat, & læuigari non poſſit, ſagapeno ſimiliter ipſum cõtuſum, ac in emplaſtri figuram coactum, poſt coctionem ſimul cum emplaſtro molliemus.

## BITVMEN.

Bitumen inter initia iniectum coquitur, non autem id in læuorem deterere oportet, quoniam aſperitudines ſicigranis interioribus ſimuleis obtinet. Quapropter in craſſiores



flores particulas confringendum est, coquendumq; in aceto, sic ut non agitetur usq; dum ebullire desinat: Ego uero (inquit Timocrates) in oleo decoquens, uoti compos euasi.

## CHALCITIS.

CHALCITIS incoquitur aris modo, coctionemq; ipsius metimur inde, si emplastrum solum magis & phœniceum euaserit.

## CERUSA.

Cerusa in alba emplastra postremo mittitur, sic enim colorem conseruat, magisq; albescit: in nigra autem, principio: coacta enim largius, nigrescit.

## CERA.

Cera priuatim sola non coquitur, ut quæ aduratur, neq; cum resina liquida, aut pice liquida, non enim coit spissa saturq; uerum superinijcitur, uel oleo puro, uel oleoso cuiuspiam liquori cum quodam metallico incocto, aut resine, aut pici prius incoctæ.

## GALBANVM.

GALBANVM neuiquam coctionem tolerat, uerum emplastro ab igne sublato, ut digitos non inquinet, emollitum inditur.

## LACHRYMA papaueris.

LACHRYMA papaueris pridie in aqua modica maceratur, inde in pila leuigatur, mox etiam emplastrum ei superfunditur.

## LACHRYMA Thuris, &amp; manna.

Lachryma thuris & manna, coctione iam absoluta insperguntur, in sordium spissitudinē coacta ex melle modo dico,

dico, aut aceto, aut aqua, aut uino, si emplastrum liquorem recipiat.

## MISY.

MISY postremo adijcitur: quandiu autem coqui debeat, proprie definitum non est.

## MYRRHA.

Myrrha, ubi iam coctio finita est, inditur.

## OLEVM, &amp; reliqua pinguis.

OLEVM siquidem per initia fuerit iniectum, resinæ aut pici liquidæ, emplastrum non spissescit, quare ubi crassa euaserint incocta, rectè indetur, reliqua uero pinguis insulsa, iuxta mediam coctionem adiungere conuenit.

## OPOPANAX.

Opopanax multò post ammoniacum inditur: omnino autem paucam coctionem requirit. Idem etiam ex uino acetone prius læuigandus est.

## PIX.

PIX ante reliqua omnia additur. Modus autem coctionis, liquidæ, dum inspissatur: aridæ, maxime dum non amplius inter coquendum ebullit, neque inturgescit.

## PLUMBAGO.

Plumbago similiter argenti spumæ excoquitur, sed eo usque, dum non modo digitos non inquinet, uerumetiam ex igneo colore in rufum, & uehementer floridum elanquescat.

## PLUMBVMustum.

Plumbumustum in media coctione adiungitur.

## PROPOLIS.

Propolin emollire & discoquere oportet: si quidem à coctione neutiquam diffunditur. At si & ceram emplastrū recipiat, propolin cum illa quemadmodum & galbanū, contusam inuicemus.

## RESINA.

RESINA arida, cum cera immittitur: liquida ante omnia alia ipsa priuatim decoquitur, nisi admodum paululum eius assumatur.

## SAL, NITRVM, SVLFVR.

SAL & nitrum in medio coctionis: sulphur, in fine adijciatur. Scitur, coctio autem ipsius emplastra nigrefacit.

## SAGAPENVVM.

Sagapenum tunditur in pila, & teneriusculum redditū cum emplastro ubi ab igne sublatum fuerit, emollitur.

## SEMINA, RADICES, &amp; HERBAE.

Semina, radices, & herbae, nullam coctionem sustinent: leuigatis igitur, & in pila etiamnum subsistētibz liquida superfunduntur,

## SORI &amp; DIPHYRGES.

Sori & diphryges demittuntur in media coctione lebeti: diphryges autem, sicut & squama, couisq; coquitur dum colore reliqua uincat. Sori peculiarem coctionis finem non habet, sed is omnibus communis est, ut emplastrum spissum reddatur, digitosq; non inquinet.

## TERRA &amp; lapides, pumex, conchyliis.

TERRAM omnem & lapides plerunq; ad coctionis finem iniicimus. item pumicem, & conchyliis combusta.

Thapsia

## THAPSIA.

Thapsia inspergitur postrema, uel liquore quodam leuigatur.

## VNGVENTA.

VNGVENTVM irinum coctionem quidem fert, sed cyprinum & rosaceum, minus: reliqua neutiquā. quare ad finem coctionis, immittenda sunt.

## De malagmatis, &amp; epithematis.

Inter ea quæ malagmata dicuntur, alia medijs corporis partibus iniiciuntur, longa inflammatione consiliantibus, aut induratis, aut aestu flagrantibus, aut per frictionem, fluxionemue expertis: alia articulis quibus humores sint impacti, uel neruis refrigeratis, uel etiam alijs particulis scirro obseſis congruunt. De his igitur tum in capite de emplastris tractatum est, tum ubi ad acopuentū erit differetur. Porro inter malagmata medijs corporis regionibus accommodata (epithemata proprie nuncupantur) quæ quidem stomacho & iocineri admoventur, qualiacunq; illa fuerint, roborantē ex astringentibus iam postulant. Sine his etenim uitæ aliquod discrimē intulerint. cum illa nempe stomachus & iecur communes aliarū partiū alimētū sint officinæ. Quamobrē eiusmodi medicamēta ex aromatis potissimū conficiuntur. Stomacho igitur iniici debent, si non cōcoquit, aut infirmatur, aut inflatione laborat, malagmata ex senibus, meliloto, aloë, absinthio, sanpsucho, nardo & mastiche. Iecori autē ex myrobalano cōfecta, ammoniaco, adipibus, & chamæmelino. At lieni applicantur, quæ cōstant calce uiuā, auripigmento, cappari, salicibus, cardamomo, ærugine,

ammoniaco, & aceto: ijs autem qui alui fluore laborant, ex cennâthe, alumine, melino, & alijs astringētibus præparata. etenim hæc etiam per abusionem communiter malagmata nominât, & si diuersam à molliendo uim repræsentent. Si uerò ardor uiscera urgeat, ut in febribus ardentibus, ex croco competunt malagmata, rosaceo, succo lini seminis, aut intybi, aut polygoni, adipe suillo, & spuma argenti: si perfrixerunt, ea quæ opobalsamum, phyllum, casanum, & piper recipiunt. Pectori cum sanguis eijcitur, prosunt astringentia, siccantiâq; ex alumine, salice, & bitumine. In tabe quæ phthisis dicitur, cōducunt ex baccis lauri, marrubio, cardamomo, & lixiuio confecta.

Qui ceræ modus cum oleo esse debeat.

QVOD si unguina, ut quæ Græci à leuanda lassitudine acopa appellant) cōficere constitueris, oleum ceræ quadruplum immittes: at si liquidum ceratum, ut in fracturis præparamus, duplicatum. Si medicamentum quod emplastri figuram habeat efficere cogitauerimus, portionē olei ceræ æqualem miscebimus, si aer ambiens moderatus extiterit: at si cera uetus aut squallida, aer frigidus fuerit, oleū paulò copiosius quàm cera erit: quemadmodum & si cera pinguis, aer existat calidus, paulò minor olei portio erit. paulum autem hoc, medij in utrâq; libet partē excessus duodecima erit portio, etenim aliàs undecim aliàs tredecim olei uncias, ceræ libræ admiscebis.

De acopis, inunctionibus, dropacibus,  
& sinapismis.

**A**COPIA inde nomen sortiuntur, quod præcipue ad lassitudinis quæ copos Græcè dicitur, puta tensiue, ulcerosæ, & eius quæ ossa defatigat, sensum conueniant, quamquam alijs quoque morbis compluribus sint ex usu. Alia siquidem ipsorum calefaciendi uim habent, alia emolliendi, alia ulcerandi. Quæ calefaciunt, piper, pyrethro, cachry, & consimilibus constant: neruorum uitijs, perfrictionibus ualidis & quæ uix ullo calore possunt euinci, accommodata. Quæ emolliunt, ad durities, scirros, & infarctos articulorum sinus conueniunt, quorum materies capite de emplastris comprehensa est. At ulcerantibus quæ ad arce, cachry, euphorbio, cocco gnidio, & id genus alijs componuntur, in diuturnis affectibus, & qui ægrè possunt elidi, quibus etiam sinapismus congruit, utimur. Porro spissitudinem uniuersa acopa inter cerata & emplastra mediam habere conuenit. Vnguiua uero acopis similia, liquidiorē ferè substantiam obtinent. At dropax duplicem recipit præparationem: hanc emplastro, illam magis lagmati consimilem, nonnulli & calidum ipsum illinunt, materiam uero acopis & emplastris cōfinem. Cæterum usum cataplasmati exhibet, diuturnis affectibus iisdem quibus & sinapismus, utilis, ideoq; ante illum assumitur, quo corpus ad sinapi reddatur idoneum: à sinapismo etiā adhibetur, ut affectus reliquias discutiat. Sinapismus materiam quidem uariam non habet, uerion



diuturnis potissimum affectibus post inutilem aliorum præsidiorum uim efficacissimus est : utilissimè autem applicatur capiti in eius dolore quem cephalæam dicunt, & quum altera duntaxat ipsius pars affligitur ( Græci heterocraniam uocant ) in morbo comitiali, uertiginibus, & insania : pectori autem in suspirio, orthopnoea, hoc est quum non nisi recta ceruice spiritus trahitur, & tussi longa. At in diuturna humorum e capite in fauceis destillatione, & caput & thorax sinapi oblini debet. Item stomachus & uenter in longis ipsorum morbis eodem obducuntur. Iam conueniens est præsidium sinapi coxendicum & podagricis doloribus, omniq; parti resolutæ, aut alio quodam modo perfrictionem expertæ, ut difficulter excalescere possit. Ac tunc profecisse satis id putato, ubi dolor subsecutus fuerit ualidus, & caro liuidior altiorq; euaserit, & postquam ablotum fuerit nutius pustulæ erupuerint. Quod si etiam sensus perierit, animum adhibere negotio conuenit, parte quam obleueris sæpius detecta : nam si uel immodicè adurantur ita affecti non persentiscunt. Præterea in acutis morbis, utpote lethargo, profunda in somnum delatione, ( cataphora dicitur ) & catocho, sinapi inducitur, per initia quidem cruribus : ubi uerò materia radices egerit, capiti. Porro qui ita frigori patuerunt ut uix ullo modo queant incallescere, ijs crura & cubitos sinapi obliniuntur. In his autem qui continua febre laborant, ulcusq; habent, tum in cartilaginosis, tum locis ex carnibus, uitari debet sinapismus, nam partes carnibus uacuae si obducantur sinapi, uruntur, interim etiam nigrescunt.

Quomodo diuersa olei & unguentorum  
genera conficiantur.

**I**NVNCTIONVM unguentorumq; uel olei generum,  
quæ unguenta representent, alia sunt simplicia, una  
olei specie iniecta: alia composita, ex pluribus conflatæ.  
Ac simplicium alia ex floribus oleo incoctis efficiuntur,  
uerbi causa, rosaceum chamæmelinum, susinum. Quæ-  
dam ex fructibus & seminibus conficiuntur. quædam  
ex stirpibus quibusdā, ut rutæ, qui etiam simul cum oleo  
coquantur, ideo cum nullus florum coctionem sustineat,  
insolantur potius. uerum si ualidam odoris gratiam re-  
presentent, & constantem, ex insolatu plurium dicrum  
tenuius ipsorum oleum magisq; utile redditur, quemad-  
modum rosaceum & chamæmelinum. Qui inualidiores  
sunt, faciliusq; diffilari possunt, minus insolatum tole-  
rant, ut quorum uirtus promptè euanesca, utpote lilium  
& uiola. Ex his quæ fructibus & seminibus constant,  
nonnulla illis integris oleo inieclis conficiuntur, ueluti  
melinum. nonnulla contusis uel læuigatis, oleamine ipso-  
rum sequestrato, uel expressis ipsis in prælis: uel ex æ-  
qua calida, sic ut ipsa discernantur, exempli causa, caryi-  
non, sesamum, amygdalinum, lentiscinum, laurinum, ri-  
cinum, raphaninum, atque eius notæ alia. Porro quæ  
ex stirpibus odoratis componuntur, præparari potissi-  
mum solent, illis oleo incoctis cum uino uel musto uel  
aqua, atque eisdem deinde exemptis. Liquoribus autem  
quibusdā oleo temperatis interim & adipibus uel  
medullis, ex huiusmodi aliquo exactum olei spissitudine

sortita, simplici sermone unguenta uel inunctiones nominantur, ut glucinum, nardinum, sicyonium & cyprium. Sunt quæ acopa crassitudine representent, ceram aut resinam aut eiusmodi quippiam recipientia, uocanturq; myracopa, ueluti decamyron, amaracinum, atque his similia. Iam uerò aliqua una uice coquuntur, quæ non diuersam recipiunt materiam, sicuti metopion, mastichinum, sicyonium: aliqua duabus tribusue & quatuor iniectionibus. Primum contumacioribus incoctis, ut asphaltum, palmeo sarculo, thure arbore, lauro: inde aromatis, phyllo, spica nardi, anomo, herba sabina: postremo liquoribus, adipibus & medullis. & si eueniat, cera quoque & resins inditis. At balsamum liquor neuiquam coquitur, sed post absolutam coctionem, unguento medio-criter refrigerato instillatur. imò ex ipsis unguentis sunt quæ nullam coctionem recipiant, sed tantum muscantur, quale est mendesium. Nonnulli uerò uiride unguentum reddere cogitantes, ubi ab igne sustulerunt, in olei sextarium æruginis rasæ in exactum detritæ Leuorem scisciciam immuscent, quemadmodum in cyprino & amaracino. Cæterum simplicia quidem unguenta specierum quæ in ipsa mutantur, naturam, uel eorum ex quibus confusis facta sunt, obtinent, ut oleum ueluti materię rationem obtineat. At quæ uariam magis compositionem sortita sunt, tota eorum natura ad calidum inclinata est, sed quedam ualide calefaciunt emolliuntq; ut etiam articulis recenti cicatrice obductis, & sinibus eorum infarctis conueniant, ueluti metopium, mendesium, marciatum: mediocrius autem est pentamyron, quemadmodum decamyron

myron valentius, ut etiam superficiem rodat. Sunt quæ mediocriter calida, tenuiaq; existunt. ea dolores leniunt, & concoquunt, quale est fusinum, amaracinum, irinum, crocinum, foliatum. Alia præter quàm quòd calefaciunt, abundè siccant inciduntq; , ueluti cyprinum & sicyonium. Alia calefaciunt quidem insigniter, sed uires magis confirmant, unde stomacho potissimum & uisceribus resolutis competunt, qualia habentur mastichinum, nardinum, & gleucinum. Valentius adhuc corroborat, quod ex labrusca conficitur. Iam nonnullis unguentis obgratum duntaxat odorem mulieres utuntur, ut foliato, spicato, commageno, & quæ moschella, quasi dicas, ex moscho & oleo confecta nuncupantur.

FINIS.

# E primo libro Galeni

## DE COMPOSITIONE

## MEDICAMENTORVM

### KATA GENH.

*Quæ præscire conuenit eum qui Medicamenta probè compositurus sit.*



**E**XPOSITVM est alibi, simplicium medicamentorū uires nō solum generatim noscendas esse, ut quidam scripserunt, ponentes ea uel calefacere, uel refrigerare, uel siccare, uel humectare: uerū distinetē, membratimque, ex quo sint ordine singula, uti nos docuimus. Quandoquidem igitur nonnulla medicamina obscure prorsus uanumquodq; prædictorum efficiunt, quædam manifestō, aliqua ualide, sicut alia absolute, nō satis est nouisse phar macum hoc calefaciendi, aut refrigerandi uirtutem habere, sed quantam habeat, definire oportet. Recalefaciunt enim resinae omnes, idq; sibi cōmune habent: attamen maioris minorisq; rationem non exiguan in calore sortitæ sunt. Item succi plures non mediocriter, ratione ad maius minusq; facta differentes, excalefaciunt. Nam si panacis succum cyrenæo & medico cōmisceas, uidebitur tibi ille nihil ceu ad hos esse. At quorsum attinet sermonē ab ijs quibus utimur quotidie, diuertere longius, memores

adhuc

adhuc illorum differentie? Anethum siquidem & ruta, cepa; omnia calida medicamenta magno inter se uariant discrimine. Quapropter in curationibus particulae admodum refrigeratæ, medicamentum quod impense calefaciat admouebimus: illi uero quod paululum à naturali habitu recepit, modico leni; calore præditum, sicut insigniter refrigeratæ uehementissimè calefaciens pharmacum adhibebitur. Merito igitur quatuor nos ex calefacientium ordines statuimus: separantes à modicè calidis ea quæ euidenti eiusmodi qualitate præcellunt: tum quæ magna & uehementi adeo, ut urere uideantur. In singulis autem illis quatuor ordinibus diuersis quædam uelut incipientis, nonnulla desinentis, & ei quæ post hanc existit, prope quinque differentie esse dicuntur: alia in illorum medio consistunt. Itaque sunt ex his quæ propter caloris uim exulcerant: quemadmodum etiam ex illis quæ exedentia Latine, *σντὸς* Græce nominantur: alia simulatque corpora contigerint, potestatem suam ostendunt. Quædam duabus tribusue, aut quatuor horis opus habent: nonnulla diem totum, uel etiam post eum noctem, uel maius deinceps spatium requirunt. Hæc iam ut in calefacientibus, ita quæ in refrigerantibus intelligere eum oportet, qui medicamentum aliquod confecturus est. Pari modo in ijs quæ humectant exiccant; Cæterum materie medicamentum quædam à plantis, quædam à metallis, nonnulla ab animalibus proueniunt. Quas omnes in commentario de simplicibus medicamentis definitè expressas didicistis: non cum familiaribus hic mihi sermo potissimum est, qui precibus me adegerunt, hæc propter librorum interitum deuotè perscri



perscribere. Iam uerò ut simplicium medicaminum uniuersorum facultates exauisum uobis cognoscendæ sunt, quò ubiuís corporibus curationē desiderantibus idonea ex ijs quæ adsunt, facile possitis remedia componere: ita etiam omnium præter naturam affectionum species ad unguem tenere expedit, quas primum quidem libro de morborum, altero de symptomatum differentijs, tertio post illos de morborum causis comprehensas habetis. Ad hæc alijs tribus de symptomatum causis: uno insuper de pleuitudine, necnon de febrium differentia commentario, postremo medendi methodo: in quibus affectiones actionem ledentes didicistis. Item curationem harum primam esse, quemadmodum etiam præseruationē causarum eas parientium. Docti pariter estis, primæ curationis consiliū à morbi dispositionibus suggeri: cum his unà patientis particule naturam indicari. Præterea aëris nos ambientis temperamēta, constitutionem, ætatem, tempus, locum, uitæ propositum, & mores, plures egregij medici inspicunt: de quibus ubi eorum usus fuerit, aliqua simul & hic nobis dicentur. Hæc itaque in memoria uos omnia sic ex prompta habere expedit, si quouis loco medicamentorum, tum simplicium, tum compositorum copiam habere desideratis. Insuper quomodo unum interim aliquod pharmacum sponte natum, ac simplex, morbum curare possit: cur interim cōposita nos usurpemus, rationem deinceps explicabimus.

Quis compositorum medicaminum usus.

**S**I tantum simplicibus medicamentis uniuersos præter naturam affectus curare liceret, nullus utique compo  
siti

sui unquam usus foret. At hoc nunc ita comparatum non est: nam dum corpus subinde aliquatenus calefacere conatur, simplex nullum, quod prestare id queat, habemus. Medicamentum enim affectioni cui adhibetur, potentia nimirum respondere oportet. Quod si affectus sit frigidus, quatuor numeris à naturali habitu recedens, pharmacum totidem gradibus à caloris mediocritate seu symmetria diuersum adhibendum quis ignorat? Porro cum interim tale simplex non adsit, si duo habeamus, quorum hoc numeris quinque, illud tribus calidius sit, temperantes ea, medium efficiemus, quatuor numeris symmetron exuperans. Iam quedam simplicia citra alterius mixturam ne in usu quidem esse possunt: ueluti cum emplastrum pharmacum apponere cuipiam uolumus: quippe simplex nullum ad talem usum idoneum est, neque bitumen, neque cera, neque resina, sicut neque pix, neque propolis ac ladanum: multo minus ærugo et cerussa, uel spuma argenti, uel molybdæna, uel aliud quoddam metallicum medicamen. Simuli modo nec herbe solæ emplastron pharmacum efficiunt. Quare primi emplastrorum auctores non temere ex oleo quoque metallica coquere conati sunt, quæ liquefieri possint, liquefacere, ac herbas contusas siccas cribratasque eis adijcere. Rursus in alijs affectionibus unum medicamentum solum ex ijs quæ suscepta natura proueniunt, usurpamus. Cui tamen nonnulla adijcimus aliquando uirium ipsius uehementiæ obtundendæ, interim insuauitatis mitigandæ gratia: quemadmodum Hippocrates in libro de Viâ ratione in morbis acutis hisce uerbis inquit: Si sub transuerso septo dolor sit, ad clauic

clauiculam uerò non ascendat, emolliendus est uenter uel nigro ueratro, uel peplio: nigro quidem daucum, uel se-  
feli, uel cuminum, uel anisum, uel aliud quid odoriferum  
muscendo: peplio autem silphij succum. Hac ratione ma-  
nifestò Hippocrates usum quidem pharmaci purgantis  
esse ostendit, sed insuauitatem eius in potu, moramq; in  
uentriculo condimentum requirere. Multa siquidē quæ  
bibuntur pharmaca tam sunt assumentibus insuauia, ut  
stomachū perueriant, uomitumq; protinus ciant. Quæ-  
dam licet paululum in uentriculo manere possint, postea  
tamen euomantur, prauas eructationes mouentia: quem-  
admodum ex purgantibus ceu condimēta sunt eiusmodi  
medicamina, quorum Hippocrates meminit: ita ex ijs  
quæ ἀνὸς ἀνὰ appellatur Græcis, alia uehementiam mu-  
tigant, ut cum papaueris succum, uel hyoscyani semen  
muscuerimus, uel mandragoræ radicis corticem. Quare  
et hic pharmacorum compositionis usus est, maximus  
autem in morbis, qui diuersas simul facultates desiderāt,  
expellendi uidelicet et digerendi, uel detergendi ac læ-  
uigandi, uel incrassandi simul et attenuandi humores:  
ueluti multiplicis usus medicamenta, Græci πολυφάρμακα  
uocant, et optima, diuersas in se potestates, ut indicabi-  
mus, continent. Verūm his medicamētū musturæ usus est,  
cum unum aliquot illorum ad multas uenenatas feras,  
uel exitialia pharmaca efficax habere uolumus: qui usus  
etiam theriacam, ut uocant, antidoton comparauit, item  
muthridation, aliasq; multas. Sunt porro et alie quæ-  
dam utilitates minores prædictis, attamen quæ crebrò  
nos ad remediorum compositionem descendere cogunt.

uniuersas

universas hoc in opere docebimini. Nunc enim post em-  
plasti medicamini, & πολυχρυσάτου, id est ad plura uti-  
lissimi à me confecti rationem fusius expositam institu-  
tum aggrediar.

De emplasto pharmaco. Αἱ χαλκίτις.

**Q**uà ratione seu industria composuerim emplastrū  
Αἱ χαλκίτις, quod à palma Græce φοινίκιον ap-  
pello, medicamen glutinandis ulceribus, cicatrice obdu-  
cendis, & plegmonis curandis accommodum (quando  
liquefactum humidi cerati crassitudinē obtinet) uos quo-  
que animum exercete, Empiricis ac Thessali sectatori-  
bus cum inscitia ipsorum relictis, qui optima pharmaca  
à medicis inuenta diuersis constare facultatibus ignorāt.  
Exercete inquam ingenium, ut eisdem mecum usi metho-  
dis medicamenta possitis conficere: persuasi re ipsa ma-  
iores nostros ex ratione omnia illa composuisse: inci-  
dentiam uerò Empiricorum, Græci uocant περιπτωσις,  
esse nugatoriam. Dicenda itaq; nunc est propositi medi-  
camenti compositionis ratio. Oleum uetus, & adeps di-  
gerendi uim obtinent: Chalcitis & palmæ succus repela-  
lendi, astringendiq;. Ex his igitur pharmacum cōposui,  
quo iam cōplures usus esse nouistis: ideo quod omnibus  
sui generis melius esse usu & experientia comprobauit.  
Etenim ratio compositionem inuenit: experientia de in-  
uentorum uirtute decernit, ut etiā rationalium methodo-  
rum imperitis artificiose confecta fidem faciant. Porro  
cum superioribus medicamentis argenti spumā tempera-  
ui, quæ nihil magni adeo momenti adferre potest: neq; re-  
pellētibus quod influit, neq; digerētibus, quod iam parti-  
culis

culis phlegmone laborantibus infixum est : quippe sic-  
candi uirtutem habet, sed non ualidam. Quare ipsam ceu  
aptum medicamen in emplastri compositionem adiun-  
xi: nam cum prædictis incoquitur, donec substantia eius  
omnino digitos non inquinet. Adipem uerò insulsum, &  
quammaximè fieri licet uetustissimum esse cōuenit : tum  
oleum uetus similiter, quod cū suillo adipe propinquan  
uirtutem habere didicistis : licet adeps paulò maiorem  
emollicendi calcificandiq; uim obtineat. Audistis autem  
uetustate ipsa tenuioris substantiæ fieri, & digerere  
promptius : eòq; phlegmonis, quæ magnum parti dolo-  
rem inferunt, magis blanda ac mitia sunt ipsa recentia :  
ijs uerò quæ tales non sunt, commodiora uetusta. Et quò  
phlegmone diuturnior, & contumacior, hoc magis ue-  
tera prosunt, ac sola curare ualent : modò postea nihil  
afflictæ parti influat. Quòd si influxerit, mixtæ esse  
medicamenti quoque uirtutem oportet, cuiusmodi habet  
à me compositum pharmacum, ac propterea chalcitidem  
& palmam digerentibus admiscui : non ignarus, paucas  
adeò phlegmonas diurnas existere, quibus nihil in-  
fluat. Nam ob humores in eas confluentes diutina esse  
solent. Porro dum hæ incipiunt & accrescunt, astrin-  
gentium refrigerantiumq; medicamentum uirtus recte præ-  
pollet : ideoq; hoc emplaston pharmacum adusque hu-  
midi cerati spissitudinem liquefactum multum utile reddi-  
tur, interim uino adiecto, uel aceto, uel aqua illiquescentes :  
nonnunquam ex oleo crudo, ὀμωγῆς appellant, uel  
alio quodam astringente, quale est Hispanum, & Histrie  
cum : uel ex dulci aliquo astrictionis experte, uel etiam  
uetusto.

uetusto. Ego quoque myrteo & melino, ubi ualidius astringere res postulabat, medicamentum liquefeci. Hæc ipsius compositio tali temperatura constituit.

Vetusti adipis, quem instutores axungiam appellant, sint pondo duo, olei ueteris pondo tria, argenti spumæ tantundem, chalcitidis pondo uncie quatuor. Hæc ita coquere oportet: Adipis membranulæ omnes eximuntur, reliquum \* contunditur, ut liquari possit: mox ad ignem liquefit, deinde per colum distillatur ut purum fiat, nihilq; membranæ habeat, pondo duo prædicta pendens: postea chalcitidis lævigatæ pondo triens cum olei quadrante adipe miscetur: his argenti spumæ pondo tria adijciuntur. Ac omnia ubi simul in mortario coierint, conijciuntur in cacabum, ac rudicula palmæ mouentur. Sufficiet autem ramus unus maiusculus, ut solida ligni parte mouendo utaris in modum spathæ dictæ: uocant enim sic quo confecturas mouent. & nos per spicuitatis gratia similiter nominabimus. Quod autem solidæ rami parti contiguum est, circunciditur, & tenelli procedentes ramusculi decerpti contunduntur, sed cortice prius exuto, ut segmenta iniecta pharmacum succo suo imbuant inficiantq;. Proinde statim ab initio spatha utendum est, sed tenuia palmæ fragmenta iniicere oportet, ubi medicamentum cerati temperaturam habuerit: nam si prius immutatus, succus ipsorum, quem manere uolumus, ex decoctione consumetur. Insuper spathæ, qua medicamentum mouetur, pars intincta postquam inarescit, ut proprium succum non amplius seruet, amputata reijcitur, reliqua est usui. Hæc rursus quatenus medicamento intin-



et siccata fuerit, simili modo absecatur. Constat autem  
 nobis arbitror, quod palmæ ramū non multis diebus an-  
 te abscissum arbore esse oportet: quippe temporis inter-  
 uallo arescit, & succum amittit. Pridie igitur per hyemē  
 auferatur, & state eodem ipso die quo cocturus es phar-  
 macum. Vbi iam coctum crassitiem, ut tactum non inquie-  
 net, acquisierit medicamen, illitum facit ad ulcera, quæ ci-  
 catricem ægrè ducunt, *Λυσιπόλῳτα* Græcè uocantur: ad  
 cruenta ualet oleo liquefactum: benefacit phlegmonis, po-  
 dagris, articulorum morbis, inguinum inflammationi-  
 bus, phymatis, ambustis, pernionibus, fracturis ossium,  
 contusionibus, omnibus deniq; affectibus, quos appellam  
 rheumaticos. Iam uerò multi qui hernias absecant, post  
 manus operam statim ipsum cum fomentis & cataplas-  
 matis præparatum imponunt: si quidē chalcitidis uncie  
 sex immittuntur, quæ est selibra, medicamen ad magna  
 uulnera glutinanda promptius, atq; ad ea quæ cicatricē  
 ægrè ducunt, efficacius fiet. Sunt in hoc etiam alia eius-  
 dem potentie medicamenta: ipsi tamen cum oleo liquefa-  
 cto magis quàm alijs omnibus in rheumaticis affectioni-  
 bus fidendum est. Cum enim plurima eiusmodi Romæ  
 existerent, nullum tam celebre probatumq; fuit. Condu-  
 cit, ut dixi, podagricis, articulorum uitio laborantibus  
 quolibet tempore, cum dolores intensi nō sunt, qui fetus  
 & cataplasmata lenientia postulent. Incipientibus igitur  
 atq; augescantibus etiamnum id genus uitij, liquefactum  
 pharmacum refrigerare finito, ac spathomela deradens  
 pile iniicito, cui uinum superfundito: quod ut recipiat,  
 manibus subigito. Erit autem uinum austerius, & state qui-  
 dem

dem medium, substantia non crassum, sed quæ immaxime fieri potest lucidum. Nam huiusmodi, utpote substantiæ tenuioris, in altum corpus penetrat: tantisper autem liquefacto medicamini ipsum infundito, manibus continens, dum excipitur tempereturq;: nec humidum restet, quod non cōtrito ac emollito pharmaco mixtum sit. Ad hæc etiam si non prius refrigeratum medicamentum detraheris, liquefacto & adhuc calido vinum supersusum permiscere licet. Itaque in phlegmonā principijs uim repulsoriam ualidiorem esse oportet. In incrementis uerò hæc nonnihil imminuenda: quæ digerit uirtus augenda est. Porro cum in statum proprium, seu uigorem phlegmones tumor peruenit, pares inuicem esse potestates conuenit repellendi & digerendi: nisi quis uehemens dolor pharmacum leniens requirat. Cæterū inclinante phlegnone digerendi uim augebitis, ut prorsus nihil uini co tempore misceatis. Præterea dum id liquecit, si quando astrictoriam qualitatem euidenter excellere uolumus, Hispanum oleum, uel Histricum, uel quod omphacinum seu omotribes, Latine immaturum, seu crudum appellant, iniiciendum est. Vbi æquales utraq; facultates habere cupias, oleo dulci, nec recenti, nec uetusto liquandum est. Si ut digerat expetis, uetus oleum, uel cicinum commodè sumitur. Itaque hoc emplastrum medicamen dum liquefit, in hunc modum temperatur: Oleum paulò copiosius quàm medicamentum esto, ut pondo uidelicet unum absoluat: medicamenti uerò decem uncias iniecisse abundè suffecerit. Clarum est cuilibet, hoc efficacius reddi emplastrum, quò plus medicamenti

habuerit : tanto lenius ac mitius , quanto liquidius fuerit ex Rhodino liquefactum . At cerati quod inungi possit , temperamentum recipit , dum medicaminis pondo in olei selibra liquatum fuerit . Tale uerò phlegmonôn inclinationibus ex usu est . Item sedis , rectiq; intestini tumores phlegmonodas sponte obortos omnibus melius iuuat : atqui tunc liquefactum oportuit cum oleo copiosiore , ut per cornu recti foraminis , cui uesica suis alligata sit , immittatur , uelut in eiusmodi usurpare consueuimus . Ad hæc frequenter ipsum in his ex Rhodino liquefecimus , cacabo uasi in quo liquefcit prius subiecto , qui calidam contineat : prunis uerò ardentibus incumbat , aut flammæ fumo carenti . Iam uerò pro superioris temperaturæ modo liquatum , ut liquidi cerati spissitudinem habeat , & naturalium & podicis ulcera persanat , imò & alia omnia , uel etiam ulceratos perniones , & ambusta : etenim uniuersa statim inflammatione liberat , puraq; reddit , & solida implet carne , præsertim ubi plus chalcitidis adiectum fuerit . Insuper nemo ignorat , uinum quoq; medicamento id effecturo admiscendum esse . Quòd si acetum acceperit , ambustis optimè facit , & statim , & postea quolibet tempore impositum : siue illa iam pustulas , siue non habeant . Constat idem facere medicamentum hoc , si quis in aqua feruenti ustus fuerit : qui etiam affectus Græcè ἀσπικαυτὸν , Latine ambustum igne dicitur . Porro si pharmacum antè imposueris quàm phlegmone sit orta , nihil adeò ipsius generationem impedit prohibetq; . Quapropter , ut dictum est , nonnulli qui hernias secant , statim eo utuntur , nec prius uulnere madefacto .

Ad hæc contusionibus, fracturis, & qualibuscunque plagis, si liquidum imponitur, præsens est remedium. Ligamentis autem circumdatum fasciarum instar quibus rupturæ deligantur, κατὰ ματρικὴς uocant, œdemata omnia & inflationes mirifice iuuat. Cum malo succo corpus abundat, uel admodum sensibile est, quàmprimùm contusis & percussis partibus illud impones, hyoscyamos recens adijcietur: qui si non est propter anni tempus aut locum, nihilo magis desiderabis, si adiungas eum qui uere depositus est, qualis etiam singulis annis ex Creta Romanam apportatur. Hoc magis adhuc lene ac blandum medicamen succus mandragoræ mistus efficiet. Non autem uos latet, & hunc à Creta optimum fictilibus poculis huc afferri, cuius unciam unam libræ olei emplastri liquescentis miscere sufficit. Atque interim amplius, interim minus impones, prout dispositio postulat. Conducit etiam in eiusmodi corporibus pharmacum ex Rhodino liquefactum esse. Cæterum ex casu conquassatis partibus, uel ligno, uel lapide percussis, etsi ecchymosis quedam contigerit, protinus ab initio medicamen commodè imponetur ex uino, ut docui, liquefactum. Quod uinum, inquam, die tertio, aut certè quarto, si particula inflammatione careat, auferri oportet: oleo autem ueteri emplastrum liquare. Nam si plenius astringantur ecchymomata, uix queant per halitum digeri. Hoc medicamento etiam utor aduersus erysipelata, præsertim phlegmonode: adhuc longè magis ad phlegmonas erysipelato des. Principio igitur impono ipsum liquatum ex Rhodino, quod oleo omotribi, id est crudo & salis experte

constet: cuiusmodi erysipelatis est accommodatissimum. Ita iam liquefacto solani succus per totum accuratè permixtus uniuersus & irriguus mortario superfundatur: qui si non adest, psyllij: si æstas fuerit, etiam uuae acerbæ cum portulacæ, uel semper uiui succo. Etenim uuae liquor per se plus quàm oportet, astringit. Tanta autem astrictio erysipelata promouet, ut quæ calorem ipsorum cutem densando includat. Rursus portulacæ succus, neque is solus præ lentore nimio potest exprimi. Optimum igitur est, qui ex uua acerbæ prius trita exprimitur, portulacæ in pila committere, & sic iterum contundere. Deinde ubi mixtorum unitas diligenter facta fuerit, liquorem elicere. Simili modo etiam semper uiui succum cum exprimes: nam seorsum neque ex hoc, quemadmodum neque ex corydono succum copiosum exprimere quisquam potest. At mandragoræ pomorum uirentium succus recens adiectus magis aptum medicamen efficiet: quem si tempus non admittat, illius quæ à Creta, uel alio quopiam loco aduehatur, mittere nō dubitabis: quin & hyoscyani succum temperare ei consueuimus, interim meconiū, qui papaueris esse Latinus dicitur. Satius autē est, unā cum hoc & glauci quippiā superindere. At his multò imbecillior, sed acquisitu facilis lactucæ succus est, tum agrestis, tum hortensis: quam uniuersi Græci huius tempestatis non *θρίσακιν*, sed *θρίσαλα* nominant: agrestem solam *θρίσακιν* appellantes. His rursus cicorij, polygoni, trifolij, & auriculæ muris succi minus ad refrigerandum efficaces sunt: quanquam & ipsi refrigerent. Sed euidentius lenticula palustribus locis prociuiens.

Horum

Horum omnium penuria miscebis acetum & aquā, quæ  
ascititiis qualitates frigidas habeant: uasis uidelicet ad-  
modum frigide, aut niui insistentibus, atque ipsum Phœ-  
nicinum medicamentum æquè refrigeratum erysipelatis  
admoveatur, donec uehemens ipsorum ardor subsidat.  
Liquet autem, subinde ea que aduentitia qualitate frigi-  
da erysipelatosi affectibus succurrunt, immutanda esse,  
maxime, ubi exactum erysipelas citra phlegmonem suc-  
cit. Posteaquam uerò acris illa inflammatio quicuerit,  
aut nec perfectum planè erysipelas affligerit, sed uel e-  
rysipelatoses phlegmone, uel phlegmonodes erysipe-  
las, non adhuc externum frigus admolienur, uerùm à  
succis etiā impense frigidis abstinemus: eos medica-  
menti liquefacto miscentes, qui mediocriter refrigerant.  
Ab his iam & linofermū & chamæmeli succum tem-  
peramus, ex eoq; solo postea medicamine liquato ute-  
mur, nihil aliud præterea immittentes. At si quando li-  
uidum ex frigefacientium uel erysipelas euaserit, non id  
amplius erysipelas appellandum est: sed abstinere non  
à uini mxtura modò, sed Rhodini quoq; & astringen-  
tium oleorum oportet. Nam solum Phœnicinum ueteri  
oleo liquefactum, quod liuorem contraxit per halitum  
discutere potest: & tunc affectæ partes aqua calida  
fouentur, & scarificantur. Vobis si fuerit usum hoc  
interdum facere, protinus Phœnicini liquefacti humi-  
dum medicamen, cui uinum adiectum sit, imponere  
conuenit: altero die uinum auferendum. Quòd si plus  
impendiò erysipelas medicamentorum uiolentia refri-  
gerit, ut iam quoque nigricet, persusione & scarifica-



tione utemur. Atque citra hæc calcis uiuæ quippiam li-  
 quescenti pharmaco immuttemus. Dum uerò laborantes  
 teneri sunt, lotam ipsam usurpabimus: tunc prodest etiã  
 succus coriandri pharmaco inditus, qui sanè cum cerato  
 rhodino iuuat non mediocriter. Ad hæc quæ iam similes  
 affectus alia pleraque medicamenta curant, sequenti ser-  
 mone dicentur: quædam pari uirtute Phœnicini, non-  
 nulla efficaciore prædita. Porro aduersus fluxionũ ui-  
 tia, omnium faciliè optimum hoc remedium est, ut quod  
 spe maiora frequenter præstiterit. Cum itaque femur  
 aliquando prope inguen cruda phlegmone totum id affli-  
 gente suppurasset, crus ita nobis figurabatur, ut sanies  
 ad inguen conflueret. Facto autem ulcere, dum hoc lon-  
 gior interuallo contingeret, fluxio quæ in femur decu-  
 buerat, euacuata est. Sed fistulosa quædam dispositio sub  
 femoris totius cute orta est, ut ipsam iuxta patellam, quæ  
 genu pars ἡ ἡνωτὶς Græcis dicitur, diuidere cogitare-  
 mus, quò saniei utrinque liber esset exitus: medicamen-  
 tis autem liquidis inditis altius penetrandi uia prõptior.  
 Vbi iã femur soluissem, postero die quo incidere ipsum  
 decreueram, inuenta sunt omnia concocta, arida, mado-  
 risq; expertia. Nemo igitur non nouit quod rationi con-  
 sentaneum erat, & postero die, & sequentibus similiter  
 uti pharmaco: quando quidem particula quotidie colo-  
 rator ac sanior quàm antea reddebatur. Curato itaque  
 hoc modo adulescente, postea multas rheumaticas affe-  
 ctiones hoc medicamine sanauit, quæ quidem oras simpli-  
 ces haberent, sed ut committi non possent, & fistulose  
 intus essent. Non tamen ab ipsius pharmaci usu desisten-  
 dum

dam esse suadeo, etiam si multis diebus evidens nullum præsidium afferre uideatur, ut quod postea uno interim die simul uniuersam utilitatem maximam ostēdat. Quare bono animo hoc semper in rheumatis utamini: in corpore tenero quidem, uel puero, uel muliere ad prædictā mixturam quatuor uncias chalcitidis immittentes, in uas lido ac duro pro aliorum portione, uel unciam unam, uel duas apponentes, ut quinque uel sex chalcitidis unciae sint, tres libræ utriusque, nempe olei ueteris, & argenti spumæ. Duæ uetusti adipis, quem institores axungiam appellare diximus, diluatur in rheumatum uitij oleo dulci nec nouo nec ueteri: assumaturq; uinum austerum ætatis mediæ. Hoc pharmacum coarctat Thessali nugacitatem, efficacissimum auxilium à contrarijs potentijis compositum ostendens: unde si alteram adinas, nihil prædictorum fiet. Neque enim ex astringentibus solum, siue laxantibus ad rheumaticos affectus magnam commoditatem asferet, uel certè ad phlegmonas incipientes, & augefcentes. Neque lenimentum, neque discutienti uim ex solis relaxantibus sine astrictione confutura nanciscetur: quæ indurata habent emollire. Porro laxabit perfectè, & mediocriter emolliet, si non admodum uetus oleum & adipem receperit. Quod itaque Musæus pharmacum condidit, æqualia inuicem continet, tum oleum, tum argenti spumam, tum adipem, sed maximè phlegmonis incipientibus incrementibusq; est contrarium. Habet & nostrum hoc eadem quæ Musæi, argenti spumam uidelicet, adipem & oleum: si nihil ex ijs quæ astringunt acceperit, particulas eneruat, & ro-

bur earum dissoluit: ob quod etiam fluxioni fiunt obnoxie. Didicistis enim, non semper ob calorem immodicum, ut quidam arbitrantur, corporis particulas fluxionibus laborare, sed hoc raro accidere: imbecillitatem uero illarum id genus uitij progignere, quæ ut plurimum ex intemperie frigida proficiscitur. Itaque si humectet eas quispiam, calefaciatq; medicamentis laxantibus, dissolutione prorsus & infirmæ fiunt. Rursus si tumores in rheumaticis morbis fortiter astringat, initio quidem proficere uidebitur: cæterum qui restat, cõtumacem & scirrosam faciet. Nam tales affectus subinde ne quidem ferunt nimis astringentium impositionem, ut à quibus dolore & tensione molestantur. Atqui omnis dolor inflàmata excuit irritatq; & fluxionibus occasionem præbet: quamuis rheumatica intemperie æger non afficiatur. Sed miri nihil est Theßalum medicæ artis operum inexpertum, & qui morbos ratione inuenire nequeat, omnem phlegmonarum curationem ignorare. Vobis autem qui crebrotum Phœnicini huius, tum aliorum medicamentorũ, quæ contrarijs constant uirtutibus, efficacissima in multis morbis auxilia uideritis: conandum est interim, ubi iam composita desiderantur, eadem methodo ex illis quæcunque regio præbet, cõficere: cum phlegmonẽ suspicamini suturam, uel incepisse modò, quæ magis astringũt: in augmento, quæ minus: in statu & inclinatione, quæ magis relaxant, & digerũt. Semper tamẽ utraq; nuscatur, & repellẽdi, & discutiẽdi facultas: nisi quãdo fluxio prorsus cõstiterit, et corpus uacuum fuerit, tũc ad digerẽtẽ, sicut in primis incursibus ad repulsoriã uirtutẽ, tuta est accessio.

De emplastris quæ ex argenti spuma præparantur.

**Q**uoniam in emplastri mei Phœnicini confectura adipem uetustam & oleum, digerendi potestatem habere dixi, chalcitidem uerò & palmam colligendi repellendiq; : hæc autem medicamen emplastrum sine argenti spuma procreare non possunt: ob id uisum mihi est de ipsius spumæ usu deinceps uerba facere. Siquidem Phœnicini uiribus nec eam obesse, nec conducere, sed materiæ ad emplastri pharmaci compositionem idoneæ rationem obtinere putandum est. Non absurdum itaque mihi apparet, si de eiusmodi medicamentis, exempli gratia, de spuma argenti disputationem instituero. Sunt non pauca quæ potestatem aut nullam, aut exiguam admodum pharmaco quod præparatur simul afferunt: commoditatem uerò materiæ præbent, ut uel emplastri, uel ceræ speciem referat. Neque enim argenti spuma manifestò calida est, sicut nec frigida, nec humida, sed modicam siccandi habet uirtutem in primo abscessu, ab his quæ ad amussim media sunt inter humida & sicca. Non tamen uis eius est ferruminare, sicut nec aperire: item nec abstergere, quemadmodum nec expurgare euidenter, sed paulum à medijs ad crassius recessit. Verum hoc quoque ex diuturna coctione deponit fusa ob ignis potentiam, & alterata. Porro sola per se cruda femorum attritus ex itinere iuuat, quo etiam modicè exiccare cognoscitur. Ad hæc neque acrem, uel suauem, neque acidam, uel amarā, uel austeram, uel acerbam, uel omnino astringentem facultatem ipsam habere gustus abundè testis est.

Argenti spuma  
vſus & vſus  
res.

Quem

Quemadmodum etiam ulcera nec ab ea derodi, nec cale-  
 fieri, nec refrigerari, nec purgari, nec carne impleri, nec  
 cum caro supercreuerit, tolli percipimus. Licet itaq; no-  
 bis in uarium usum administrare argenti spumam, inte-  
 rim ex oleo & aqua coctionem eius adusque emplastri  
 spissitudinem molientibus, interdum ex oleo & aceto,  
 aliquando ex oleo & uino. Porro in quibuscunque isto-  
 rum coquatur, melius id medicamento redditur, quod ma-  
 gis coctum fuerit, quod liquidorum quæ miscentur co-  
 pia continget. Est enim ex ijs pharmacis, quæ liquefieri  
 possunt, etiam spuma argenti, dum tota funditur, sicut re-  
 sina & cera: sed non statim ubi ignem contigerit. Vnde  
 multis imponit, qui nullo modo ipsam fundi existimant.  
 Igitur cum oxaleo cocta, liquefcit citius perinde ut cum  
 erugine, quæ & ipsa fundi solet, uti chalcitis & misy.  
 De metallis Omnia itaque celerrimè chalcitis funditur: tardissimè  
 quæ liquefiunt argenti spuma. At in horum medio sunt erugo & misy:  
 funditur & fori, sed longiore tēporis interuallo, ut quod  
 terrestre magis & saxcum sit quàm chalcitis & misy:  
 sed de his iterum dicetur. Argēti spumam per oxaleum  
 coquens ocyus liquefacies, per hydrelæū tardius: tamen  
 funditur sic quoq; , si duplum eius sit utrunq; liquidum.  
 Ego certè plus etiam quàm duplum miscui frequenter,  
 ut paulò post exponam. Atqui melius est statim ab initio  
 hæc tria in mortario temperare, argēti spumam, aquam,  
 & oleum. Quòd si candidum medicamen esse cures, o-  
 leum purius lucidiusq; iniicito, atque aquam similiter pu-  
 ran ac candidam, coquaturq; in loco sub dio soli expo-  
 sito: quia nubilus aër pharmacū denigrat: s; ncerus ma-  
 gnus

gnum ad albedinem adiumentum adfert, sicut aqua in huiusmodi aëre aspersa. Cæterum obseruato, ut coctionem lignis, aut carbonibus peruri incipientibus moliaris. Nam <sup>Vt cādidum sit emplastrū</sup> fumus ei facile nigredinem conciliat. Perustis igitur ante carbonibus cum exacte ardent, tunc coctionem auspicare. Quod si illam protinus non absoluant, in alio foco simili modo carbonibus preparatis cacabum superponito. Quæ ergo medicaminis candidi faciendi gratia obseruanda sunt, abunde satis indicatum est. Iam uerò hoc fit glutinantiùs, quo plus, ut demonstratum est, liquoris affuerit. Quemadmodum si singulorum trium pondo libram unam iniicias, firmus adhærebit. At si argenti spuma non illique scat, causa est potissimum, cur id facile decidat: sicut diutius adhæret, cum argenti spuma cocta funditur, alteraturq; . Candidius sanè erit, citiusq; coquetur, libris duabus aquæ in tres utriusque, puta spumæ argenti & olei iniectis . Atque hoc in paruis ulceribus uti consueuimus. Medicamenti, quod aqua coquitur, potestas nota est, si meminerimus eorum, quæ in commentario de simplicibus medicamentis dicta sunt.

De emplastro quod ex argenti spuma  
& hydrelæo conficitur.

**A**qua peculiari substantia semper humectat & refrigerat. Ascititio autem calore assumpto, donec ipsum perseruat, excalefacit: frigida facta refrigerat. Oleum sanè si recens sit, pharmaco non renititur: permixtum enim humidum & modicè frigidum, quali maxime tenera corpora & uitiosis humoribus obnoxia indigēt.

Mulieres



Mulieres itaque & pueri, atq; ex grandioribus mollem corporis habitum sortiti, nempe candidi cute, eius generis medicamenta requirūt. Porro coctum ostendimus ex oleo copiosiore, & aqua reddi tam glutinans, ut ne quidem à lotis decidad. Etenim ulceribus quæ ad cicatricem ueniunt, multis diebus subsequētib; pharmacū immānare expedit, quò melius & citius ita cicatrix ducatur. Notum est huiusmodi pharmacum pruritus, desquamata, & ut uno uerbo expediam, praua ulcera persanare, in quibus & subliquidum, ut uocant, ceratum, aliāq; id genus utiliora sunt ijs, quæ ualidam potestatem occupāt, qualia magnis uulneribus imponuntur. De quorū omniū simul uirtute in tertio libro de morbis curandis dictū nobis est: in quo generales communesq; sermones (uniuersales nuncupant) de quaque ulceris differentia tradidimus, ostendentes, quales medicamentorum, quibus illa curabuntur, uires esse conueniat. Hic uero particulares materias recensemus, temperaturas eorum definientes & modos, quibusq; in præparatione reddantur optima demonstrantes. Ex hydrelæo itaque argenti spuma, sicuti comprehensum est, præparata, emplastrum tactu blandissimum, & adhærendo pertinax efficit: præterea aspectu album, refrigeratoriā uim habens mediocrem, cuius auxilio exulceratis partibus ne quid influat, impedit, & iam influxū denuò ad partes extimas retrudit, ut res fiat huiusmodi, qualis cum spongiam aqua frigida humentē particulæ cuidam corporis imponimus. Nam illa rugosum contractūq; totum locum facit, non tantum expellens quod influit, sed etiam quod in eo continetur ad ui-

cina

cina extundens. Atque emplastrum modò commemoratum, non ex prima facultate, sed per accidens exiccare dicitur. Proprie nimirum & primariò ea quæ digerūt, & temperamenta ad sicciorē statum perducunt, nominantur siccantia: ex accidenti uerò etiam ea, quæ frigoris causa id quod influit, remittunt: quod continetur, expellunt. In summa, nullum humectans, uel primariò, uel ex accidenti ulceribus commodum est, ut in tertio Methodi medendi libro demonstrauimus.

De emplastro quod ex argenti spuma  
& oxelæo componitur.

**D**E argenti spuma quæ ex hydrelæo preparatur etiam hæc sufficiunt. Digrediendum modò est ad eam, quæ oxelæo cõponitur. Itaq; mediocriter exiccans medicamentum sit, si utriusq; nempe olei & aceti, duplo maior portio quàm argenti spumæ misceatur. At si uetus oleum sit, multo magis exiccat: copiosior uerò duplo utriusq; mensura ualentius facit pharmacum. Quia propter fistulas, quæ nondum callum durum habet, curat. Cæterum spumæ argenti una pars inijcitur: illorum singulorum duæ s. Quinetiam tripla cuiusq; parte temperata nonnunquam toto die coxi medicamentum. Vnde quidem reddebatur nigrum, sed perinde ac bitumē probum splendebat. Porro maxima siccandi potētia pollet, curatq; ulcera perdifficilia, & fistulas, quales dixi, iūgit, tū uulnera cruēta glutinat: uno uerbo, exiccat sine morsu. Huius rei gratia etiam alia uniuersa ulcera sanat, maiora minoraq; donec ad cicatricē perueniāt. Aequum est & alia quædā eius opera cõmemorare, quæ forsā ne quidem

quidem speraueris, quantū ad materiæ humilitatē attinet. Nam cum febris solutio ex parotide suppurata cuiusdam accidisset, fistulam fieri suspicati sumus, quam sex mensibus post principium in agro mihi ostenderunt. Erat enim puer agricolæ annos natus circiter quindecim: huic cum ex emplastro illo, quanta tunc mihi copia aderat, imponendum dedissem, ipse in urbem reuersus sum, pluribus negotijs medicis occupatus: interea oblitus sum eius qui pharmacum acceperat: sed à bimestri præteritū mei expectationem uenit incolumis: immittentibus enim nobis suillum pilū per fistulam, ad articuli commissuram usque procedere uidebatur. Non multo post, cum alius puer forte fortuna eiusdem cum priore ætatis, eodemq; morbo laborās mihi esset ostensus, emplastrum hoc imposui, quo ille pariter integræ sanitati restitutus est. Ab eo tempore plurimos simili uitio huius medicamenti uirtute liberaui, tum pueros, tum adolēscētes, tum mulieres. Vos igitur, si uti eo ad huiusmodi affectus uolueritis, uetustissimum oleum, & acetum quāmacerrimum, ex uino uidelicet solo confectum inijcitate: non ut quidam aqua mixta ipsum præparant: sed purum sit, & quāmaxime licet pellucidum. Tale siquidē tenuius commodiusq; ijs erit, ad quæ ipsum requirimus. Hoc pharmaco etiam musculos induratos subinde curauī.

De emplastro quod ex argenti spuma & ænelæo præparatur.

**R**eliquum est, ut de argenti spuma dicam, quæ ex ænelæo componitur, & parem prædictis temperaturam

tur an ac uirtutis excessus pro humorum copia respondentes habet. Etenim æquali portione tria iuxta præparauimus, & duplo maiore utriusque liquidi mensura quàm argenti spumæ: interdum triplo imposita. Conseci autem nonnunquam hoc modo: Per æstatem sole calido argenti spumam ex uino falerno conterebam singulis diebus quindecim continuus, uinum rursus, si forte primum euaporarat, infundens. Ab eo tempore coctum medicamentum exiccans abundè factum est: quo in rheumaticis constitutionibus perinde ac Palmeo, quod *φοινικίον* appellauimus, usus sum: ex oleo liquefaciens, ut in illo prædictum est. Ac femur iamdiu induratum, cruentâq; uulnera co sanauimus. In summa, ad omnia fuit optimum. Atqui si falernum ad manum non habeas, aliud sumito colore fuluum, sed tenuæ substantia, ut pelluceat: cuiusmodi est Ariusium, quod in Chio nascitur, & odorum uehementer Lesbium: in Mitylena paucum, in Eresso & Methymna copiosius meliusq; proueniens. Item quod falerno simile est, Tmolites. Est & hoc tenuissimum, fuluum colore, dulce mediocriter, nimisquàm odoratum. hoc inueteratum omnibus usui esse potest, quibus & falernum. Insuper aliud Tmolites uinum est simile ei colore & substantia: uerum nec dulce, nec odorum. Habet autem uim quandam astringendi, sed suauitate multò inferius est. Hæc itaque ex cocta spuma argenti sunt medicamenta.

De crudæ spumæ argenti usu.

**I**N cocta quidem per se, ut annotauimus, attritus emendat. Ex oleo autem seu uino trita siccataq; ulceribus medetur, quæ ob humiditatem uix cicatricem recipiunt.

Quòd si rofionis expertem esse cupis, clota utitor.

Quomodo lauare oporteat argenti spumam, & reliqua metallica.

**F**Acilè eluuntur, ut quæ statim propter innatam grauitatem liquoribus, in quibus læuigatur subsidat: unde totam rofionem in aqua lota exuit: acuti uerò sensus homines, parum adeò mordacem percipiunt, si ex aceto uel uino eluuntur. Porro conuenit, diligenter toto die contritam cum liquore per noctem relinquere: postero die mane illum auferre: alium mox superfundere: postea rursus terere similiter: iterumque sequenti aurora liquorem emittere. Quod faciundum est, donec sinuul cum liquido argenti spumæ uelut tenuissima quædam portio appareat: cumque nihil sorditiei amplius inest, nihil etiam magis effundendum est. Attamen conterere diebus pluribus, etsi nihil ei insistat, sole feruenti satius est: ita enim accidit, ut medicamentum exiccet ualentius. Porro nouerunt omnes id æstate non solum in argenti spuma, uerum in alijs etiam quæ hoc modo præparantur fieri commodius. Siquidem cadmia, æris squama, æs ustum, item quod uocatur diphryges, cerussa, misy, fori, stymmi, & omnes lapides, præterea calx perinde ut argenti spuma ex liquore aliquo prædicto eluuntur, læuiganturque: interdum ex marina præparationem ipsorum molior, de quibus in sermone processu rursus agitabitur. Nunc enim propositum mihi est emplastra per censere, quæ iuniores medici cum s in ultima syllaba & scribunt & enunciant: quemadmodum

modum in Centrio, & Milotride facere omnes consueuerunt. Siquidem in his prima nonnum positis uidetur sine  $\rho\omega$  facta fuisse à uerbo quidem  $\kappa\epsilon\tau\rho\epsilon\iota$  Centrio nominato, ultima syllaba  $\rho\omega$  non habete: Milotride uerò cōposita ex mula & ote. At cum hoc tēpore propè omnes ea cū  $\rho\omega$  efferant, non peccaueris, si eodē modo cum illis pronūcies, præsertim in Centrio. Quippe ostendimus in opere quod cōtra illos, qui barbarè loquentes corripuit, prodidimus, & ipsos Atticos uiros ualescentē usum & consuetudinē secutos fuisse. Nā alij quoq; ante me indicant Atticorum linguam permultū à proprietate sua decidisse: ac omnes, quorū eloquentiæ laus ac gloria maxima apud Græcos extat, suæ quenq; tēpestatis morem imitatos fuisse. Et nos itaq; cum nullum non inueniamus nunc medicamentarios libros emplastri nomen cum  $\rho\omega$  scriptum habere, usum præualemē sequemur.

De medicamētis quæ ex molybdæna cōficiūtur.

**R**elatum est superius quoq;, molybdænā & argenti spumam in eūdē ferè usum adhiberi. Omnia enim quæ ex argenti spuma componuntur, etiam ex molybdæna fieri possunt: sed facultate inuicem differunt, tantum ut molybdæna substantiæ crassioris frigidiorisq; sit: argenti spuma tenuioris, & inter calidam ac frigidam mediæ. Cæterum colores medicamentorum, quæ inde præparantur, molybdæna nonnihil euariat, quāto magis giluos ipsos efficit. Quare & alborum emplastrorum, quæ non modo cerussam, sed argenti spumam quoque habent, nullum ex molybdæna constat. Cuius mixtura color



albus, cinerius redditur: potestas autem ut in albo em-  
plastro, quod ex hydreleo componitur, melior etiam  
cuadit, præcipue in teneris corporibus, tantum abest ut  
pereat. Cū discutere quid uolumus, argenti spuma quàm  
molybdæna potior est. Pari modo in reliquis medicamen-  
tibus, quæ ex argenti spuma compositionis titulum for-  
tita sunt, cum molybdænam adiicimus, color & uirtus  
immutatur, quantum paulò ante uobis indicauimus.

De emplastris albis quæ ex argenti spuma,  
& cerussa fiunt.

**V**EL coloris causa medici cerussam argenti spumæ ad  
emplastra alba conficienda miscent, uel ut quædam  
astringendi, ac refrigerandi uim medicamento concilient.  
Quippe uidentes huiusmodi nigrescere, cum largius co-  
ctum fuerit, præsertim lignis, & ijs forsan humidis, nec  
in aëre puro, mox ab igne tollere coguntur: ob quod  
ipsum nec aquam copiosam, nec oleum temperare. Me-  
rito igitur resinam ei adiungere considerarunt, quo se-  
quax, ac sibi continuum fiat, uiscosum quid assumens,  
maximè cum liquida resina immittitur. at ex tali mixtu-  
ra deterius efficitur pharmacum: etenim mordax ali-  
quid resina repræsentat: quod siccet nihil adeò genero-  
sum: cuius usum priuatim ulceribus esse necessarium di-  
dicistis. Quædam itaque resinæ uel insigniter derodunt,  
de quibus uniuersis iterum sermo futurus est. Mitissimæ  
uero duæ inter eas sunt: prima terebinthina, laryx al-  
tera nuncupatur. Has igitur nuscere satius est, ubi id ge-  
nus emplastri conficere cogitas. At multò leniora taci-

omnia fiunt, tum quæ resina constant, si ceræ quid adiectum sit: tum quæ ex cera, si resinæ nonnihil admixtum habeant: quamobrem cera resinæ temperanda est, ut autem color emplastri albus seruetur, albam esse congruit. Est sanè alba, quæ suapte natura provenit, pontica: sic nominari consuevit, licet aliunde ueniat, quòd plurima in Ponto alba nascatur, alijs in regionibus paucissima. At candida, quæ tyrrhenica nominata est, non sponte crescit, quare nullam euidenter habet acrimoniam. Quæ uerò suo instinctu crescunt, nonnullæ acres sunt, quas prius eluere oportet in hunc modum: Liqueantur primùm ad ignem, deinde in aqua fontis pura demerguntur: ubi permouentur expurganturq;. Simili ratione & pix, & resina, & quod physema dicitur, lauandum est. de quibus iterum exactius commentabimur. In præsentia, quoniam albi emplastri compositionem tradimus, reliquum eorum quæ præcepta sunt deinceps percensebimus. Posteaquam ergo cerussæ, spumæq; argenti coctis prius usque dum medicamen digitos non inquinans appareat, cera simul cum resina fuerit adiecta, candidum emplastrum, si placet, habebitis: interim aquam iniicientes, interim oleum duntaxat: idq; nunc recens, nunc uetus. Prius enim iam audiuiſtis, quam uirtutem aqua & oleum uetus habeat: Nouistis item, quod omphacinum oleum, & id quod colitur in Hiberia, quæ nunc Hispania dicitur, astringens quippiam pharmaco adijcit. Histricum non modò exiguan astrictionem, sed amaritudinem quoque refert. Proinde different tantum ex astringentibus confecturæ, ab ijs quæ dulci oleo constant, quanto initio ul-

ceris & fini potiora sunt omnia quæ nonnihil astringē continent: in medijs, dulcia. Nam in principio medicamenta repellentia prosunt ulceribus, ne phlegmone corripiantur. Inde quæ magis relaxent, si non phlegmone adsit, transpiratus gratia: quòd si affuerit, etiam ob illam ut citius dissoluatur. Atqui clarum est, de parua phlegmone uerba fieri: siquidem exigua ulcera, in quibus albis hisce emplastris utimur, magna comutari phlegmone non potest, si error nullus accesserit. Cæterum ulceribus quæ ad cicatricem ueniunt, astringendi qualitatem utilem esse cui obscurum est? Tempus igitur iam postulat, medicaminum quæ emplastrum album utilissimum constituunt, temperaturam exponere.

#### Pondus emplastri.

Aequa sit portio utriusque metallici, cerussæ & argenti spumæ: & hæc, si uideatur, esto singulorum pondolibra: olei uerò mensura amborum simul pondus obsoletuat, uel ut Romani dicunt, sint pondo libræ duæ, ceræ pondo selibra, terebinthinæ illius dimidium, hoc est, pondo uncie tres. Quòd si thus admisceas, primum lenius euadet, seu ut Græci dicunt, ἀνωσυνώτιγον, tum parua ulcera, quæ phlegmone infestat, ocyus concoquet: sed ad cicatricem ducendam erit imbecillius. Nam carnem supercrepescientem promouet, quoniam thus σαρκωτικόν est, ut in tertio libro de morbis curandis legistis. Satius illud est, miscere & aluminis paululum, tum ad cicatricem ducendam, tum alterius causa: quandoquidem laxantia medicamenta plethoricis, & uitioso succo obnoxys corporibus adhibita, affectis partibus fluxum concitant. Ex his

itaq; omnibus cōpositū medicamē, tumores præter naturam in molli corpore, qui nec magni adeò, nec dolorifici sunt, discutere poterit: præsertim cū thus abundè assumptus sit. Erit itaq; in prædictis copiosum thus, si æquale terebinthinæ pōdus accipiat: sin eius dimidiū, minorē digerēdi uim medicamētū habebit. Magis autē cicatrici ducēdæ erit idoneū, q̄ quod duplo copiosius id receperit. Iam si plenius adhuc digerere cupiatis, etiā piperis albi pauxillū adijcitate, quod ulcerū cicatrici obducēdæ nihil obesse potest. Sit igitur aluminis pōdo uncia, in piperis semūcia: Ratio siquē est, huius tres denarios, illius sex iniicere. Quoniā uerò præstat alumē, et aliās quod scissile nominatur, & colore cādidū est, id immittere expedit.

Quomodo candida emplastra componenda sint aduersus vlcera, cacoëthe, & quæ cicatricē difficulter admittunt.

**Q**Uæ dysepulota, id est, uix ad cicatricē uenientia, quæ item κακοῦθη, id est, maligna uocē, distinguendum modò est: quia non solū in præsentē dispositionem, sed etiā in futurā commodū est. Quæ itaq; ex humorum cōfluxu, uel multorum, uel acriū oriuntur, sine eo quòd locus affectus huiusmodi iam dispositionem habuerit, ut licet bonum sit quod influat, tamen ipsum corrūpat, dysepulota nomino. Porro quæ iam dictū obtinent affectū, singulari uocabulo cacoëthe appello. Nunc igitur cum priores me emplastra quædā alba, ut quæ dysepulotis cicatricē probè obducāt, cōscripserint, propterea ego quoque alba scribo emplastra, quæ aduersus dysepulota omnia, & cacoëthe nōnulla, quæ nō prauū admodum ha-

bent statum, composui : Nam in illis denuò medicamenta accommoda dicuntur . Primum hic methodum distinximus, quæ id genus emplastra quàmplurima conficere discetis . Duplex enim scopus est : alter omnium quæ ratione componuntur medicamentorum communis : alter peculiaris colore ab his differens . Quæ igitur in commentario de simplicibus medicamentis cognouistis , sine rosione quidem ac morsu, ualide tamen adeò exiccantia, hæc in memoriam reducite. Omnino autem referebat ea, præterquam quòd non erodunt uel astringunt, manifestò etiam detergere posse. Siquidem caua plurima eius generis ulcera tanquam ab exesione humorum malignorum facta apparent : eiusq; rei gratia carne impleri desiderant . Ostendimus in tertio Therapeutices libro , omnia quæ carnem generant medicamenta detergendi facultatem habere : Multa etiam alia siccam obtinent uirtutem, huiusmodi ulceribus curandis accommodant . Sed age nunc repetamus ea, quæ candorem tueri possint, aut non adeò lædere . Hoc ex genere est cadmia, pompholyx, calx, ostrea tōcremata, purpura, buccina, & sepiæ pars ossea : parum officiet colori & æris squama, & iustæ chalcitidis non fuluum, sed cinereum, uel subalbidum . Quomodo autem huiusmodi præparandum sit, rursus in theriacæ antidoti sermone dicemus . Porro dictorum quodq; si lauetur, totam rosionem amittet : quemadmodum cera quæ medicamuni conficiendo admiscebitur, tum resina . Cæterum quòd cera tyrrenica, uel pontica dicta, ad cādidi emplastri præparationem sit idonea, prius explicatum est : resina uero & laryx, & terebinthina,

uti uocantur, aduersus ulcera maligniora magis ualent. Thuris partem aliquam indere non abs re fuerit, ut ulcerum maleficorum dispositio coquatur, & ad suppurationem ueniat. At non solum ex prædictis medicamentis unumquodque lauandum uenit, sed etiam metallica, tum quammaximè in loco soli expósito, uel aqua, uel aceto, uel marina, uel uino læuigare oportet: pura autem & candida, & perspicua singula erunt, candoris cuiusdam medicamento conciliandi gratia. De cerussa, oleo, coctionis modo, aëre circumfluo, & igne, quomodo quodque eorum albedinè adferat exposuimus. At quemadmodum in alijs, ita in his quoq; facultatis aquæ, aceti, marinæ, uiniq; albißimi peritum id in compositura temperare conuenit, quod insigniter curando morbo profuturum est. Etenim in ulceribus prætumidis, ex hæc <sup>ωδ</sup> ap- pellant, quæ oras crassas, callosas, multamq; attenuatorem requirentes habent, ex aceto & marina curiosè læuigata, magis quàm quæ per aquam idonea sunt. In quibus autem acre & mordax est humidum, quod in ulcera fertur, ex aqua terere potius singula metallica necesse est. Quemadmodum rursus ex uino magis, ubi copiosus humor ulceribus influens apparet. Hæc igitur singula quæ dixi, in unoquoq; iam nominato humore læuigata diebus pluribus, inieci frequenter pharmacis, & omnium cicatricem ducentium, quæ cerussa & argenti spuma constant, expertus sum optima. Verum scriptiones quasdam amicis quoq; dedimus, qui huiusmodi pharmaca desiderarent: à quibus ipsis in usum ac experientiam producta, quod titulo promittunt tueri uidentur. Itaq; argenti



*spuma cum cerussa prius cocta, & medicamento ferè ad puram consistentiã perueniente, iniicienda est lãrix, uel terebinthina resina cum cera candida. His pulchre unitis adde metallica, quæ huiusmodi temperaturam habent. Argenti spumæ & cerussæ pro cõsuetudine singulorum pondo: coquatur cum olei libris duabus, frequenter etiam aquæ selibra addita. Liquefcit enim argenti spuma citius, tum coctio aquam consumit, ut nihil ad humiditatẽ phar-  
 maco apertè prosit: resinæ pondo tres uncia, ceræ duplũ sufficit. Quanquã si duas resinæ indideritis interim, quatuor ceræ, sic quoq; compositiones non adeo differe inuenientur: iburis pondo uncia semis satisfacit post cerã & resinã: deinde tres aliorũ iniectæ, quæ drachmæ quatuor sunt ad uiginti: inpones autem duorum, trium, plurium, ac omniũ quæ numeravi: quorum singulorum tibi copia contingat, ut si omnia habeas, æquam portionẽ cuiusq; iniicies, cadmiæ dico & pompholygis, buccinorũ cineris, uel ostreorum, & æris squamæ, singulorum denarij septẽ erunt, qui tres uncias absoluunt. Quod si calcem lotam misceas, singulorum drachmæ quinque ponentur. Si usta chalcitidis, singulorũ drachmæ quatuor, ut ex omnibus sex cõunitis tres uncia fiant. Verum chalcitidis usta sit, elota, & colore cinereo, non qualem multi ex ijs, qui urũt eam, faciũt: ueluti si dicas ex pallido flauã: si duo quædã ex his habeas solum, tres uncias ex ambobus ponito: hoc est utriusq; unã semissẽ. Hæc in præsentia ad alborũ emplastrorũ constitutionẽ ulceribus dyssepulotis curãdis cognoscere uobis sufficit. Atqui cerata alba et k  
 αἰσχροῦ. quida, αἰσχροῦ uocãt, etiã ex ijs ipsis præparãtur: differe  
 runt*

runt tamen ab emplastris, quòd neq; argenti spuma, nec cerussa coquatur. Adeps uerò uel anserinus, uel gallinaceus, uel suillus, uel uitulinus indatur. Quòd si uinum interim habeas, uel acetum, quæ albißima, lucidißimaq; sint, aquæ loco ipsa admiscebis.

## Esecundo libro Galeni

### DE COMPOSITIONE

### MEDICAMENTORVM

#### KATA GENH.

#### De colorum in Emplastris uarietate.



EDICAMENTA colore similia tradere non est artificum.

Quoniam uerò potentes quidam uiri interdum nos iubent emplastrum sibi melinum cōficere, quod ulcera glutinet, uel cicatricem ducat, uel indurata emolliat, uel aliud huiusmodi facere possit, coacti sunt nonnulli recentiorum medicorum, ubi similia colore seriatim conscriberent, proprias cuiq; appellationes apponere.

De medicis imperitis, & vlcus cauum curandi ratione.

Quòd si affectus cuiuslibet eorum, quos curandos suscipiunt, naturam scirent, methodumq; cognoscerent,

scerent, quæ & simplicium singulorum medicaminũ vires, & scopum curationis inuenirent, non utique compositionis modum desiderarent. Exempli gratia: statim casuum ulcus, apertum ( nihil enim mali est, ut quidam uocant breuioris disciplinæ gratia, sic nos quoque nominare) quomodo quis sanare queat consideremus: tanquam si nondum aliquod ei curando aptum medicamen inuentum sit. Nam quum docuerimus, à ratione cauorum ulcerum curationem subministrari, nascente alia carne loco perditæ, ex ea uidelicet quæ subiecta est, cogitauimus fieri non posse hoc, si in ulcere sordes, aut copiosa humiditas insit. Verum sordes medicamina detergentia auferunt, humorem exiccantia discutiunt. Quoniam ulcera carne implenda pharmaco exiccante, & detergente medio critter sine morsu, indigere demonstrauimus, conuenit cuiusmodi pharmacorum materiam quænam sit in memoriam reducere. Indicata est in libro de simplicium medicamentorum facultatibus, insuper conueniens singulorum ordo: Hoc etenim, sicut dixi, admodum utile est, ut si quando fortiore quis pharmaco opus habeat, ad quod digrediaturn cognoscat. Verum cum simplex nullum habemus, composito utimur. Atque primum fingamus nos habere ceram & æruginem, aliud nihil quod cauo ulcere manifestè conducat: thus dico, irim, aristolochiam, fariænam eruorum, radicem panacis, & quæcunque ex hoc sunt genere. Quum igitur sciamus, quòd cera sola imposita sordidum ulcus efficiat, quia neque detergere, neque exicare possit, ærugo rosionem inferet: præterea exedet, atque phlegmonem excitabit: quæ sanè utraque

deuitabimus: medium ex ambobus aliquot conficiemus, imbecillius quidem æruginē, ualentius autem cera. Sed quoniā hæc paululo inferior est eo quod commodè queat adijci, ærugo autem multum præcellit, multæ ceræ modicam æruginem admiscēbimus. Quantam autem quantæ? Hoc enim deinceps uenit dicendum, exactè quantitatem cuiusq; ante experientiam inuenire posse neminem: conijcere tamen & iudicare, & componere pharmacum, primum adeò nullum insigniter impropterum successum habiturum: quemadmodum ego aliquando feci in quodā uico, ubi neque ipse quod me sequeretur habebam, neque alius ex ijs qui ibidem agebant, copiam mihi facere poterat. Reperi solum ad compositionē idoneam æruginē & ceram: quibus acceptis, & ad ignem cera liquefacta cum oleo rhodino, ut liquidum ceratum fieret, musci cerati libræ unciam unam æruginis, hoc est duodecimam partem: statui enim decimam uel duodecimam temperare: suspicatus quidem maiorem, ut acriorem cera futuram, minorem tanquam imbecilliozem. Experiuntibus autem nobis compositionem, uisæ sunt partes decima & duodecima rectè pro corporum differentia commistæ. Ostendimus enim, quod etiam usus attestatur, ualida corpora ualidiora sustinere medicamina, imbecilliora huiusmodi non ferre. Validiora dico corpora, quæ temperamento sicciora sunt, ueluti agricolarum, nautarum, & uenatorum: imbecilliora, mollicia, uel natura, uel uictus consuetudine, cuiusmodi sunt mulierum, eunuchorum, puerorum, & qui naturali temperamento sunt humidi, candido molliq; corpore præditi. Dura igitur ex copia

piofio

piofiore ærugine cerato admixta carnem recipiant, mollia ex pauciore. Vnde, ut frequenter dictū est, unū pharmacum omnibus nequaquam conuenire potest, sed oportet medium esse, ceu ad mediam temperaturam aptatum: ducere uerò ad utranq; eius medijs partem, dum quotidiana usu, & experientia probatur: si ut res postulat confectum sit, in eo manere cōsiliū est: si paulum deficiat, augere ipsius uires: quemadmodum etiam adimere, cum præter modum efficax sit, uelut in ipso hoc proposito pharmaco, quod cerato & ærugine constat, considerare prius oportet, ulcūsne carne obductum sit, an nondum, sed sordibus humoreq; madeat, uel præter quod carne impletum non est, erosionis sensus aliquis laboranti ortus sit, & calidior, uel rubicunda magis pars ulcerata appauerit. Quod si igitur imbecillius uideatur, melle uel ærugine admixtis potentiam eius augebis: si ualidius, oleum uel rhodinon miscebis, resoluens pharmacū, quod linamentis excipiendum est. Commodè quidem ceratū & ærugo sic temperantur, quemadmodum à me nonnumquam esse mixta retuli. Confectura autem medicantibus hæc esto emplastri compositi (uiride à colore uocant) sanantis quidem recentia uulnera, quæcunq; non adeo magna sunt, sed quod ex rhodino simul ad mediocris pharmaci consistentiam potest liquefieri. Quin & resinæ uel colophonix, & phrygiæ nominatæ, uel terebinthinæ nonnihil ipsum habere oportebit. Ostendimus autem laticem uocatam terebinthinæ quodammodo esse similem. Porro quantitas earum musturæ & hic coniecturari potest: si enim plus resinæ quàm ex usu sit admiscemus,

donec

donec manibus subigitur molle apparet: in linteolum uero illitum paulò post instar pellis indurescit, facile à corpore decidens: Sin minus æquali portione resinæ cum cera mixtum sit, non habebit hoc quod glutinet, ἰχνοκολλη Græcis appellatur, ut pars ulcerata magis extendatur. Liquet autem, si alicui particulæ imposueris, difficulter fore conglutinans, & protinus ab ipsa relabi. Quæ igitur mediocris temperatura, ceu emplastri consistentiæ conueniens? Siquidem mihi fidem adhibes, par utriusque portio: nec cera, nec resina siccitatē uetustatemq; repræsentet. Optimum siquidem huiusmodi mixtionis temperamentum est, si ambo pingua & mollia assumantur: si alterum excedat, resinam præpollere satius est: quare nōnulli duplam huius mensuram stactæ ceræ admiscant.

Confectura simplicis emplastri viridis,  
& virtutis ipsius explicatio.

**V**iride nonnulli, sic enim ipsi nominant, ex dupla resinæ portione confecerunt: duas quidem eiusdem libras, unam uerò ceræ, & binos olei cyathos immiscētes. Aeruginis autem alij duas, alij tres uncias huiusmodi ceræ & resinæ mixtionī immittunt. Sed etiam in præparatione liquefactis, quæ liquari possunt æruginem inspergunt. Quidam ubi refrigerauerint, mox raserint, in mortario temperaturam moliuntur. Porro qui medicamentū cruentorum ulcerum glutinantius facere statuūt, æruginem in pila prius cum aceto leuigatā iniiciunt, ceratū radentes. Proinde si quis uestrūm roget, quale horū uiridium emplastrorū sit præstantissimū, succurrat id quod  
iden



identidem à me prædicatur, omnia esse optima ei, qui affectus quibus singula offeruntur cognoscat : sicut eos ignorantia omnia pessima. Mei etenim officij est dicere, id exiccare euidētius, quod acetum pariter assumit. Constat autem, quod plus æruginis continet, id tum ualidum esse, tum magis exiccans, tum sordida ulcera rectius purgare. Finis ipsius est, ut hæc citra erosionem ac morsum efficiat. Nam adeo ualens, ut iam puris ulceribus impositum erosionem pariat, nec ea tandem carne repleat, sed utroq; modo humida sordidaq; reddat, simile est ijs quæ parum integrè siccant detergentq;. Iam uero ex acrioribus cauum magis ulcus euadit, & rubicundius calidiusq; est, quum æger etiam ipse morsum eius percipit.

#### Resinarum differentia.

**R**esina strobilina resinarum longe calidissima est: sicut terebinthina ambabus qualitatibus omnium moderatissima. Omnes siquidem calefaciunt & exiccant: sed hæc magis, illæ minus. Validissima igitur est strobilina, moderatissima, ut dixi, terebinthina. Quinetiam siccat celerrime strobilina, & quæ priuatim pitynon phesema dicitur : resina quidem & genere ipsa siccans, & calefaciens : siccando autem à strobilina non superatur: calefaciendo plurimum. Hæ ergo exiccatae pinguis expertes sunt, ideoq; emplastra bene adhærentia conficere non habent, ut uiscosæ & liquidæ. Inter pitynon phesema, id est, piceam & strobilinam media calore abictina est : liquida tamen diutius perdurat : sicut etiã colophonia thuris redolens, quæ nonnullis sola uocatur colophonia,

nia, odoratu suauitatem quandam referens, calore sicut abietina mediocri prædita, nascitur admodum modica, atque ob id preciosa est. Humidissima tamen omnium est altera Laricis appellata differentia: nam hæc quoque duplex est: una quidem similis terebinthinæ: altera hac acrior, calidior, magis liquida, & odoratu grauior, tum gustu amarior. Conditur hæc liquida resina uasis fictilibus, piceam resinam continentibus, consistentia & colore terebinthinæ adanussim similis: odore & gustu diuersa: ingrator quidē olfactu, sicut etiam acrior & gustu mordacior. Quare satis est, terebinthinam omnibus medicamentis, quæ ulcera recte curabunt, admiscere: quoniā primus præcipuusq; in eis scopus est, ut id quod offertur non mordeat.

De frictione metallorum cum  
aceto ad solem.

**M**eminisse uos puto & huius quod toties repeto: fortium medicamentorum, cuiusmodi est ærugo, musy, chalcitis, fori, æris squama, uel chalcanthum, ex aceto diu contritorum, morsus, seu erosionem obtundi, uires augeri. Quoniam uerò metallica ceu crassiorum natura partium potestatem suam in altum usque corporis, quod curatur, non extendunt, ideo ut tenuiora fiant conterere, & ex aceto ipsa dissoluere conuenit, quæ curiosè ita attenuata ad penitiora usque penetrant. Accedit autē & aliud quoddam cōmodum in huiusmodi medicamentorum confecturis, quod diligenter elaborata corporis meatus nusquam inter eundū retenta pertranscunt, eiusq; gratia si calidioris naturæ sint, sine morsu munere suo

funguntur. Quin & inter humores ipsos in corpore generatos, tenues facile citra erosionem perspirant: crassiores retenti obstructi; molestant, ubi mordaces fuerint. Eadem ratio est in metallicis medicamentis combustis, sed illa ex ignis commercio nonnihil mordax, seu erodens perseruant, quod elota deponunt, ac lenia prorsus redduntur. Quibus autem sinule quippiam uestioni ex frictione cum aceto ad solem facta ignis loco accidit, ea ne quidem ex igne calorem consequuntur: laeuigata tamen ex aceto & combusta multo præstantiora fiunt. Hæc sanè multorum medicamentorum communia necessario cognoscenda sunt: tum usus ipsorum similiter: alius quidem in alijs affectibus: in cauis uerò ulceribus quum linamentis excepta imponuntur.

#### Olei differentia.

**O**lei sanè nomen unum est, qualitas & facultas diuersa: Nam omphacinum frigidius, ex maturis oleis pressum calidius est: temporis autem processu calefaciendi uim auget: sic etiam quod salem habet, quantum ex illo sumpserit, tanto calidius est, magisq; siccât, quàm quod ipsius expers est. Quod sirculos oleæ, ῥάδιους Græci nominant, continet, ualentius astringit. Indicabit autem utilius & ulceris forma, & corporis ægri natura: ulceris quidem sanandi contrarijs, corporis autem ulcerati similibus. Quapropter medicamentum, quod emmoton fisturum est, myrteo liquefacies: quum generata caro flaccidior quàm par est appareat, præsertim ulcere ad cicatricem perueniente propemodum. Nam cum pauxillum quiddam phlegmones in ambientibus particulis relinq

relinquitur, optimum est pharmacum ex rosaceo liquore. Rosaceum uerò præstantissimum esse nouisti, quod solis rosis pluribus oleo citra salem præparato plenius imbutis confectum est.

De usu viridium emplastrorum.

**Q**uatenus medicamentum exiccet detergatq; cum ex simplicium facultate, quæ id constituunt, inuenimus, inde simul dispositionis naturam cui conueniet indipiscemur. Vbi enim humiditas multa & copiosa sordet, desiccans euidenter purgansq; medicamentum applicare oportet. Vbi apertum (Græci ἀπ' ἰσίου vocant) ulcus est, carnis indigum, moderatissimum inter exiccantia detergentiaq; competit. Verum minoris maiorisq; in eo rationem ab ægri natura sumere conducit: Siquidem durioribus uel ex temperamento naturali, uel ætate, uel loco, uel studiis corporibus magis exiccantia exhibenda sunt, humidioribus minus. Quapropter primus cuiusque medicaminis linteolis excepti (ἱμμοτόν appellatur) usus ex prædictis nuper scopis coniecturali artificio sumitur: secundus, ut etiam antea monuimus, ex signis in corpore curando apparentibus. Si nanque cauum ulcus citra phlegmonem & purum inueniatur, nihil nouum tentare oportet, si humidius, uel sordidius intendere desiccans detergensq; pharmacum ratio postulat, si cauum magis quam prius existit soluere. Intenditur itaque melius temperatura: mitigatur ex oleo & cerato, uel oleoso quodam, cuiusmodi est rosaceum, myrteum & cyprinum, simpliciter præparata sine spissamentis, σύμματα Græci uocant, quæ addunt odoris gratia, uel ut confecta diu-

tius ab iniurijs immunia permaneant. Iam uerò si contentiosus quispiam nos increpet, tanquam præter institutum initic ad medicamentorum usus orationem deducamus, polliciti nos de eorum compositione uerba facturos, ille considerato, quòd in usu etiam confectura quædam fit, silentium sibi imponat. Prima enim pharmacorum, quæ cerato miscentur, in eo confectio est: altera rosacco, uel myrteo, uel cyprino, uel lentiscino oleo, uel melle apposito constat. Atque de his satis.

De viridum emplastrorum commixtione,  
eorumque quibus constant  
proportione.

**V**ERùm ad emplastra, quæ iam per experientiam abundè probata sunt transeamus. Hæc igitur Andromachus memoratu digna medicamenta usurpare ipsa scientibus præscripsit. Vnde cùm talia sint, ea deligenda ueniunt, quæ paucioribus, paratuq; facillimis simplicibus componuntur, tum quæ ad plura ualent, & proposito maximè scopo seruiunt. Res fiet exemplo ita dilucidior. Finge cauum ulcus apertum in sano corpore: tale uerò ab emplastro uiridi, quod Lite uocatur, liquefacto ex rosaceo curabitur. Appellant autem Liten, quod ex æruginè, cera, & resina cõficitur. Ego sanè, ut ostendi, æquam utriusque portionem musceo, æruginis decimam uel duodecimam, uel octauam. Est uidelicet duodecima, si ceræ pondo, & resinæ tantundè, æruginis uncias duas temperemus: decima, si duabus æruginis uncijis, uiginti ambarũ resinæ & ceræ, hoc est, utriusq; decem adijciatur.

tur. Quinetiam si octauam æruginis partem cerato ex cera & resina confecto apponamus, etiam sic bene habebit. Acrius enim magisq; detergens huiusmodi medicamentum erit, non tamen inutile: nam duris corporibus percommode adhibebitur. Melior euadet compositio, ubi octauam portionem æruginis confecturæ ex cera resinaq; immiscuerimus, æruginē pariter aceto quamacerimo diebus pluscūlis antē in leuorem redacta. Præstantior erit, si etiam thuris partem dimidio maiorem, quā fuit in æruginē, indiderimus. Olei pares cyathos æruginis uncijis adiunges, cū sine aceto & thure medicamē cōficias. Quando autem thus acetumq; adijcis, si quidē frigidā resina pinguior molliorq; sit, ac æstate pharmacum præparas, miscebis nihil: si uerò dura, idq; per hyemē, cyathum unum infundes. Quòd si liquidam quandam resinam ceræ temperes, oleo prorsus carere licet: liquidissimæ quidem tertiā ceræ portionem, minus liquidæ dimidiam. Porro fiet huiusmodi quædam compositio: Ceram resinamq; liquidā ubi refrigeraueris, æruginis parti nunc octauæ, nunc decimæ, aliàs duodecimæ commisce to: cognoscens duris corporibus primam temperaturam conuenire, mollibus tertiam, medijs mediam. Aeruginem ex aceto læuigabis: si lenius medicamentū uoles efficere, thuris pondus dimidium eius quod continet adiunges: sin hoc minus, thus & æruginem æquali modo committes. Atqui resinam cum cera liquefactam sine rasura refrigerantes, ærugini thuriq; in pila ex aceto tritis superfundimus. Hæ igitur primæ compositiones sunt uiridis emplastri, quod cruenta quædam uulnera non adeò magna



glutinat, & reliqua adusque cicatricem sanare potest, & carnem in eis producere, ex humido quodam oleoso liquatum. Voco autem oleosa, rosaceum, quo maximè ad illum quem retuli modum confecto utendum est: statim myrteo, cyprino, & lentiscino. Sed ipsum oleū, ubi medicamento liquefcenti caloris quippiā adijcere cordi est, commune hoc miscebis, in quibus refrigerare studes, id quod omotribes appellatur: ubi astringere, myrteum: ubi mixtæ facultatis aliquod, concoquens puta & repellens, rosaceum: in quibus modicam astringendi uim cum maiore caliditate desideras, cyprinum & lentiscinum. Porro pleræq; aliæ compositiones erunt, dum medicamentis simplicibus iam cōmemoratis uel incarnatiā, uel emollientiā, uel astringentiā, uel quæ difficilia ulcera curant, temperantur. Nonnulli uerò digerentiā miscuerunt, sicut etiam cicatricem ducentiā: alijs quidem omnia cōmuscantibus, uel confecturam inutilem, uel medicamentum uarijs accommodum præparare contigit: quorum materias cognoscentes, tum inuentis iam uti, tum similia componere ipsi potueritis.

Quomodo viridia fiant.

**A** Erugo non modica immittitur, ut & aliorum colorem uincat, & omnia in suum permutet. Porro coniungere oportet cum qui tale emplastrum confecerit, præter æruginis quantitatem, & colorem illorum quæ ipsi cōmuscantur, ad hæc cōfessionis rationem, in simplicibus quidem colores pertinaces obseruare: cuiusmodi flaua & nigra, & rufa medicamenta occupāt. Dico autem flaua & rufa, qualia sunt melittites, chalcis combu-

sta, auripigmentum, sandaraca. Nigra uerò, quod genus sunt pix, bitumen, terra ampelitis, lapis gagates. At inter coquendum non oportet æruginem super ignem concurrentibus committere: uerum ubi in mortario unitas facta est admiscere, si colore uiride medicamentum permanere desideras: sin autem melinum uoles emplastrum conficere, intelligito in coctione æruginem primum in hunc colorem perducendam, postea in rufum, ut emplastrum, quod bicolor, Græcè Διχρωμον appellat, euadat. Etenim a coctionis tempore paucis diebus post, in summo quidē fuscū magis redditur, in imo rufum simul apparet. Quoniam uero de ipsorum colore abunde satis diximus, rursus ad facultatis sermonem reuertemur, memores unde primum hoc in libro exordiū sumpsimus. Eginus autem in eo, nisi me fallat memoria, de medicamentis caranem generantibus: quorum potestatis scopus est, ut mediocriter & sine morsu detergāt exiccentq; . At speciales confecturæ pro diuersa simplicium pharmacorū materiæ differunt. Cæterum nemo ignorat, ea quæ propriè & primariò σαρκωτικὰ nominantur, aperta ulcera carne implere, hoc est, quæ caua quidē sunt, non tamen sordes, aut inflammationem coniunctam habent: iusuper nec prauorum humorum influxionem, neq; carnem in cauo ulcere intemperatam. Nam prædictorum aliquo cavitati imposito prius illud curandum est. Consilia curationis ipsorum sunt, sordidis detergentia pharmaca adhibere, profluentibus exiccantia, atque id quod influit repellentia. At si copiosum & contumax existat, fluoris causa prius amputanda est. Constat autē inflāmaus phlegmonē

sanandam esse, carnem intemperatam ad temperiem redu-  
cendam. Porro intemperatæ iam factæ, quatuor sanè mo-  
dis simplicibus, quatuor item compositis, per contrarias  
qualitates succurratur. Sed de his postea: nunc autem de  
medicamentis uehementer detergentibus agemus.

De pharmacis valde abstergentibus.

**Q**UOD hæc ex prædictorū genere sunt, quæ ob mo-  
deratam deterfionem cauis ulceribus puris, aper-  
tis sine omni morfu adinoueantur, antea comprehendimus.  
Intensam uerò detergendi uirtutem obtinent, quæ  
copiosas sordes auferunt. Quare nonnulla ex prædictis  
uiridibus medicamentis unare solū, nempe æruginis co-  
pia, ab ijs quæ simpliciter carnem producunt, euariant.  
Quædam & aliorum insigniter detergentium mustura,  
sicuti uocatum Isis, & Machæronis emplastrum, quod  
nos pro more usurpamus: oleosum ex usu nuncupant.  
Vbi enim sinū implere proponimus, copiosiore oleo iam  
liquefaciētes, per cornu rectum modo clysteris porcine  
uesicæ cōiuncti ipsum infundimus. Quin & piulcis, hoc  
est, pus trahentibus, in eo utimur. Etenim inter clyste-  
res etiam, quibus latius foramen est, ad huiusmodi admi-  
nistationem commodi sunt. Cui uerò non est perspi-  
cuum, sinus oppletos sordibus, ex meraciore hoc medica-  
mento purgari, id est, oleo pauciore adhibito? rursus pu-  
riores effici ex humēte magis olei uberioris tēperatura?  
Itaq; si paruæ adhuc phlegmones sinū infestātis suspicio  
quædā existat, medicamētū ex rosaceo prorsus liquefiat:  
Sin à phlegmone fuerit liber, ex oleo: et si citra erosionē  
ueteris

ueteris mīsturam sustinuerit, illo pharmacum liquatur. Cæterum in huiusmodi usum non solū hoc, sed Machæ-  
 rionis quoque emplastrum & Isis, tum alia faciunt, quæ  
 maiores nostri perscripsere, cerato mixta, cauis ulceri-  
 bus carnem inducere. Omnia nanq; huius notæ sine ce-  
 rati mīstura ex oleo & rosaceo liquefacta sinibus immi-  
 tuntur, eò quòd consistentia, quæ linamento excipitur,  
 emmoton uocant, sinibus illini non potest. Pari modo &  
 medicamentum siccum, quod combusta charta constat,  
 rosaceo copiosiore diluentes, ipsis infundimus. Quemad-  
 modum uerò sinus liquidioribus pharmacis indigent,  
 dum crassiora imponi nequeunt, ita quæ in summo caua  
 ulcera affligunt crassius medicamentum desiderant, hac  
 uidelicet occasione, quòd liquida statim ab eis decidunt,  
 & linamēta sicca relinquuntur. Merito igitur in id ge-  
 nus uitij ceratum ualide abstergentibus admiscemus: in  
 sinibus oleum, uel rosacei plurimum. Atqui hæc in eum  
 modum abstergentia pharmaca omnino etiam digerunt,  
 ideoq; uehemēter exiccant, ac commune quoddam ipso-  
 rum genus efficitur, quod Græci πολύχρησον appellant.  
 Accedunt huic generi emplustra euidenter acria, qualia  
 sunt Αι ἀλῶν, quæ non offerenda sunt, ubi carnē quam-  
 piam progignere cogitamus. Nam præter alia hoc quo-  
 que sal eximium habet, ut astringat magis quàm purget:  
 siccare uerò nihilominus quàm utrum, ac eius spuma po-  
 test. Sed illa astringendi facultatem non agnoscunt, sicut  
 nec Asiæ petræ flos. Atque huius rei gratia discutere,  
 & ceratis admixta ulcerum sordes tollere nata sunt: Sal  
 propter astringendi potestatem hoc efficere non potest.

Proinde cum hæc in memoria habeatis, & methodam compositionis, ususq; omniū eiusmodi medicamentorum audiueritis, deinceps illa, quæ à clarissimis medicis propter optimorum medicaminū cognitionem usu atque experientis cōperta sunt, enumerabo. Primum sanè Mantie, atque eius discipuli Taranthini Heraclidis sectatorū permulta pharmaca, quæ subsequentibus annis per experientiam probantes distinxerunt, & præstantissima ipsorum denuò literis mandarunt: quæ uerò munus efficacie habere uidebantur omiserunt. Iure igitur & ego maiorem facio mentionem eorum qui illis successerunt. Sunt autem inter hos, qui in medicaminū experientia re-  
 elisimè se gessisse uidentur, Petronius Musa, Heras, Andromachus, Asclepiades, & Criton. Iam uerò Archigenis & Philippi studiosi non pauca medicamenta prodidere. Quinetiā liber unus est Menecratis, cui nomē inditum est, Insigniū pharmacorū αὐτοκρατωρ ἐλογράμματον, id est quasi dicas, Imperator (nam ei dicatus est) integris literis descriptis. Quæ ergo pulcherrima ipsis tradita sunt medicamina, & cōmendantur, quorumq; nos inter omnia relata experientiā habemus, & quibus præceptores nostri usi sunt: ad hæc, si quod nobis inuentū sit, deinceps adducā, quo singula genere cōtineantur exponens. Nunc autē uiridibus relatus melina protinus subiungam.

#### Melina emplastra.

**Q**uemadmodum uiridium emplastrorum plurima propter æruginem præpollentem talia fiunt, præsertim quæ sunt ex ipsis coloratiora, ita quoque melina. Sed uiridia æruginem incoctam habent, melina uerò co-  
 etam,

Etiam, sed mediocriter : Nam si largius coquas, ambigui coloris emplastra quibusdam appellata, quibusdā rufa, efficies. Solent medici uiridia simpliciter melina, & rufa nominare, quæ non adeò magna uulnera glutinant, & ulceribus cicatricem obducunt : quæ mos est medicis appellare ἀνδισατα, quasi dicas aperta. Item ex rosaceo liquefacta cauis carnem gignunt. Multiplicis usus sunt inter ea, quæ plura pollicentur. Quædam multa non promittunt, sed unum mentione dignum, uidelicet uel ulcera caeothæ bene curare, uel pus digerere, uel meliceridas, uel duritias emollire, uel huiusmodi quid non continendum, aut curatu facile. Andromachus itaque quatuordecim melina conscripsit: ex quorum numero quinque æruginem habent, reliqua sine hac confecta sunt. Porro ex his quæ ærugine constant, unū quidem primū inter quatuordecim positū est : alter ū uerò quartū, post hoc aliud sextum, inde septimum & decimum. Quibus ergo nihil eximij apposuit, omnia simul & conglutinant ulcera, & cicatricē inducunt. Quòd si ex rosaceo liquefeceris, carnem procreat. Quin & mediocribus phlegmonis medetur, sicut etiā duritias emolliunt : atque hoc euidentius, quæ guttā ammoniaci cōtinēt. His adhuc magis, quæ copiosior rem quæ pro reliquorū portione æstimetur, eā assūpserūt: in quibusdā uerò apposuit ipse tenerū, hoc est, teneræ cuti cōueniens: cui præfixit ὑδαρώδες, & ῥιπτότης, inuinit membrorū doloribus synanchæ & lateri beneficere, uel interiores abscessus discutere magis quoddam testimonium his adferens, quàm simplici sermone scriptis. Igitur omnia ipsa deinceps subyciam:

Melina diuerſa promittunt.

Argenti

Argenti spumam, ac oleum coquito, cum inalterata sunt, ammoniacum, deinde ceram, postquam deposueris cacabum, galbanum, æruginem, & reliqua addito, atque molliter incoquito. Huiusmodi coquendi modos melinorum emplastrorū me priores tradidere, iuxta quorum similitudinem etiam alia melina coquere potueritis.

In Melino Serapionis, Argēti spumam sunc primum injicere conuenit, mox resinas & ammoniacum, deinde galbanum & æruginem, postea si uel thus, uel myrrhā, uel aloē capiat: hæc immittenda sunt, cum medicamentum ab igne tollitur: quippe coctionem non ferentia. Prædiximus autem, lentè coquenda esse, præsertim cum ærugo indita fuerit: quin & ipsam nuscendam, dum cacabum in terram deponis, ac modicè refrigerabis, idq; magis, si uas paruum sit in quo coquitur: Nam effervescenti immissa ærugo, frequenter ex ipso uase diffundi medicamentum cogit. Porro in Menæti primo melino, πύκτικον uocat, ideo quòd pugiles eo utantur, ammoniacum ex aceto læue in mortario fieri posse, alijs omnibus in cacabo mixtis, deinde ipso affuso, prius instituti sumus.

In Melinis emplastris dixi neque æruginem crudam esse oportere, ut in uiridibus, neque nimis coctam, sicut in his quæ incerti coloris & rufa nominantur. Verum ubi iam cacabus ab igne aufirendus propemodum est, injici ærugo debet. Deinde cum mutet colorem, & melinum redditur, medicamentum tollere iam ab igne tem-  
pus est, quatenus pitrum iam euaserit. Sin minus, paululum super ignem lentum remorati sic tollemus. Nam in  
uehe-



vehementi admodum flamma facile in rufum degenerat.

De rufis emplastris quæ *Λιχρῶμα*, id est,  
incerti coloris dicuntur.

**Q**Uædam ex eadem materia prodeunt qua melina,  
sicut prius quoque diximus, hoc solo discrimine,  
quod diutius coquantur: Omnia siquidem propter cru-  
dam æruginem uiridia fiunt melina, ubi mediocriter ipsa  
cocta fuerit: rufa, ubi liberalius. Manifestum igitur, me-  
lina rufa; oleum copiosius quàm uiridia necessario ha-  
bere: etsi reliqua omnia eadem recipiant. Atque huius  
gratia primum spuma argenti cacabo iniicienda est, in  
quo tantisper coquetur, dum sordium crassitudinem con-  
sequatur: mox ærugo. deinde si metallicum aliquod, ceu  
æs combustum, eiusq; squama immittatur: ac quando  
spissitudinem acceperint, tunc ceram & resinam (si hæc  
etiam medicamentum recipiat) indere conueniet: postre-  
mo thus, myrrham, aloën, aliaq; id genus. sicut celebra-  
rimum rufum, quod *ἱεὶς ἰντάμουν* uocatur, sacrum &  
ipsum appellatum: uelut Isis, quoniam aiunt ea ex sacris  
Aegypti locis adferri: polychreston igitur hoc est,  
quod interpreteris licet, usus multiplicis, eoq; in sequen-  
ti sermone inter ea quæ sic nominantur adnumerabitur.  
Impraesentiarum de alijs rufis omnino simplicibus, quæ  
inter hæc & polychresta consistunt, uerba facturi su-  
mus. Ut igitur uiridia emplastra ex cera, resina, oleo,  
& ærugine conficiebantur, iuxta dictam illic tempera-  
turâ, sic rufa ex argenti spuma, & oleo copiosiore quàm  
in uiridibus sumpto componuntur. Itaq; si emplastrum  
lar

*ἱεὶς ἰντάμουν*  
Isis.

Largius uoles coquere, augeasq; oleū, medicamen habiturus es quod magis siccet, ideoq; uulnerū cruentorū glutinātius: sin autē mediocriter, tantū olei mēsuram, quantū argēti spumæ pōdus esse sufficit: libram enim olei mensuralē Romanorū in argēti spumæ librā ponderalē inyciemus. Iā si pharmacū plenius incoquere placet, nō unā libram s, sed etiam duas & plures temperabimus. Porro inter hæc rufa emplastra sic præparata, plus siccant quæ nec resinan, nec ceram omnino habent, sed ex solis, ut uocāt, metallicis conficiuntur: quemadmodum alij quæque nonnulli ex prioribus huiusmodi scripserunt.

Rufum Galeni.

Cæterū quo ego semper mea industria cōposito utor in hunc modū coquitur: Argēti spumæ cū oleo prius coctæ metallica ex aceto leuigata immitto, & sic coquo, donec purū fiat. Addo his olei libras quatuor. hoc autē quanto uetustius, tātō erit melius: magisq; si id fuerit Sabinū. argenteæ spumæ libras tres, aceti quāuacerrimū libras duas. Horū triū metallicorū, squamæ æris nigri, æruginis, chalcitidis uncias duas, hoc est, denariū pōdo sedecim. At quum uetus oleū existit, crassumq; ex uetustate, quatuor libras s immittito. nos quinq; interim, idq; per hyemē indidimus, non ignari, hyeme plus olei quā per æstatē immiscendū. At argenti spumā prius uidelicet coques, donec sordidū crassitudinē recipiat. Quod si oleū cicinū habeas, id pro uetere usurpato, certe medicamentū hoc cruēta uulnera facile glutinat, magisq; in duris corporibus q̄ mollibus, cuiusmodi sunt mulierum & eunuchorū, dilutū potius ex oleo cicino quā ueteri. Itē quū  
linleo

linleo exceptum imponitur, mirū est quā ulcerā curatu difficillima cōcoquat, quæ pus nequaquā reddūt. Ad hæc sinus cōglutinat, & fistulas implet, exiccat, & prorsus claudit. Vbi iam ipsum hæc pulchrè uelis efficere, metallica pluribus diebus aceto lōgè acerrimo conterito, ac potius in sole: pari modo argenti spumā tritam exiccā tamq̃, & oleo postea mxtā, eo quo dixi modo incoquito. Attamen ad ulcerā, quibus cicatrix difficulter induci potest, metallica sic elaborari, & argēti spumā cōterere nō est neceßum. Etenim sine his *ἰπουλωτικὰ τέρατα*, quasi dicas, cicatrici ducēdæ prōptius illud euadit. Adijciatur autē tunc ei diphrygis & chrysocolle singulorū uncia. at hæc nō simul cū squama & æruginē cōmūtuntur, uti nec ubi iā coctū medicamentū fuerit omnino, sed eo quod intercedit tēpore. Tantā enim huiusmodi pharmaca coctio nē requirūt, ut exactē cum prioribus in unū coēāt: quod mediocri interuallo accidit, neq; multo antè, nec paulò minus q̃ cacabus ab igne tollatur. Solum itaq; hoc emplastrū fistulas, sinus, & magna uulnera glutinare potest. Iuuat ipsum spōgia recēs, nō dura, ueteri uino respersa. Deligatura in sinib. ab imo fiat, ligamēto ad orificiū perueniente, sicut in sermone de fistulis clari⁹ ostendetur.

De iis quæ cicatricem obducunt.

**E**Mplastrā cicatricē inducentia, siue synulotica, siue Epulotica nominare uelis, sicut etiā alia medicamēta epipasta, & quæ linamentorum usu apponuntur, nihil ad curationes eorū differētiæ adferet, si qualis quodq; facultatis medicamētū esse debet memineris: quā simul cū reliquis omnibus in Therap. lib. explicauimus. Quanto enim

enim glutinantia sarcoticis siccare magis dicta sunt, tanto glutinantibus epulotica. Nam ipsorum beneficio carnem cauis ulceribus generatam, cutem reddere statui-  
mus: ob quod tale pharmacorum genus, siue ὀξυγγοῦ, siue ὀξισατοῦ sit, astringere oportet. Hic autem illorum duntaxat emplastrorum mentionem facere cogitamus: siquidem ea quæ linamentis excepta imponuntur phar-  
maca, ex his rosaceo uel myrteo liquatis fiunt. Atque myrteum rosaceo hoc magis conducit, quo uehementius astringit: at si ueutrum habeas, ex cyprino, lentiscino, & melino liquanda sunt: si his quoque careas, ex om-  
phacino, uel eo quod ab Hispania portatur, ὀμφακίῳ Græci nominant: ubi nec huius copia adsit, teneros oliuarum surculos contusos, alij cuiuspiam uulgari oleo admiscebis: quòd si hos etiam desideres, præstat oleo uetere lique-  
scere: hinc enim medicamentum siccandi uirtute auge-  
bis. Proinde pleriq; medicorum à pharmacis, quæ opti-  
mi quiq; auctores longi temporis experientia satis pro-  
barunt, eoq; nobilia reddiderunt, hac ratione solum ab-  
stinent, ut ipsi melius quippiam præter maiores habere uiderentur. Attamen ex medicamentis celebribus cogno-  
scenda sunt quæ commendantur omnibus, nempe quod ὀξὺ καὶ μέλας, & ὀξὺ καὶ ἄνθος inscribitur, ad cicatricem du-  
cendam utrunque præstantissimum. Quanquam apud omnes mixturæ simplicium temperaturam eandem non sit inuenire.

De catagmaticis & cephalicis emplastris.

**Q**ui plurima ac optima pharmaca prodiderunt (ante omnes nominatim citauimus) genus aliquod em-  
plastro

plastrorum cephalicum & catagmaticum uocant, à caluariae fracturis potissimum nomen eis imponentes. Sunt autem talia astringendi, digerendi, & siccandi potestate prædita. Plerique paululum ex astringentibus pharmacis eis admiscuerunt, idq; duplicis usus gratia, sicut diximus: nempe ut id quod affectis partibus influit repelleretur, & abstergentium facultas in altum usque penetret: docuimus nos antea, nisi astringentia frictione in puluerem redigantur, noxam magis quam præsidium allatura his, qui trahendi uim occupant. At optimè elaborari ostendimus, si ex aceto acri læuia fiant.

De emplastris quæ propriè Cephalica nominantur.

**C**apitis fracturarum, quæ ad laminam usque peruenere, emplastra cephalica dici consueverunt. Eorum uirtus est, ut ossium squamas regenerent, nutrimenta in caluaria, & alijs corporis ossibus reducant. Nonnulli communi genere hæc etiam uocant catagmatica, quibus propriè nuncupatis fortiora sunt. Siquidem catagmatica ab eis dicta, purgandi siccandiq; facultatē habent: hæc autem acrimoniam quandam sortita sunt, ut ex alto in superficiem extimam non ossa modò, sed his multo magis humorem crassum aliquem & uiscosum, uel omnino deprauatum extrahāt. Menunit huiusmodi emplastrorum Asclepiades in tertio libro de exteriorum medicamentis, quæ sanè in quarto huius operis libro tractamus. Quoniam uerò ad cacoethe ulcera, & chironia quædam ipsorum conuenire dixit, tum quod ad Delcontem auctorem

refert cephalicum, tum ex nigro uiride cephalicum, tum Philoti cephalicum, tum Iſin, quod & ipſum ſimul cephalicum appellat, aliâq; nonnulla huiusmodi, quæ huc pertinere putandum, ideo nunc quoque ipſa non appoſui, ſed ad catagmatica & cephalica ab alijs medicis memoria mandata tranſgrediar, ubi generalem utriusque potentiam expoſuerim. Quæ uero & antea in hoc libro protulimus, tum in opere de ſimplicium medicamento- rum facultate in memoriam reducentes cognoscere uos expedit, cephalica nempe catagmaticis eſſe nobiliora, eoq; cum cerato carnem producere. Quapropter & ſarcoticis alio quodam modo ſimilia ſunt. Nam ubi ex cerato uim remiſerint, ſarcotica fiunt, quæ linamentis excipiuntur: adieſto uidelicet interim oleo, aliâs roſaceo, nonnunquam alio quodam huiusmodi.

De emplaſtris glutinantibus.

**Q**uidam hæc *ἑλυσμα* & *τραυματικὴ* nuncupât. Opus eorum eſt, coniungere, & diuiſas partes conglutinare, ut in priſtinam unitatem particula reducatur. Verum non modò cruenta protinus glutinantur, ubi ſanguinem ex diuiſione profluentem adhuc ſpongia deterſerimus, deinde ſuturis, aut fibulis coarctauerimus, ſed etiam ſinus ueteres, cum ab omni inflammatione immunes, & pueros medicamentis appoſitis effecerimus, cōmittuntur, coëuntq; diſtum eſt in Therapeutices libris, medicamentum primariò, atque ex ſeſe, ſcrdis deterſorium appellari: altero ſignificatu ſarcoticon, id eſt carnem produ- & glutinans. Non enim tanquam ipſum ſarcoticon, aut uniens, neque tanquam hæc naturæ ſolius opera non ſint, ſed

sed quòd talibus impositis medicamentis ulcera carne re=  
plentur ac coeunt, appellationem hanc sortita sunt. Opus  
ipforum proprium est, affectam partem recrementis ut=  
cure, ne uidelicet sanies carnis generationem, glutinatio  
nemq; impediatur. Indicatum est, glutinatoria sarcoticis  
esse sicciora: item sarcotica detergendi uim omnis rosio=  
nis seu morsus expertem referre. Glutinantibus autem  
non absterforijs prorsus, uerum desiccantibus solum es=  
se licet. At cum cicatricem ducentia pharmaca multò his  
(præter quàm quòd abundè astringunt) sicciora sint, sta=  
tuamus demum & quæ glutinant, & quæ coniungunt,  
moderatus istis exiccare. Finis autem glutinantium est,  
nullam inter coitura subnascens humiditatem permut=  
tere: epuloticorum uerò non hanc tantum impedire, sed  
etiam nunc consistentem in ijs quæ mox cicatricem du=  
cent, consumere: ad hæc callo obducere, & astringen=  
do indurare. Sarcotica sanguinem ad refectionem ido=  
neum, tum pro quantitate, tum pro qualitate tuentur: ac  
tantum talemq; quanto natura & quali ad carnis gene=  
rationem indiget. Cæterum lenissimum medicamen pu=  
rum ulcus seruat, siquidem tale acceperit: sordidum uerò  
neceffe est illud tantum pro sua ipsius potestate deterge=  
re, quantum crassitudinis sordes habuerit: quin etiam car=  
nem recens iunctam mordere & exedere debet. Vnde  
palam colligitur id, cum tale existat ulceri carnem non  
esse inducturum, nec cavitatem repleturum, sed quòd po=  
tius ipsa colliquabit, imminuetq;. Atque huius rei causa  
medicamentum quod sordibus copiosis repurgandis est,  
quo de antea dixi, non semper carnem potest gignere, nisi



uel ex uberiore oleo, uel rosaceo liquatum, sicut quod  
 ἰλαῖον δὲ & ὁλὴ χάριτος inscribitur, deterfionis uehe-  
 mentiam remittat, uel ex cerati mustura rosionem depo-  
 nat. Huiusmodi multa multiplicis usus uires ostendunt,  
 quemadmodum Machæionis emplastrum, tum Isis. Sco-  
 pus igitur singulorum id genus in Therapeuticæ libris  
 declaratus est: simplex facultatum materia in alio opere  
 priori composita, in præsentī tractatur. At primum in  
 eo memuisse oportet naturæ corporum, quæ curanda su-  
 sceperis. Nam humida, eoq; mollia, quemadmodum mu-  
 licrum, puerorum, cumuchorum, & qui muliebriter de-  
 gunt, imbecillioribus medicamentis indigent: uirorum  
 corpora, potissimum qui ex uirilibus munijs & sole du-  
 rum corporis habitum conciliarunt, ab imbecillibus ni-  
 hil præsidij sentiunt. Quapropter nec glutinantia utri-  
 usque sexus corporum communia sunt, sed quæ ex ar-  
 genti spuma, oleo, & aceto præparantur (in priore li-  
 bro de ipsis egimus) imbecillam mollemq; carnem gluti-  
 nant. Quæ bitumine, ærugine, squama, aloë, & myrrha  
 constant, robustam & duram. Itaque bitumen ipsum per-  
 se in harum uirtutum scopo continetur: at nulla ratione  
 solum ex oleo liquatum usurpare poteris, ut quod fri-  
 bilius sit, quàm medicamento emplastro di faciendo con-  
 ueniat. Vt igitur emplastrum fiat, ceram & resinam ei  
 admiscemus, à quibus denuò uirtutē eius solutam iri sciē-  
 tes, interdum æs, uel eius squamam, sæpe aloën, uel myr-  
 rham, uel in summa siccans aliquod medicamentum non  
 inepte adiicimus.

Nigrum

Nigrum EMPLASTRUM quod inter glutinantia Emplastrum  
 recensetur, hæc recipit: Cerae, picis, bituminis, pityinae, nigrum.  
 singulorum pondo libram, mannae pondo uncias sex, ce  
 russae pondo uncias quatuor, chalcanthi pondo uncias  
 quatuor, opopanax pondo uncias duas, olei semuncia,  
 alij selibræ, aceti heminas duas. Ceram, bitumen, oleum,  
 acetum paululum relinquens in olla recenti liquato: de  
 inde picem & resinam adijcito: in minima frusta diligen  
 ter concidito. Vbi semucoctum fuerit, tollito ollam, & a Coctiois  
 liquandiu refrigerato: inde atramentum sutorium per modum.  
 colatum, laevigatumq; ex duabus aceti heminis paulatim  
 inspergito, ne effruescat: effusum leuiter subdito mo  
 uens: cum tactum non inquinat, cacabum deponito: opo  
 panaxem antea in reliqui aceti parte madefactum insun  
 dito, ut dissoluatur: mox cerussam, mannâ pariter  
 trita inspergito: & paululum tepesfaciens, ut in unum  
 coeant, observa, ne opopanax & manna adurantur: re  
 fusa in mortarium, ibi refrigerari finito: ac rursus sub  
 acta reponito, atque utitor. Porro manifestum est, etiam  
 alia barbara, quæ tum Andromachus, tum reliqui tra  
 diderunt, eodem modo confici oportere. Quidam opo  
 panaxem cacabo non iniiciunt, sed leui ex aceto facto li  
 quata in mortario superfundunt. Cum eo nonnulli mi  
 scent mannâ, & cerussam, quemadmodum ego quoque  
 sæpius feci, in mortario terens ex aceto, & quæ liquari  
 possunt, liquefaciens. Subinde uerò atramentum suto  
 rium duntaxat cum opopanaxe leue factum cacabo indi  
 di, mannâ cerussamq; inspergens.

## E tertio libro Galeni

DE COMPOSITIONE  
MEDICAMENTORVM  
KATA GENH.

*Quis cōmunis uulneratorum neruorum  
curationis modus, & quæ medica-  
menta specialia.*

Præceptorū  
Galenī error  
in neruorum  
curatione.



PECTAVIMVS omnes  
præceptores nostros præsidio,  
quod iam recentiores medici  
et glutinatorium appellare  
solent, uti. Nam initio medica-  
mentum aliquod ex enæmis im-  
ponentes, uulneris oras computa-  
tere si uel glutinare moliebantur. Si uerò phlegmone eas  
obsederat, calida aqua liberaliter fovebant, ac tritici  
farinam ex hydrelæo decoctam, cum oleo applicabant.  
Quare etiam gladiatores in patella uulneratos, supraq;  
hanc in lato tenuiq; tendine, pari modo ab ipsis curatos  
uidi: forsan melius dicas non curatos, sed perditos. pau-  
cissimi enim illorum, et ij claudi superuixerunt. Quidē  
quod per multos in manu summa tendones, per quos di-  
giti flectuntur extendunturq;, uel contusos, uel minime  
purcto lēsos, putrescentes adeò conflexi, ut coctis diue-  
tius in aqua similes apparerēt. Non enim secus exoluuntur

tur

tur & substantia emollescunt superiorem sanandi mo-  
 dum experti, ut quo uulneratam partem ueluti putrefie-  
 ri perceperim. Quoniam uerò omnia ex humiditate &  
 calore putrescere cognoscebam, curationem per siccita-  
 ti refrigerantiaq; moliendam esse deprehendi. Rursum  
 apud me contemplatus, frigidum ferè ab Hippocrate ner-  
 uis inimicum dici, optimum fore neruorum uulneribus  
 medicamentum intellexi, quod & siccaret, & caloris fri-  
 gorisq; particeps esset, uel parum ab horū medio ad ca-  
 lorem recederet: calidum tamen esse satis posse, modò sic-  
 candi potestate polleat. Etenim calor citra humiditatem  
 putrefacere nihil habet. Insuper illud quoque præme-  
 ditatus, multum referre, nulla parti affectæ medica-  
 tum offeras, an per alia corpora ei præposita, conuenire  
 aduerti alijs in nudato neruo uti pharmacis, alijs cum  
 punctus fuerit, partibus, quæ ipsi præiacent, illis.  
 Vbi etenim nudo neruo medicamentum adferas, ibi præ-  
 dictam auxiliorum integram indicationem assumi ratio  
 est. Præpositis autem partibus salus, tenuius pharma-  
 cum inueniendum est, cuius uirtus interiacentes particu-  
 las permeando non dissoluatur, sed in altum penetret.  
 Quod efficere tale pharmacum potest, si ualidè siccet:  
 & si nō calore & frigiditate medium sit ac symmetron:  
 non offendere, dum efficacia ipsius calefaciendi uel re-  
 frigerandi in particulis, quæ neruoso corpori præposi-  
 te sunt penetrandis imbecillior est reddita. Atqui inuen-  
 to iam præsidiorum scopo, quàm uidelicet tenuia esse  
 conueniat, deinceps materie mentionem facere oportet.  
 Plurima igitur quæ calefaciunt tenuiorum esse partium,

Enumerato  
 nuū partiū  
 medica-  
 ta.

permultarurſus quæ refrigerant craſſiorum, in ſimpli-  
 cium medicamentorum ſpeculatione didicimus : quippe  
 una ſolum qualitas acris cum tenui ſubſtantia nonnun-  
 quam ipsis accidit, eoq; inter omnia, quæ refrigerandi  
 um obtineat, tenuiorum partium actum eſt quamacer-  
 rimum, quod etiam caloris modici particeps eſſe demon-  
 ſtrauimus : caleſcipientium uerò liquores probi tenuiſſi-  
 mam habent ſubſtantiam : & apud omnes iam homines  
 Cyrenæus primas tenere cognoscitur, quo non præſente  
 etiam medico utimur : & ijs quæ cum ipsis ab orientali-  
 bus plagis afferuntur : cuiusmodi eſt, quod Sagapenum  
 appellamus. Hoc genere comprehenditur & liquor eu-  
 phorbi juxta occiduas orbis regiones natus, ſiue liquo-  
 rem ipſum, ſiue aliud quid nominare uelis, nobis in præ-  
 ſenti commentario euphorbium hoc medicamentum uo-  
 care ſufficit, quemadmodū iam omnes conſuerūt. Quin-  
 imò in noſtra regione proueniētes, & panacis, & lithy  
 malorum liquores ſubtili facultate præditi ſunt, & qui-  
 dem omnes nominati liquores generoſi caleſciant, opo-  
 baſami uerò ſubtilis, & ipſe non admodum caleſcit.  
 Atque ex terreſtribus nitri ſpuma tenuem ſubſtantiam  
 habet, item quod ex aqua facile ſoluitur aphronitrum, ſi  
 ad corpora terreſtria uidelicet relationem fieri inaudia-  
 mus. Subſequitur nitrum nonne beroniccum, & aſia pe-  
 tra, cuius ſlos etiam omniū terreſtrium eſt ſubtiliſſimus.  
 Porro ex metallis auripigmentum, & ſulphur, tum ſub-  
 tilia, tum calida ſunt: quibus ſuccedit niſy, æris ſquama,  
 & chalcitis, paululum ſimul aſtringentia. Quare uſta  
 quoque chalcitide frequēter in ſubtiliorum medicamen-  
 torum

torum compositionibus utimur. Citra calorem uerò manifestum tenuis essentiae metallica sunt, spodium, & phospholyx: adde quod uocatur psoricum: subtilis abūde est & chrysocolle. Cæterum inter succos laurinum simul cum eo quod calefaciendi uirtute ualida pollet, quæ sensibus percipi queat, tenuem esse didicimus. Nihil enim minus eo cedrinus excalfacit, calore tamē qui sensibus subijcitur, propter substantiæ tenuitatem, illi cedit. Huius generis est lixiuia, quæ stacte dicitur: atque hanc ipsam, quæ ex materia subtili uita fit, cedrinum oleum uirtute superat. Ex malo igitur & ficu, eaq; magis agresti, quā ἰσχυρὰ Græci uocant, item ex tithymalis combustis, huiusmodi lixiuiam conficimus. Præstantissimus est ex tithymalis, qui χαρδαίας nuncupatur. Cæterum ex seminibus frumētarijs, σίτηρα nomināt, subtilissimus est eruius sine insigni calefaciendi potestate: lolium uerò cum insigni: hordeum nequaquam calfacit. Mediam interea materiam obtinent, qualitatibus amara, quæ multum tenuibus substantia cedūt, crassi licet nihil habētia. Nonnulla ipsorum à medijs tantillum declinant: alia ad calorem, alia ad frigiditatem: quarum omnium materias in opere de simplicibus medicamentis executus sum: quemadmodum etiam omnium fructuum (Græcis ἀγρόδρα dicuntur) in quorum numero sunt amygdalæ amaræ, & pistacia: at stirpium materiæ in præsentia non memini: redire enim ad principium cogito, atque exponere, quando, quoq; modo singula per rationem nobis inuenta usurpauerimus. Hinc enim puto bonæ indolis iuuenes incitatum iri, ut medicamentorum. materiam cognoscant,

ipsimet inficiētes, non semel aut bis, sed frequēter: quoniam sensibilibus rerum cognitio sedula inspectione confirmatur: cuius rei indicium est euidentissimum, quod didicimus per omnia similes esse nobis uisi sint, differentes autem ijs, qui ipsos inspicere consueuerant. Itaque herbarum, fruticum, & arborum materiam priusquam e terra eximantur, contemplari pulcherrimum est, dum fructus uidelicet futuri sunt, dum eduntur, dum auescunt, & dum uigent. Hæc siquidem cōtinua speculatio docebit te, quando potissimum ipsos commodè decerpas, ac in siccis domunculis repositos custodias, ne à solis radijs exurantur, neq; ab humiditate ex tecto uel muris madefiant: id optimè fiet, si domus neque subterraneæ sint, neque alijs uicinæ, neque sub tegulis, sed ostia ad meridiem spectantia habeant, prope quæ tamen medicamenta reponi non debent. Amici hic quoque uos admoneo, ut me sequamini, si artis opera pulchrè obire uolueritis: nouistis enim, quomodo ex omni natione præstantissima quotannis medicamenta mihi adferantur, eò quod per diu illi omnigenarum rerum cōemptores uarijs modis ea contaminant. Præstiterat forsitan non hos solum, sed multò magis etiam mercatores, qui illa aduehunt, incusare, atque his multò magis ipsos herbarios: item nihil minus eos, qui radicū liquores, succos, fructus, flores, & germuna extra anni tempus in urbes conferunt: hi siquidē omnium primi in eis dolum exercēt. Quisquis igitur auxiliorum undique copiam habere uolet, omnis stirpium materiæ, animalium, metallorum, tum aliorum terrestrium corporum quæ ad medicinæ usum ducimus, expertus esto, ut



ex eis & exacta, & notha cognoscat: deinde in cōmentario meo, quem de simplicium medicamentorum uirtute prodidimus, sese exerceat. Nisi enim hoc modo instructus ad præsentis operis præsidia ueniat, uerbotenus quidem medendi modum sciet, opus uerò nullū ipsa dignum perficiet. Finge nanque ipsa, quæ de neruorum uulneribus prædixi, quædā te cognoscere: adulterata uerò medicamēta per ignorantiam compositioni iniicere, uel neque omnino exacte facultates ipsorum intelligere, an nō erit necessarium, frequentius hic te errare, quā recte agere? Mihi quidem admodum uidetur. Iam uerò ad plenum uirtutes cognoscere ab eo multum differt, quod est cognoscere. Etenim solum cognoscere scire est, an medicamentum siccare, uel humectare, uel refrigerare, uel calefacere nos possit: accuratè uerò cognoscere, præter hoc etiam uirtutis quantitatem sciuisse est. Quædam enim pharmaca calorem tepidum generant, corporibus nostris admota: quædā moderatum, quemadmodum alia hoc paulò ualidiorem, nonnulla iam sic feruentem, ut urere possint. Conuenit igitur, medicum non modò affectus qualitatem, sed etiam ipsius quantitatem, ut ita dicam, coniecturare: nān haud ita propriè quantitas in qualitate dicitur, quanquam dicatur tamen, ut febris magna & parua: ac tantus usus est eorum quæ sic dicuntur, ut iam proprii uim obtineant ipsa, perinde ac pyxis, æs, pictor, quercus incisior: in totum, quæ ex grammaticorum, ut aiunt, abusu inceperunt: deinde uerò propria dici credita sunt. Hæc quidē attulimus propter eos, qui parum opportuno tēpore de  
ser

sermonis proprietate arguantur. Quod autem dicere desij tale est, nempe quod exiccari desiderat, non simpliciter siccante indiget medicamento, sed conuenienti mensura. Copiosa quidem humiditate auctum, insigniter exiccante: parua, modicè hoc faciente, quemadmodum multa, admodū resiccante: non tamen extremè, neq; in summo: siccitatis enim quantitatem humiditatis copiae respondere conuenit. Ego itaque dum communem neruorum uulnerum curationis modū immutare primū ausus sum, conieci in quantam humiditatem caloremq; affecta pars recidisset. Et cum adulescens quidam mihi ostendisset in primo articulo medij dextræ manus digiti, totum in ea circa neruum locum humentem adeò ex contusione habentis, ut iam computresceret, partem sanè putridam lixiua stacta & cataplasmate ex hordei farina (ὥμῆρ λυοῖρ Græci nominant) foui: non putrescentem, sed tensam dolentemq; oleo calente liberaliter perfudi: inde quam lana sicca madorem exhaustissem, ceratum tam humidum illeui, quàm in fracturis utimur, cui euphorbium sit admixtum. Confectum autem mihi est hoc quoq; mea industria, huiusmodi occasione: Profectus ad me quispian hyeme uehementi, ostendensq; genu facile dicebat rigore se affici: statim uerò calefacientibus iuuari. Volebam igitur huiusmodi aliquod medicamentum acciperet, ut qui profectus in frigore in algeret dederetq; uehementius quàm aliàs. Nunc igitur, inquit, loturus discedo: mitte à balneo medicamentum: hæc cum dixisset, abiit. At ego cum tale nullum medicamen ad manus haberem, euphorbium cum oleo triui, & ceram liquatam immiscui: paulò

paulo post cum amicus pharmaco ferendo puerum misisset, exhibui. Doloꝛe protinus cessante, inde in alijs particulis similiter affectis uti præcepimus, de quibus mox dicetur: nunc ad nervi uulnerati sermonem redeo, propter eos, qui nihil à me nunc dictum intelligunt: increpant autem interpretes, quos deprehendūt (ut uaticinor) perperam nominare *νευροτρώτους* in tendonibus uulneratos. Tendones enim ipsos puto uocari, qui extra manum toti uolæ, & digitis circumtensi sunt. Quanquam sanè non ignorem, manifestius magisque proprie *\*τι=* *\*νευροτρώτους* *νευροτρώτους* ipsos nominari: tamen cum omnes neurotrotos nuncupare soleant, & ego, ne quis innouare me appellationem dicat, consuetam pro uera suscepi, etsi nec illa sine ratione fieri potuerit, plerisque medicis tendones etiam nervos uocitantibus. Verum siue neurotrotos, siue tenontotrotos appellasse mauis, neque ob has uoces incolumes erunt, neque conuulsione laborabunt, quemadmodum neque mancipient, nec morientur. Appellatio siquidem nec seruauit hominem unquam, nec perdidit, sed medicamentorum facultas utrumque efficit. Atq; ego hæc immutans, putrescentes, conuulsos, mancos, nonnullos etiam pereuntes, sanos uiuosq; reddo: nervos enim contusos habentes sicut illum neurotrotos, non neurothlastos nuncuparunt. Cæterum curatio comunis est, & periculum simile amborum, nempe contusorum & uulneratorum, uel neruis, uel tendinibus. Itaque homo ille putredine iam circa primum medij digiti articulum orta, tensus doloremq; ex superiacentibus concipiens, multo melius habere cœpit die postero, quo uice hordei fa-

rine

rinæ cruorum farinam stactæ lixiuæ commiscimus. Vnde triduo simuliter curatus est: iam quidem in alijs quoque particulis dolorem omnino non percepit, ex contusione uerò neruosum quoddam corpus crassæ membranæ per simile inclinauit: quod mediocriter me commouente facile totum semputriam excidit. Videbatur omnibus contemplantibus hoc corpus neruus totus esse putris, ut qui ignorarent, quo pacto tendones hi neruosis membranis conuelati, per uolam procedunt, & in totam seriem digitorum extenduntur. Mihi uerò putridum ex contusione attollenti tendo saluus apparuit. Cum igitur uel pastillo uno, uel trochisco, uel utcumque uocasse libet, quorum in numero est & polyidæ, ex cōscmate soluto, uel syræo, id est sapa (nam & hoc pro arbitrio nominare liceat) apparentē nerui particulam prius inunxissē, rursus eodē modo & cataplasmate, & unctione ex euphorbio in ijsdem locis sicut prius utroque usus sum. Quarto iam die omnia commissa circa contusum quidem antea, ulceratum uerò tunc primum digiti articulum intuitus, considerabam quorsum à cataplasmate transgrederer. Visum igitur est, si neruus inflammatione prorsus uacaret, ad cicatricem ducentia transire: si uerò phlegmone ipsius scirrhusus tumor remanserit, abunde siccantia exhibere. Quoniam uerò nōnihil ex ea reliquum esse uidebatur, medicamentum ex dracunculi radice confectum usurpauī, quod præter alia, eadem cum Aegypcio pharimaco Iside continet: assumpsit autem dracunculi radicem. Ab hoc Athena dicta usus: inde ad ea, quæ cicatricem ducunt, perrexi. Ex altero pastillo sapa diluto nu-

datas

datæ uulneris partes illinens, euphorbium extrinsecus  
 imponebam, tantum ceræ ac resinæ temperans, unde em-  
 plastri crassitudo simul fieret, & euphorbij uires con-  
 seruari entur. Cæterum quomodo his scopis considera-  
 tis medicamentum componas, postea declarabimus. Ete-  
 num aliud ex aceto pharmacum confecimus, hoc spectan-  
 tes, uti ipsius spissitudo, & subtilis aceti uirtus, cum re-  
 frigerandi uis interim exoluitur, incolumis permaneat.  
 De his sanè quomodo præparata sint, post paulum tra-  
 ctabitur. Nunc quia neruis uulneratis medendi modum  
 ex rationali indicatione, nugatoria illa Empiricorum  
 peripetosi repudiata, inueni, totam cogito ipsam dicere,  
 sed ita, ut nullam distinctionem præteream, sermonem  
 ab initio rursus repetens. Quando igitur uulneratum  
 aliquem protinus offendo, interim per liquida phar-  
 maca curationem molior, interim emplastris, lanum ex-  
 trinsecus quàm mollißimam oleo calente imbutam appli-  
 cans. Quòd si medicamentum ex aceto usurpem, aceti mo-  
 dicum oleo admiscēs, bis tēue quotidie soluo, & oleo ca-  
 lente foueo. Si noctes longæ fuerint, etiā in his \* soluere \* λούειν.  
 consueui, idq; magis dum ulcus à medicamentis eroditur.  
 Nam ubi initio tali medicamento utēti æger nec se mor-  
 deri, nec dolere, nec tēsiōnē percipere mihi dicat, die sol-  
 uo, & foueo, mane semel, & uesp̄ri iterum: oleū uerò,  
 quo fouemus, satis calēs esto, uerū ita ne uulneratā par-  
 tem offēdat. Sicut enim frigida huiusmodi affectib. ma-  
 ximè est contraria, sic tepens non omnino utilis. Quoniā  
 in primo de Simplicib. Medic. uolumine didicimus, ut  
 aqua calens aut frigida maximè cōtraria facere nata est,  
 ita

ita quoque oleum. Nam frigidū corpori admotum, per-  
 spiratum ipsius obstruit, imò prohibet: calidum uerò di-  
 gerit, ac extenuat: quod tibi etiam ex carnibus in eo co-  
 ctis licet condiscere: similiter enim pridie decoctis, fria-  
 biles efficit: etsi protinus cum animans mactatum est, co-  
 quas, aut in sartagine frigas: propter quod & ego fo-  
 mentum ex oleo calente satis usurpare malui, tepidū sen-  
 per uitans: hoc autem magis frigidum. Porro aquæ u-  
 sum in tota curatione ita tempero, ut ne attingat quidem  
 ulcus: proinde cum sanguis initio statim à uulnerata par-  
 te detergendus est, ex oleo id facere expedit. Vbi iam  
 ægri mediocriter habentes, lauacro utuntur, neque tunc  
 affectum locum in aquam demergere ipsis cōcedendum:  
 magna siquidē ex parte nerui in manibus uulnerati sunt.  
 Memini cuiusdam ex huiusmodi uulneratis, qui cū diē  
 quartum citra omnem dolorem ageret, partemq; affectā  
 absque phlegmone uideret, multo in frigore domo egres-  
 sus ad opus quoddam necessarium, eiq; diu immoratus  
 domum redijt, membro uniuerso ad ceruicem usque ten-  
 so, idq; cum ingenti ipsius dolore. Postquam uerò quo-  
 dam me accersente, profectus ad eum, uidi quibus in ma-  
 lis esset: oleum ex itinere refrigeratum à particula au-  
 ferri iussi: calente uerò totum membrum foui, deinde cer-  
 uicis partem rectam lanis oleo respersis, & medicamen-  
 to liquido ex euphorbio, simul cum castoreo hominem  
 statim mitigauī: & somno accedente usque ad uesperam  
 omnia cessarunt symptomata. Plurimum igitur confert,  
 lanam permanere calidam, siue oleo tantum, siue oxelæo,  
 hoc est aceto & oleo quoque imbuta fuerit: fiet hoc, si  
 alie

aliæ lanæ sicæ extrinsecus circumponantur, & æger intra tectum, modò hyems fuerit, ad quintum usque uel septimum morbi diem sese contineat: nam si eousque nec phlegmone quidam tentetur, uacetq; prorsus dolore, & nullam sentiat tensionem, in posterum tutus erit. Curabis autem ne in aceto uinosum aliquid appareat: quemadmodum oleum quoque, ut omni astrictione uacet. Neque igitur crudum, quod ὠμότριβος, uel ὀμφοειδὲς duplici nomine Græcè dicitur, adhibebis: neque id quod ab Hispania uehitur, imò nec aliud quodlibet ex his quæ oleæ surculos habent. Optimum oleum est tenuissimum, quale in De oleo. Italia Sabinum: alibi uerò in nationibus Romano imperio subiectis, quæ nullam obstringendi uim occupant. Iam uerò qualis res sit rationalis indicatio, & quanto potior nuda experientia citra methodum hinc condisces. Cùm permultis neruorum uulneribus sæpe in itinere, in nauigio, in agro, uel in ciuitate, sed procul à meis ædibus incidissem, nec medicanēti ex euphorbio copia adesset, nec illius quod ex aceto cōficitur, nec alterius, pharmacæ, quorum eo loco facultas erat, uulneri imponentes, id quò tendimus semper sumus affecuti. Noui etenim me in agro propolim recentem, liquidā & pinguem, quam agricola habebat, uulneri imposuisse: interim fermentum solum, interim ambo commixta. At fermentum quā uetustissimum esse, propolim uerò secus habere conuenit, quantum ad tempus attinet. Sin autem uetustior sit, ex oleo iuxta ignem, uel in sole emolliatur. Rursus in alio quodam rustico succum tithymali fermento mxtum imposui, quem prope ipsius aulam succreuisse conspexi.



ram: quippe fermentum ut recens deprehendi: nonnunquam propolim ex oleo liquefactam fermento immersi, sed prius aceto quam acerrimo dissoluto. Præstat oleum esse uetus in huiusmodi temperaturis, puta ex oxymelite & fabarum farina, uel eruorum, uel lolij, uel ciceris, uel lupinorum amarorum, uel tenuiori polætæ puluere, uel hordeacea farina: quibus in urbibus usus sum cataplasmatis, non solum in his, quos iam phlegmone prehen-  
derat, sed etiam protinus ab initio. In agro cum picem li-  
quidam apud fabrum inuenissem, fermento temperatam  
imposui: item apud alium eruorum farinam illo imbutâ,  
cuius penuria etiam prædictorū quoduis misci potest.  
Quinetiam oxeeum solum quod caleret lana exceptū,  
statim dum aliud nihil haberem obtuli, confusus aceto  
abundè acris & uetusto. In alio refrigerato, quod ante  
horam unam, uel longius etiam tempus neruus contusus  
esset, quousque aliud quoddam idoneum medicamen di-  
lutum adferretur, partem oleo foueri præcepimus, inte-  
rim aceto prius admixto: cum acris per æstatem calidissi-  
mus erat, temperatura ex utroque diutissimè foui, donec  
aliud medicamentum asportaretur. Singulis autem præ-  
dictis farinis permixtam statim saepe illeui, & mox à  
principio, & postea cum homo medicamine quodam e-  
nemo non probè usus esset. Hæc itaque omnia quomo-  
docunque applices, calida qualitatibus offeras. Ego sanè  
cum nullum domi meæ aliquando medicamentum compo-  
situm in promptu haberem, festinabundus dedi cuidam  
familiari uetus euphorbium, iniunctiq; læue factum ex  
oleo ueteri, donec humidi cerati sibi similitudinem haberet,  
tendi

tendinis puncturæ in manu admouere. Reuersus igitur, interrogavi uulneratum, multumne caloris in parte affecta sentiret: ille mediocrem aliquem respondit se percipere. Rursus igitur querebam, an rosionem à medicamento iuxta uulnus sentiret: ille cum se non rodi, sed ueluti pruritum quendam sentire dixisset, pharmacum ad noctem usque adherere permisi. Quoniam uero dum imposita auferrem, calor in affecto loco mediocris mihi apparuit, neque punctus hians, satius uisum est eodem uti medicamento: & cum uulneratus altero die prosperè haberet, item tertio & quarto, ad finem usque idem pharmacum usurpauimus: quod contemplatus aliquis in alio uulnerato similiter recenti euphorbio in eundem modum usus est. Quare necessario calor ægrum multus, & comorsus, & dolor in ulcere subsecutus est, adeo ut homo ad me deductus sit, tanquam hoc præter omnium opinionem accidisset. Ego statim re intellecta, quod impositum erat abieci: fotum autem per oleum ipsi adhibito, medicamentum ex aceto imposui: quod si non in procinctu fuisset, pharmacum ex euphorbio copiosioris ceræ particeps admouissem. Quapropter non oportet, uti paulò antè diximus, probatorum medicamentum facultates ac species ignorare, nec quæ celeriter uirtutem mutant: tum quæ rursus diutino tempore conseruant. Nam ex his, quæ caducum ac statim euanescentem calorem occupant, euphorbium est. Id autem cognosces, etiam si non manduces colorem contemplatus: quippe non ut ab initio cinerum, uerum suppallidum & subflauum redditur inueterascens. Statim etiam siccum abundè uidetur tunc, & uix inter

Leuigandum ex oleo recenti protinus imbibito dissolui-  
 tur. At subito ipsum oleo nuscendum non est, sed prius  
 in mortario sensim terendum, ne dilatescat. Quid uerbis  
 opus est? quod etiam gustanti tibi recens percipitur fer-  
 uentissimum, ut linguam adurat, uetus autem modicam  
 efficere caliditatem? Iam alyis multis pharmacis exilem  
 adeo potentiam pauculis annis retinere contingit, attamen  
 euphorbium tussiam excellit: hæc enim ab anno admo-  
 dum imbecillis redditur, ut bimula prorsus expiret: eu-  
 phorbium sanè cum principio bonum fuerit, & probè  
 urat, etiam anno tertio adhuc uim aliquam retinet: inte-  
 rim anno quarto: quinto autem & sexto iam exoluitur:  
 deinde procedente tempore in totum elanguescit. Sic ego  
 dixi, oleo me nonnunquam usum esse uetusto sine cera,  
 quod annos ferè quinq; uel sex natum esset. Vnde usum  
 ipsius euphorbij mensura comprehendere nemo potest.  
 Nam recens oleo decuplo cum cera tripla commiscetur,  
 ueterascens copiosius ei immittendum est: trimum uerò  
 & quadrimum, uel duplicatum prioris pondus, uel æ-  
 quale ceræ. Cum igitur pharmacum consistentia sinule  
 acopis dictis unctionibus habere uolueris (quæ spissitu-  
 do liquidi etiam cerati est) oleum ceræ quadruplum esse  
 curabis. Vbi uerò emplastri speciem referet, cerā omni-  
 no æqualem oleo temperare oportet, maximè si sicca fue-  
 rit, & uetusta: sicut recens & pinguis pauciore oleo in-  
 diget, ut ceratum emplastrodes efficiat, idq; magis adhuc  
 per æstatem. Itaque si ceratum emplastrodes facere sta-  
 tuis, ceræ ex oleo liquefactæ, qua dixi temperatura se-  
 xtam recentis euphorbij partem admiscebis, ut illius una  
 sit

fit drachma, ceræ sex, olei item sex, uel quinq;. Sed quoniam cera glutinans ac uiscosa non est, quemadmodū resina & pix, ideo hanc, uel illam, uel utriusque partem cerato admisceo. Clarum igitur est, dum hæc miscentur, non amplius oleum pari illis portione affundendum. Et enim cera ad liquiditatem multo pingui indiget: resinae quæ quidem aridæ prorsus sunt, modico: liquidæ & siccam quandam substantiam ad emplastri crassitudinem assumere postulant. In cera igitur non magna humiditatis ac siccitatis differentia est: inter resinas, sicut etiam in picis genere contrario modo habet: aridæ præsertim ab humidis permultum differunt. Resinarū differentia. Omnium uero siccissima est, quam nonnulli frictam, alij colophoniam appellant. Huic succedit, quæ ex figulinis impura, nec destigmata sumitur: quam si purges, in frictam mutabitur. His ambabus siccior est, quæ dicitur pitynon physema, ac si dicas, picea germinatio. Hanc sanè ceusquallidā, in præsentis emplastri compositionem non esse idoneam ratus, abieci. Vsus autem sum fricta & liquidis. Iam uerò ex his nonnullæ diutius liquidæ permanent, quemadmodum terebinthina: aliæ citò inarescunt, sicut strobilina: media utriusque est abietina. Quinetiam facultate calidior est quidem strobilina, mox uerò abietina, deinde terebinthina: cupressi resinam nescire non ausus sum, ut quæ nonnihil astringeret. Putabit forsan aliquis nobiscū dissentire Dioscoridem Anazarbeum in sermone de resinis hunc in modum scribentē, primo de medica materia commentario: Ex omnibus resinis principatus terebinthinæ datur, post eam lentiscinæ, tum ei quæ de picea raditur,

Et abiete: ultimū locū pinea, strobilinaq; obtinet. In his enim Dioscorides tanquā de infima strobilina, optima uero terebinthina sentire uidetur. Verū ego ex his tribus resins, strobilina, abietina, terebinthina, principem certē strobilinā calore, secundā abietinā, postreman terebinthinā esse diximus. Quēadmodū igitur, qui inter Italiae uina austera optimum ponit uinum Italicum: alius ad qualitatem unam sermonem referens, alius absolute de tota ipsius substantia pronuncians, uerus deprehenditur: eadem ratione etiam inter resinas optimam tanquam medicamentum in multiplices usus accommodatum, meritō terebinthinam affirmaueris, non tamen caliditate primas obtinere. Itaque, ut aiebam, licet tibi quamlibet resinam ceræ muscenti simplex ceratum glutinantiū efficere, quod ex oleo et cera duntaxat componimus. Hic uero experientiæ quoque utilitas est, quæ de coniectura nostra decernat: potes enim, ubi triplicatam ceram terebinthinæ commiseris, intelligere, emplastrine spissitudinem medicamentum acceperit, an ea adhuc siccius, copiosorem insuper resinam desideret. Quapropter ubi hunc in modum experienti tibi mediocriter habere uideatur, miscebis tunc medicamento, quod conficis, duodecimam partem euphorbij. At si ignores euphorbium exactē sit calidum, an nonnihil ab eo discedat, post confectiōnem linteo paululum medicamenti illitum tuæ ipsius tibie uel cubito horis aliquot imposito: postea si modice calefacere deprehenderis, temperatum esse medicamentum arbitraberis. Quod si uel nullum sensilem calorem edat, uel iusto feruentiorem, integrum est aut pharmacum

remittere, aut intendere : remittere quidem mistura ce-  
rati, intendere appposito euphorbio. Atqui si propolim  
pinguem habeas, eam omnibus resinis aptiorem fore tibi  
intelligito, ut quæ uaporosam spiritus crassitiem, humo-  
resq; superfluos elicere, ac ex alto foras ducitare soleat.  
Siquidem resinæ cum cera emplastri spissitudinis gratia  
non tanquam curationis consilio assumuntur, propolis  
autem curationis ipsius scopo continetur, atque hac sola,  
ut dixi, recenti, quantum ad humiditatem attinet, usus  
sum in agricola quodam duro corpore : ac mirum est,  
quomodo sola adusque finem adhibita adiuuerit, adeo ut  
nullius pharmaci præterea uenerit necessitas. Alteri qui  
puncturam nerui profundiorē haberet, tithymali cu-  
iusdam modicum adnascui : mollioribus uerò corpori-  
bus medicamentum tactu durius apparet, nisi olei mistu-  
ra uehementer ipsum mollias. Quin & alia medicamen-  
ta omnia, quæ nēuorum uulneribus adhibentur, liquida  
& mollia esse conuenit. Molliciem igitur quoduis o-  
leum conciliare, robur uerò medicamenti uetus oleum  
tueri potest : sicut propolim in agro nonnunquam ac-  
commodaui, tanquam melius pharmacum ijs, quæ tam  
affuerant, eligens : ita fermentum rursus admoui alte-  
rius medicamenti inopia, quoniam hoc quoque in alto fi-  
xa extrahere & discutere sciebam : quanto autem uetu-  
stius, tanto est præstantius. Porro huiusmodi non solum  
facile in agris reperiuntur, sed etiam sulphur uiuum,  
quo nonnunquam & ipso sum usus, temperans cum te-  
trapharmaco. Huic igitur & aphronitrum, & beroni-  
cium litrum, & aphrolitrum non lapidosum, sed uerè

aphrolitrum, quod spumæ consistentiam habeat, adijciens frequenter usurpauimus, non modò in agris aliorum penuria, sed etiam præsentibus enumeratis medicamentis hoc nomine, ut animi sensum experientia explorarem, probaremq; : ac uulneratus talis rei solo usu conualui, fatus uidelicet oleo. Hoc enim commune tibi esto in omnibus medicamentis, quæ hic dicuntur, neruorum uulneribus cõducere. Iam uerò quod à medicis uocatur arsenicum, ab his qui Atticè omnia uolunt proferre arsenicum, adiunxi tetrapharmaco, rationem experientia uolens confirmare: rursus cum id non adesset, sandaracam, uti uocant, sicut calcem restinctam & uiuam, lotam & illotam, minus autè uiuæ, plus restinctæ, & hac plus adhuc lotæ adieci. Cæterum de exacta cuiusque compositionis quantitate paulò pòst dicemus, ubi hæc simplicia omnia, ususq; ipsorum distinctiones retulerimus. In hoc enim sermone propter Empiricos, quæ ex periprosi, id est incidentia, seu casu plurima compositorum medicaminum inuenta esse putant, uisum mihi est commemorare, neruorum uulnera curandi rationem à me citra illam periprosin repertam, inde quòd sanationis ipsorum scopum, & simplicium pharmacorum facultates cognoscere. Etenim ex casu uirum aliquod simplex medicamentum inuenitur: rationalis autem methodus plurima simul inuenit, & uarias ipsorum compositiones. Quæ iam ex alto humores educere digerereq; possunt, neruorum uulneribus ex usu sunt. Quandoquidem uerò nonnulla caliditatem immoderatam, uel mordacem uehementer acrimoniam, uel acutiem coniunctas habent, alia ipsis pharmaca adnufce



admisceri ratio est, quæ prædictos excessus sine uirtutis offensa temperare queant. At hoc fieri non potest, nisi cuiusque medicamenti non modò qualitatis genus, sed etiam quantitatem in ea cognoscas. Quædam namque, ut ostendimus in commentario de simplicibus medicamentis, in primo calefacientium ordine collocantur, à temperatis paululum abscedentia, alia in secundo magis inde declinantia, alia tertio, nonnulla quarto, quæ uerere iam queant. Igitur ex uehementiæ uirtutis cuiusque pharmaci portione mistorum facultas inuenitur, modò simplicium omnium temperamenta intelligas. Empiricorum hæresis sola homogenia propter uniuscuiusque medicamenti naturæ ignorantiam temperat: & qui hanc nouerunt, sola homogenia miscent, quia excessus quantitatem certò non cognoscunt. Quod itaque ipse primum præparauit medicamentum, ex multis eiusdem generis compositum est, quoniam nondum cuiusque uirtutis quantitatem exactè pernoscebam. Inieci etenim nonnihil arsenici, sulphuris, musyos, calcis lotæ & illotæ, & pompholygis, similiter spody, item squamæ æris, chalcitidis ustæ, lotæ & illotæ: ad hæc non ustæ. Hæc igitur prius in aceto quàm acerrimo diebus multis sole æstiuo leuia reddidi. Quæ fundi ex his debebant, cera erat necessariò, & mellis nonnihil prius expurgati: resinae prope modum omnes, propolis, pix, & ladanum. Liquida, oleum cyprinum, susinum, opobalsanum, amaracinum, gleucinum, cedrinum, riciniū & uetustum. Ex singulis autem liquoribus, quos non multo antè recensui, paulum aliquid: postremò aliàs aliud auferens experientiæ gra

tia, nihil simpliciora singula, quibus in hunc diem utor, à uirtute pristina abscedere animaduerti: atqui temperaturæ ipsorum mox ponentur. Itaque ex aceto, & liquoribus talia confeci, ceræ, resinarum, propolios, & picis nonnihil adiungēs, pari modo ex columbarum stercore & herbis tenuium partium. Minus ergo molesta sunt liquida pharmaca cum alijs, tum neruorum maximè uulneribus, quibus utimur etiam emplastri modo compositis, propter eos qui se lauare uolunt. Lanis enim ablatis, ac tali pharmaco solo adhærente, lauant minus duriter, sed liberius. Prædictum est, neque tunc læsam partem aquis respergendam, si in manu uulnus contigerit, pedem uerò si is læsus sit, non madefieri qui potest: sed tunc à balneo primis quatuor diebus abstinendum est. Quoniam uerò omnium huius tempestatis hominum, & eorum etiam qui ruri degunt fortitudo perijt, qui lauare se quotidie consueuerunt. Equidem qui non adeò delitijs affluunt (sunt hi maximè pauperes) ut plurimum obtemperantes nobis habemus: diuites uerò, & præsertim potentes illos, uel ægrè obtemperantes, uel prorsus immorigeros experimur. Optimum igitur fuerit, nec ipsis mæderi: uerùm cum, nescio quo modo, alijs ob aliam causam, quidam nostrum inuiti, quidam ultro ipsorum molliciem tolerare coguntur, tale quippiam facillime consueui: uulnerate parti pharmacum aliquod emplastrum imponens, extrinsecus iterum multiplices pannos oleo tinctos plures superinijcio: quibus rursus extrinsecus fasciam ex linteis accommodo, quam deinde in ipso balneo, cum æger in solium ingreditur, oleo prius perfundendo: &

do : & loto iam omnia imposita aufero , utorq; prædicto totius curationis genere . At uerò patet omnibus, eum qui pulchrè neruorum uulneribus prospecturus est, etiã particularum naturæ peritum esse oportere . Nam antea comprehensum est, tendines pariter in quos muscoli complures desinunt, non mediocriter condolescere, primum quidem conuulsione tentatos, dein putrescentes & ipsos, uicinas simul partes uniuersas inficere . Nonnulli eorum ceu membranæ tenues latiq; sunt, quales in femorum terminus ad genua spectantibus, tum intra manus, infraq; pedes subteni sunt . Omnes enim qui in manibus pedibusq; cernuntur, satis quidem coeuntes cutem contingunt : qui uerò in patellam perueniunt , à circumposita cute iuxta tarsum abscedunt .

Confectiones medicamentorum ex metallicis,  
ad neruorum vulnera.

EX metallicis medicamentis astringentia uitare consultiū est, præsertim ubi cõpositi pharmaci usus in punctura eueniat : quæ uerò detergendi uim occupant , sicut æris squama, ex usu sunt . Cæterum omnia metallica, cum crassiorum partium existant (multū enim terrestris substantiæ in se continent) artificij nonnihil in præparando requirunt , quo tenuiora fiant . Hoc igitur ex aceto fieri quàm acerrimo cõsideraui , præsertim quòd ex uino non austero confectū est : at si ex tali non sit, sed uetus, eo utilior . Attende tamen diligenter in gustu, ne tibi uel minimam uini qualitatem referre uideatur : tale quippe acetum ualidam exedēdi, secandiq; uicina potestatem habet .

Iam

Iam uerò metallica ex acerrimo, & quàm fieri potest uetustissimo, substantiaq; tenuissimè la uigare oportet, quò felicius spissitudo auferatur. Præstiterat id in sole æstiuo perficere. Quædã enim ex metallis ne uel scindi possunt, nec communui, in aceto ad dissolutionem facilia, sicut chalcitis, & musy. Nonnulla & contundi, & concuti, & postea læuigari desiderant, quemadmodum æris squama. Cum igitur primum præparatũ est medicamentum, in musci ei & arsenicum appellatũ, postea superfluum esse putau: etenim ex æris squama & musy, & chalcitide medicamen compositum iri abundè satis uidebatur: temperaui autem prima confectiõne etiam æruginẽ combustam: nam quæ ignem experta non erat, tanquam iusto mordaciorẽ suspicatus sum: deinde tamen non ustæpauxillum simul adieci, quantum aliorum portio ferebat. Pari modo chalcitidem, crudam sanè paucissimam, ustam uerò æqualem musy & æris squamæ indidi. Præstantius autem omnibus compositis fore speraui, imò etiã usu deprehendi, in quo copiosa æris squama inesset, deinde chalcitis combusta, postea musy. Quocunque igitur miscebis pharmaca, ad solem, ut donu uerno tempore, multis diebus in puluerem ex aceto quimacerrimo rediguntur: quanto enim longiore tempore trita fuerint, hoc tenuiorem substantiam consequentur: ideoq; angustis uulneribus aptiora: sicut in neruis carne denudatis, admodum tenuia exedentiaq; cauenda sunt: ob quod prædicti pastilli omnibus id genus conueniunt: siquidem nonnulli astringentia quoque assumpserunt. Porro celebres ex illis sunt, qui ad Andronem, Polyidam, & Passionem auctores

flores refruntur. Sunt & alij quidam, quartus, & quintus, illis ualentiores, quibus ego subinde utor. Temperatura uerò ipsorum perfectæ sermonis processu dicitur, nunc de eorundem usu tantum explicasse sufficiat, quod tritos ipsos aridos, postea rursus siræo ( id est sapia) adiecto ita tercre conuenit, donec sordium spissitudinem recipiat medicamentum, & æqualiter læue fiat. Vocant autem nunc omnes siræon, ex musto decocto natum: id autem nihil uini habeat, quale nō ex austerarum uuarum, sed quàm maxime dulcium musto præparatur, neque ex primo fluente, sed postremo. Si igitur tale mustū extiterit, coquendum est, dum ad dimidiam partem mensuræ consumatur: sin minus, ad tertias concoquendum est. Huiusmodi quidem decocto pastillos soluere expedit, ut mellis crassitudine linamentis excepti, neruis denu datis imponantur, maximè temperatiores, qualis Polyidæ est. Atque hoc multò magis, si corpus sit tenerum ac molliusculum, in quo prorsus à pastillorum usu te abstinere tutius est, alijs utētem pharmacis, de quibus iam sermo factus est, iterumq; fiet. Neruo autem cooperto, qui nudus erat, linamentis extrinsecus unum aliquod ex ijs, quæ ad angustæ uulnera conueniunt, superdandum est. Sunt huiusmodi quatuor genera, unum quod ex metallicis conficitur, alterum ex liquoribus: inter quæ refertur & illud, quod ex euphorbio constat, tertium ex columbarum stercore, & quartū nute à nobis appellatū, quo etiam ad neruos tenerorum corporum omnino denudatos utimur. Ex his quatuor unum quoddam toti assectæ particule circumdandum est, ita ut sanas quoque

partes unâ comprehendat, præsertim superpositas: quâs bis die, uel ter, si necessitas incidit, fouere oportet. Quin etiam nocte interim linamentis quidē denudato neruo impositis: cæterum eo quod extrinsecus admotum erat ablatum. Porro cum permagna humanorū corporum sit differentia, tum in temperamentis, tum ætatum mutationibus, insuper uite studijs, nulla ratione quodque medicamentum omnibus conuenire potest: quamobrem duo in promptu habeto, alterum ualentius ex simulibus genere confectum, alterum mitius, quæ inuicem mīsta dum usus postulat, permulta inter hæc iuxta mīsturæ quantitatem constitues. Si nanq; parem utriusq; portionem temperaueris, mīstum exactē medium amborum erit: quòd si altero plus adijcias, tantum à medio ad illud summum recedet, quanto mīstura superauerit. Esto igitur ualentissimum metallicum ex his constructum: unam partem crudæ chalcitidis habeat, duas misyos simuliter crudi, tres æris squamæ: inualidissimum unam itidem misyos & chalcitidis, sed utriusq; combusti, squamæ quatuor. At uerò amborum medium, quo subinde usus sum, tale esto: Misyos, chalcitidis, æruginis, cuiusq; usti partem unam, æris squamæ partes tres: his, sicut prædixi, contritis, ceræ inualentissimo duplum, in altero duæ partes & s mīscuntur: in medio, quod intra hæc consistit, partes duas & quartam, sicut in primo trium, quod ualentissimum esse dixi, omnes partes numero senæ ex misy, chalcitide, & squama collectæ nascūtur, quibus ergo duodecim ceræ partes adijciuntur. At in medicamēto inualidissimo

Aliàs \* o = si metallicorum sex partes existant, ceræ \* duodecim  
 Elodecim . appo

proponas, in mediocri amborum medium. Sunt autem inter octodecim & duodecim media quinque & decem. Quod si denarium unum statuas, unā omnium esse partem, tot denarios adijcito quot partes, siue unciam, siue libram: Sic enim apud Romanos consuetudo est nominari, tot uncias uel libras. Porro mēsurā apud ipsos est, qua oleum metiuntur, infecta discretāq; lineis, totam in duodecim partes diidentibus: atque integra mensura ab eis libra nominatur: duodecima eius portio, uncia. Metallica igitur & cera in lance alijs uncys consistunt: oleum cornu metiuntur. Itaque prædictis pharmacis omnibus iuxta ceræ portionem oleum immittatur, superetq; in singulis dimidio: ut si cera uncias octo cōpleat, oleum duodecim, hoc est integrā libram pēdeat. Esto autem id sabino simile, essentiae tenuioris, minimeq; astringens: si uetus sit, præstat. Crudū uerò, & quod ex oleæ sarculis confectum est, nequaquā conuenit. Cæterum omnibus medicamentis cōmemoratis, ubi metallica ex aceto pluribus diebus in mortario trita fuerint, thus candidissimum & pingue admisceatur: deinde rursus unā cū metallicis diebus aliquot leuigetur, priusquam ceratum eis temperes. Quanta uerò ex omnibus metallicis copia colligitur, huius partē dimidiam thus cōtineat: si mollius medicamentum facere postulas, amplius quā dimidiā: sicut ubi acrius expetis, minus dimidio adiūgas. At uerò ceræ cum oleo liquatæ resinam quandam misceas licet, sciens acrius ipsum adiecta strobilina fieri: mollius terebinthina, mediū utriusq; abietina. Ex harū genere larix quoq; est, prædictis planè humidior: substantia uerò simi  
lis li



lis liquida piceæ, quam loco terebinthinæ institores uendunt ignorantibus eas discernere : est autem talis odore, gustu, & facultate quàm terebinthina acrior : cum hac igitur & terebinthina larix persimilem potentiam obtinet, sed tenuiori substantia, maioreq; discutienti uirtute prædita est. Miscebis igitur ceræ sextam superiorū resinarum partem uolens medicamentum emplāstri figuram induere. Nam uni ceræ pondo resinæ uncias duas adijcies : sin autem liquida insigniter fuerit, uel unam tantum miscere satis est. Attamen si ut emplāston pharmacum fiat nihil curas, resinam addere non admodum opus est : galbani uerò æquale thuri pondus indes, ubi mitissimum reddere statuis : dum ualentius, dimidium : quando ipsorum medium, id quod inter æquale & dimidium est. Verbi gratia, si quatuor thuris denarij fuerint, duas galbani impones, ualidum permanere medicamentum postulans : nute quatuor, medium tres. Vt enim molle & anodynū quippiam habet, ita quoque *συντετακτον*, hoc est exedens : quod sanè plurimis mollientibus accidit. Quare cum neruo denudato pharmacum adhibes, non adeò galbanum esse commixtum oportet. Quod si nudus ille non est, haud mediocriter ipsius temperatura dolore auferendo conuenit : ideoq; tale etiam medicamentum acuto sensu præditis, teneris & cachochymis paratum habere expedit, in quo plus galbani adiectum sit. Omnia siquidem metallica aspera sunt, doloremq; concitant, ex liquidis acetum : unde meritò ex illis confecta pharmaca aspera uidentur, & dolorifica : ob quam rem sòtus ex oleo & galbani mustura similiter ipsis idonea est : nihil autem

autem minus tenuium partium adeps galbano lenis est. Quare uelim aliud quoque medicamen ex his præparatum habere, quod ex metallicis composito temperare poteris, tum in dictis corporibus, tum in his quæ asperum & dolorificum quandoque medicamentum percipiunt: deligendus autem adeps, qui tenuioris essentiae existat, cuiusmodi sunt agrestium animantium, maximè leonis, pardī, apri, & ursi: ad hæc uolatilium, maxime anserū: horum inopia agrestium gallorum gallinarumq; ita uero anserum quoque syluestrium. Nam animalium, quæ in urbibus aluntur, & tanquam in ocio conclusa sunt, humidior est adeps & crassior. Quando pharmaci substantia cerati spissitudinē habebit, ceræ tertia uel quarta pars admiscetur: uel si adeps humidus nimium esse tibi uideatur, licet & ceræ dimidiam adicere: quemadmodum ubi sicca fuerit, quartam: cum mediocriter habet, tertiam. Quod iam ceratum multis utile futurum est, *δις τράτωρ*, id est, ex seuis nominetur.

De medicamento *δι' εὐφορίου*.

**D**Ictum mihi est & antea, uetus euphorbium recentiori multo inferius: si igitur anniculum sit, etiam cyrenæo magis liquore excafcit: præsertim eo, quem nunc habemus: ex quo per aquæ irrigationem stirpes augent, & ad liquoris copiam generandam conficiunt. Nam post annum unum abundè calidum est: deficit autem non mediocriter à recenti: bimum adhuc magis à nouo degenerat, quemadmodum trium aut quatuor annorum etiam hoc magis. Vetustioris uirtus omnino resoluitur. Cognosces autem, ut dixi, quam ætatem, quamq;

uim obtineat, & colorem, & substantiam eius respiciēs. Colore quidem uetus nouo flauidius, pallidiusq; apparet: substantia durius & siccus. Iam si gustu uoles discernere, non coniecturalem eius dinotionem, sed firmā habiturus es. Quod uerò dixi calfactoriam unctionem ex eo me confecisse, exactissimè pharmaci facultatem tibi indicabit. Constat hac temperatura: Vna pars est euphorbij, tres ceræ, olei duodecim: ceram quidem euphorbij triplicatam, oleum uerò ipsius ceræ quadruplum esse conuenit. Vbi igitur in hunc modum medicamentū composueris, fricata quadam eius parte manifestò licet dinoscere, quantam uirtutem obtineat, maxime autem in balneo innotescit. Siquidem ab aëre moderatur, sed magis adhuc ualidè ab aqua, cum euphorbium sit calidum, recens, & forte. Tale igitur consecutus, & hanc ipsam cōmemoratan unctionem audacter pūcturis imposito, ubi oras hiare metus est. Si imbecillius fuerit, auge mensurā euphorbij pro imbecillitatis ratione, interim partem dimidiam iniiciens, interim duas nonnunquam pares ceræ, & plures, si uetus numium extiterit. Primus sanè usus in puncto neruo, uel tendone, ad secundum te deducet. Si nanq; uulneratus ipse erosionem sensisse dicat, tibiq; partes puncturam ambientes calidæ appareāt, tum ipsa punctura magis ac par est elata, & oræ inflammatione nonnulla afficiantur, uel olei copiosioris mustura uim medicamenti remittes, uel compones aliud ad priorem temperaturam, aut euphorbio uetustiore moderatum ita efficiēs. Quòd si è contrario quàm dixi, eueniat, uirtutem pharmaci adaugebis, Si mediocriter omnia habere uidebuntur,

buntur, seruabis. Itaq; confectura ceram euphorbij triplicatam continens, aliarum est ualentissima: cum illud (quemadmodum diximus) recens additur: quincuplam habens, inualidissima: quadruplam capiens, medio inter utrasque ordine consistit: at si unguenta proponis efficere, qualia à medicis ἀκονα nuncupantur, oleum ceræ quadruplum immiscebis. Si uerò, ut in fracturis, liquidum ceratum parare, duplum: quando cera & sicca & pinguitudinis expers fuerit, duplo etiam amplius: plerumque uerò sufficit unius partis dimidium duplo apponere, ut tota ceræ mensura duarum pondo partium & s. fiat. Atqui emplaston medicamen cupiens componere, oleum pari mensura ceræ miscebis, si quidem ambiens fuerit calore temperatus: si cera uetus & arida, & illud frigidum est, paulò amplius: sicut cum cera est pinguis, ambiens calidum, paulò minus. Id autem minus duodecima in utriusque mediij portio est: etenim & undecim, & tredecim nonnunquam olei uncias ceræ libræ temperaui, pro eius consistentiæ quantitate, tum aëris circumflui caloris frigorisq;: rarò autem paulò plus, uel minus: uerum ut deligari posset, pinguitudinem uiscositatemq; haberet, nec friabile esset, aut facile solueretur, aut à cute decideret, adiunxi resinam ei, potissimum, si aderat, terebinthinan ueram: sin minus, paratissimam ubiq; quam frictam & colophoniam appellant, eamq; pari cum cera pondere: conseruat enim medicamentis, quibus iniecta est, priorem consistentiam, ubi & ipsa mediocriter habeat: quippe notum est, ut in omnibus alijs, sic in resina quoque, maioris minorisq; rationem consistere. Itaque

si pinguior, liquidiorq; nonnunquam appareat, sciendum est, ceratum quod ex cera cum oleo liquata proueniet, liquidius multo quàm erat euasurum. Summatim, in uerorum uulneribus, cum interim ab exacta mediâq; medicamentorum emplasti modo confectorum substantia errauerit, ad molliorem potius tendere, etiam si inquinatum sit: simili ratione & quod substantia mediocri est. Pix autem cerati consistentiam seruat: optima uerò, sicut dictum est, in talem musturam pinguis conuenit, quæ admodum & resina. Si liquidam resinam iniicias, quali substantia est terebinthina, tertiam ipsius partem ceræ esse oportet. Atque ipsa terebinthina recens ueteri longe est liquidior. Cogitate igitur, quod de cera & resina audiuiistis, id in omnibus obseruandum esse: nec enim ex siccis, & aridis, uel tempore, uel ex primaria natura, uerum ex mediocribus consistentia, tantum cuiusq; miscendum est in medicamentorum compositione, quantum à me scriptum inueniatur. Fingamus iam, quod uim & substantiam prædicti medicamenti mediocre habeat, ceræ, resinæ frictæ, & olei pares portiones continere, ipsius euphorbij sextiam: ut singulorum sit libra, euphorbij uncia duæ. Quod si mollius reddere uoluerimus, octauam euphorbij partem iniicere sufficit, hoc est unciam s. in recente & calidissimo, uelut præcensui, euphorbio temperatiora hac definita: nam si uetustius sit, eoq; imbecillius, copiosius hoc aliorum portione esse debere, prius indicauimus. At si non resinam duntaxat, imò etiam picem iniicere est animus, selibram utriusq; miscebimus, ut modus ceræ sit æqualis: quanquam multo præstat me-

dica

dicamentum, si resinæ picisq; loco propolim ceræ præ  
adiungas. Quòd si ipsa pinguitudinem nou habeat, simi-  
liter resinis, si adhærēs pharmacum, ut fascijs ligari non  
opus sit, esse curemus, terebinthinam, uel laricem nomu-  
natam, uel etiam syncomisten pineam indemus: uoco syn-  
comisten, quam ex fodinis & figulinis accipiunt, ligna  
multa, ac lapidosa corpora in se habentem: quæ liquata,  
dum percolatur, pura tunc sicut colophonia & frictæ di-  
cta redditur: quin & resinas αὐτῶν τοῦ quasi spōte flu- De resinis.  
entes admiscere licet, nominant ipsas in Lacedæmone, ac  
plerisq; alijs regionibus τρωτῶν τοῦ: in Cilicia uerò  
nuncupant talem capnæleon, omnibus resinis tum liqui-  
diorem, tum calidiorem, tum substantia tenuiore prædi-  
tam: quare potentiae medicamenti, quod componis con-  
feret, tum maximè iniicienda, cum euphorbium roboris  
expers fuerit. Porro inter alias resinas odoratiores est, si-  
cut terebinthina, & abietina: ostendimus antea terebin-  
thina abietinam esse calidiore, hac strobilinam. Differt  
autem strobilinum physema, & pityinum, siccum, pin-  
guedinis expers, arescēs utrunq; celeriter, ut in pile con-  
tundatur, & cribro secernatur, quale ad propositi me-  
dicamenti compositionem neutiquam conuenit: usus ta-  
men sum frequentissime, cum euphorbium anniculum  
existeret. Porro dum componitur, olei, ceræ, resinæ fri-  
ctæ, singulorum pondo libram misceo, picis pinguis se-  
libram: & his liquefactis, euphorby pōdo uncias duas:  
si imbecillius sit, tres: si terebinthinam ceræ adijcere uo-  
les, unam: mediocrem pharmaci consistentiam facies,  
si cera terebinthinam liquidam & recentem triplo su-

peret: huius exiccate temporis spacio dimidium pondus oleo tribues. Totum autem ex tribus mixtum, oleo, inquam, cera & terebinthina, cum sit, libræ unius semissis, euphorbij anniculi unciam unam accipiet: si tale non extiterit, unam semissem: unde, sicut iam subinde dictitauimus, euphorbium pro temporis ratione augere nobis est integrum. Quinetiam si uulneri impositum phar-macum primo usu uidetur imbecillius, euphorbium oleo leuigatum, medicamuni emplastro, manibus antè subacto licet adnoscere: sic enim nobis facientibus, promptè unitatem accipit. Cæterum iuxta primam pharmaci compositionem satius est ceratum rasum seorsim ubi præparaueris ita leui facto euphorbio cū oleo adnoscere. Quippe ipsæ, quæ liquata sunt, ipsis superfusis in mortario, plerunque fiunt encerides, præsertim ambiente frigido. Aquam uerò ceræ liquefactæ cum resina cōmittere non est necessarium: sicut ego ab initio fecitabam, tantum ei temperans, quantum in ipsa coctione consumendum erat.

#### Medicamentum ex liquabilibus confectum.

**L**iquabilia uoco medicamenta, quæ ignis commercio colliguntur, tum quæ ex humidis quibusdam, uelut aqua, aceto, & uino constant: ex aceto itaque citra ignem liquefcit gutta ammoniaci, sagapeni liquor, & panacis, quem appellatione composita opopanaxem uocant. Igni uerò liquefcunt propolis, cera, resina, ladanum, seuum, galbanum, quæ in duplici uase colligare melius est. Nominamus autem sic, cum in cacabo, qui aquam calidam habeat (prunis enim incumbit) uas alterum consistit, præ-



ter liquabilia etiam galbanum continens. Habeto autem tale quoddam medicamentum saltem unum, etsi duo habere præstaret: inter quæ ualidius erit huiusmodi: Opopanax ex aceto dissolutum diutius conterito, postea liquefacto super igne propolim, galbanum, resinam terebinthinam misceto: singulorum itaque pars una esto, propoleos recentis pinguisq; sex: si uerò sicca uetusq; contigerit, præstat omnino ea non uti. At si aliam non habes, duas portiones, non unam miscebis: si absit propolis, eius loco picem pinguem, qualis est brusia, & quæ ex regionibus circa Pontum asportatur: pinguis simul & odorata, quam in nigrum amaracinum iniiciunt, quale prius totum conficiebatur: nunc etenim subalbidum amaracinum componunt: quo si careas, alia utitor, terebinthina, sicut prædiximus, duplicata. Ego nonnunquam uel solum medicamentum ex pingui pice confectum imposui, quo etiam ad canum morsus utimur: hoc namque solam picem pinguem ex aceto acri coctam huiusmodi symmetria continet: sextarium unum Romanum aceti, libram unam picis, opopanax trientem, quod est uncias tres. Hoc pharmacum ulcus ex rabiosi morfu cicatricem ducere non sinit, sed punctis in nervosa quadam particula idoneum est: quippe quod puncturæ oras conuiere nequaquam permittat. Quoniam uerò durum est, in duobus solum corporibus eo utemur, qualia sunt aurigarum, & messorum. Sin autem puero, uel muliere, uel molliore corpore puncto, hoc tantum quispiam uetustum præsens habeat, idem cum unguento aliquando discussorio, amaracino maxime & opobalsamo, colliquare licet, de-

inde cum irino & comageno : hæc si non adsint , leucino, susino, & cyprino : his quoque desideratis, oleo ueteri liquefaciat : & si in Alexandria degat , ricinino & raphanino : hæc siquidem copiosissima in illa ciuitate habentur , sicut etiam in uniuersa Aegypto . Atqui in illis regionibus sinapinū oleum haud facile reperiri potest : cuius & ipsius parte mixta pharmacum longè acerrimū fore , nemo ambigit : ut ad puncturas conuiuentes aperriendas conducat. Patere autē cuilibet arbitror ex prædictis, si loco opopanax sagapeno prius in pila ex aceto trito liquefactam resinam, propolim & adipē quampiam acriorem adicias, eiusdem generis medicamen futurum : alterum uerò mollius est genus pharmacorum liquabiliū, sed acetum non habet, quod propoli & seuis tantum præparatur, cera quoque propter spissitudinem adiecta, ex cuius mīstura pharmacum tactui blandius redditur. Adeps tenuium partium acrisq; esto, sicut leoninus & pardalinus, hyenæ & ursi. Sed de anserino quid attinet dicere , præsertim cum anseres rusticæ fuerint? Quin & tauri uetustus adeps & hircinus huc conuenit: nam mustæ naturæ tum facultatis adipēs temporis intervallo (quia terrestres acresq; sunt) in maiorem acrimoniam declinant, similiter uidelicet plurimis quæ uetustescunt : sic nanque & ipse porcīnus adeps omnium cum sit molliissimus, temporis processu acrimoniam acquirit. Idem uino, aceto, & melli accidit: in horum genere sunt etiam medullæ: longe uerò præstat ceruina, & uitulina: coagulum his acrius, & iam uehementioris pharmacorū generis propemodum existit. Itaque & huiusmodi alia  
quod

quod pharmacum habere uos consulo, ut cū à forti quodam medicamento supra modum morsam partem offendas, oleo prius eam sotam huiusmodi quodam contegamus: sic nanque placata rursus ad acrem curadi modum redire poteris. Ego itaque dum partem in neruo uulneratam quandoque soluissem, uulnus irritatum contemplantus, pharmaco liquido fortè fortuna præsenti, quod ex adipe constat, ad aures inscriptum, eoq; in uase duplici calfacto illeui, ac subito inde auxilium ægrotanti accedere percepi: quippe statim omnis dolor quieuit, ac deinde uulnus soluenti secundum naturam habere uisus est.

De pharmaco ex columbarum stercore  
confecto.

Columbarum in turribus rusticorum agentium ster-  
cus acre est, quo interim ruri usus sum in adulescen-  
te nerui uulnere affecto: atque hoc agricola cum uidisset, loci consideratione (erat enim non imprudens) iniu-  
tatus semper usurpat, & neruis uulneratis medetur. Por-  
rò compositio, tum usus idem omni medicamini ex eu-  
phorbio, & alijs qui similem confecturam habent: sed  
euphorbij loco stercore indito. Verum stercus hoc sub-  
tilitate euphorbio cedit, eoq; duris corporibus ex usu  
est. Temperaui aliquando ipsum metallicis simul, expe-  
riundi gratia, statim à principio cum eis terens ex aceto  
ad solem, sicut nuper docui, multoq; acrius medi-  
camentum euasit, quemadmodum & cum  
æru ginem uiuam ac-  
ceperit.

Aliud est

Actuario

De pharmaco ὁ βότανος, id est, ex herbis  
composito.

ὁ βότανος.

**I**n super ex subtilibus herbis ad nervos uulneratos me-  
dicamentum composui : initio quidem ex dictamno,  
amaraco & malo terræ, id est, aristolochia tantum, po-  
stea uerò ex alijs, mei ipsius periculum faciens, an rectè  
compositionem ipsorum coniectura assequerer : atque  
omnia, quò uolebam, perduxì. Idoneæ uerò ad id herbæ  
amaritudinem sine astrictione gustu referant, uel acro-  
rem, non tamen inmodicum : tales sunt prædi-  
ctas, maron, amaracum, polium, argemone, chamæpitys,  
centaurium, quæq; eius notæ in simplicium medicamen-  
torum doctrina commemoratæ sunt : quemadmodum et  
tiam radices omnium aristolochiarum, dracunculi, ficus  
agrestis, bryoniæ, althææ, iridis, acori, mei, asari, pbou,  
gentianæ, & panacis. Omnium siquidem id genus mate-  
riam in simplicium pharmacorum commentarijs expo-  
sui : at radices, herbasq; totas non modò intelligere oportet,  
sed etiam accuratè confusas tenuibus cribris secerne-  
re, imò etiam denuò exactè læuigare, ut arida collyria us-  
que in puluerem redigantur : nam crassa essentia nervos  
uulneratos nihil iuuat, qui subtilia, ut diximus, pharma-  
ca requirunt. Cæterum percolatum medicamen, læuiga-  
tumq; cerati modo excipiat, ea temperatura, quæ in eu-  
phorbio prius indicata est. Quantum enim in illo binuli  
euphorby, tantum ijs dictamni, mei, & acori iniiciendum  
est, tum quæ his simuliter calida gustu percipiuntur : quan-  
tum uerò illis trimuli, tantum ijs aristolochiæ, iridis, dra-  
cunculi, gentianæ, aliorumq; id genus, quæ perinde ac il

la ama

*la amara sunt, immitemus.*

De pharmacorum confecturis, quas Græci  
 πολυτελῆς, hoc est, sumptuosas vocāt, ad  
 neruos vulneratos.

**N**on abs re fuerit, etiam eiusmodi pharmaca cogno-  
 scere: usus enim ipsorum quandoq; sed rarius in-  
 cidit, quemadmodum simplicium frequenter. Vbi enim  
 quissiam pharmacorum medicorumq; studiosus, nō plu-  
 ra quingentis myriadibus haberet, nullo simplici puta-  
 bat uti: multò magis uel diues aliquis, uel monarcha,  
 odoratum simul & quod multa constet pecunia, uolet  
 habere pharmacum. Porro diuitis, quem citavi in primo  
 de pulsū prænotione, suppresso nomine memini, quem-  
 admodum & nunc: qualis autem erat, ex duabus ipsius  
 actionibus eiusmodi condisces. Vlcus famuli malignum  
 ipse sanare conabatur: ubi autem nihil promoueret, mu-  
 bi hominem tradidit: ac cum uideret curatum, medica-  
 menti scripturam postulabat, nesciens multas quidem ma-  
 lignorum ulcerum esse differentias, multas item medica-  
 mentorum, sed arbitratus unum pharmacum omnibus  
 posse mederi. Cum igitur qui offerebat, neque artificio-  
 se ipso uteretur, postquam audiuit, quibus constaret, es-  
 sentq; omnia uilis precij, hoc, inquit, mendicis serua, me  
 autem sumptuosius aliquod doceto: quinetiam puello diu  
 ex auribus laborante, ubi ipse multis, quibus usus erat  
 medicamentis citra methodū, nihil attulisset præsidij,  
 nobis illum quoq; curandum adduci præcipit: posteaq;  
 audiens ex quodam sibi obuito puerum sanatum, non po-  
 tuit

stulauit pharmaci scripturâ accipere. Hic igitur ipse contemptus, multis, quibus nerui uulnerati erant, digitos & abscissos, & putrefactos: quosdam uerò perijsse, uel mancos redditos: deinde intelligens nullum ex eis, qui à me curati essent, periclitatum, omnes uerò celeriter sanos euasisse, pharmacum cupiebat aliquod à me accipere odoratum simul & sumptuosum, quo neruorum uulnera posset sanare. Ego sanè multas iam sæpe tum familiaribus, tum amicis medicis scripturas iuxta prædictam methodum ex tempore compositas tradideram, ut experimentis compositionis ipsorum ratio confirmaretur: sumptuosum uerò, cuiusmodi ille uolebat, pauperculis hominibus nullum utiq; dedi, ratus melius esse remedia ex paratu facillimis componi. Cum igitur diues ille odori sumptuosiq; medicaminis compositionem aliquâ accipere petijsset, plures ei scripturas donaui prædicta methodo factas: quas cum experiri festinaret, tum liberis, tum seruis neruis uulneratos sibi conquirere iniunxit: medicamentis autem supra omnem spem operatis, primum sanè me laudauit, ut qui citra inuidiam scripturas ei communicauerim, postea etiam donis profectus est: etenim ad huiusmodi officia promptus erat. Porro medicaminum, quæ ei dederam, confectura est talis: Cinamomi, dictamni, mari, singulorum denarium pōdo quadraginta: hæc nanque odorata sunt, & subtilia: at amaracum quasi non boni odoris nequaquam mscere cogitauit: deinde quoniam Romæ ægrè poterat inueniri, sicut & marum, uidebam autem illum ægrè parabilibus gaudere, quemadmodum & sumptuosis, apposui scrip-  
pturæ

pluræ etiam illius pauxillum quiddam partis unius, ut puto, quartam uel quintam portiunculam: hæc contusa, cribroq; subtili secreta temperare iussi, cerato ex opobalsamo optimo, & cera tyrrhenica facto: temperatum uero esse coniecturaui, si ceræ partes octo, opobalsami decem receperit: at ne friabile medicamentum foret, sed si bi cohærens unitumq; , etiam resinæ terebinthinæ, quæ & ipsa odorata, modo sit optima, partem unam adieci. Verum si generosius, ut dixi, medicamentum facere proponas, non unam cuiusque herbæ commemoratæ partem immittas, sed amplius, ut una & semissis fiat. Hoc igitur ab experientia probatum est medicamen: alterum ex eodem cerato, & liquore ciryneo compositum, mistura proportionis euphorbij facta, tertiumq; aliud ex utrisque temperatis confectum: quartum deinde, quod staeten myrrham accepit: in quibus autem nervus nudus est, ibi ceratum ex cera, quæ uocatur *μυρτίκη*, & unguentis apud Romanos dictis spicato & phuliato compositum: duo decimam partem pompholygis ei admiscens, siue eloti masculino genere, siue elotæ foemino malis dicere: nihil enim, quomodocunque dicas, uel præsidij, uel nocu- menti pharmaco adferes: licet autem & ex tyrrhenica cera ipsum præparare: nec prohibet quicquã, sine prædictis unguentis tyrrhenicam ceram ex nardo usto lique facere, in duplici nêpe uasculo, quod in omnibus unguentis commune est: at raso cerato spicæ nardi, amoni, folij malabathri, & pōpholygis eloti pares singulorum portiones miscebis. Etenim in puncturis, sicut præceptum est, acriora pharmaca prosunt, quæ uulnus apertum per-  
seruent:



seruent: denudatis autem mediocri astrictione, cum dige-  
rendi uirtute absque morsu prædita offerre conuenit.  
Quanquam & anomum astrictiouis sit particeps, magis  
autem ipso nardi spica & malabathri folium.

# E quarto libro Galeni

## DE COMPOSITIONE MEDICAMENTORVM KATA GENH.



PRIMVS sanc liber in alborū  
emplastrorū confecturis, alysq;  
tum eorum quæ ulceribus cicatri-  
cem ægrè ducētibus conueniunt,  
finitus est: ubi distinximus com-  
muniter appellata dysepulota, id  
est cicatricem difficulter admit-  
tentia, ab ijs quæ propriè cacoethe, hoc est maligna di-  
cuntur, & ipsa nimirū dysepulota. Quoniam uerò quæ-  
dam saniei humorumq; ulceratis partibus influentiū ui-  
tio cicatricem ægrè admittunt, quædam ipsa affecta sede  
influentem succum quamlibet probum corrumpente, se-  
cūda ratione ulcera dysepulota & cacoethe propriè no-  
minant: in quibus interim totam partem affectam excin-  
dere, uel adurere nonnulli coguntur, aut medicamentis  
crustam inducentibus, aut igne utentes. At cum ampla sit  
latitudo utrinque in eo, quod alterum altero magis mi-  
nus ue

nusue dyssepulotum, malignumq; est, tantū medicantium  
pharmacorum esse numerum oportet, quantus ipsorum  
quoque ulcerū extiterit. Merito igitur omnes, qui unum  
duntaxat medicamentum ulceribus malignis cicatricem  
inducere promittens habet, successu crebro frustrantur.  
Nam duo (minimum) quæ idem pollicentur, eandemq; fa-  
cultatem ostendunt, diuersa alioqui inter se, non simpli-  
citer maioris minorisq; uerū ut apertissimè dicam, ma-  
ximi ac minimi ratione in promptu adesse illi conuenit,  
qui omnia id genus uitia curare proposuerit. Quemad-  
modum commentario Therapeutices in uniuersis affecti-  
bus primam omnium communem auxiliorum potentiam  
inueniri docebamus, dein materias, quibus illa cōtinetur:  
ita nunc etq; in ulceribus dyssepulotis generalem phar-  
macorum, quibus illa curabūtur, facultatem, quæ tandem  
sit, uel prius inuentam esse oportet. Indicata mihi est &  
hæc in illo opere, cum quidē nullus uitiosus habitus uul-  
neratas partes infestat, duos scopos habens: unum, ut id  
quod influit, repellat: alterum, ut quod affectæ parti in-  
hæret, infixumq; est, discutiat. Atq; hæc contrariæ uires  
præstant: siquidem influxum reprimunt, quæ sunt astringen-  
tia pharmaca: digerunt impacta iam exceptaq; tra-  
hendi potestate prædita. Porro quæ astringunt ut pluri-  
mum exasperat, atq; hac occasione molesta sunt. Trahen-  
tia uerò, ac digerentia ex alto humiditates, non citra acri-  
moniam id efficiunt. At acrimoniam dolor aliquis neces-  
sario sequitur, ulceratam partem erodens: atq; sic pro-  
pter dolorem, quam exasperantia erodiētiaq; concitant,  
humores ulceratis partibus influentes irritari contingit:  
unde

unde quoq; ulcus phlegmone obsideri exediq; . Ex quibus dictis colligitur , ulceribus dyssepulotis præsidia inueniri non posse, multò minus adhuc malignis . Quare talis pharmacorum materia , quoad eius fieri possit, inuenienda est, unde ulcus citra dolorem siccescat : quod accurate fieri nulla ratione licet , medico ignorante, quem affectum medicamen exhibitum ostenderit . Quippe ex ambobus compositum, erodente puta & astringente, necessariò ualidum existit . Verùm sordes & humiditatis copia id genus ulceribus incumbens, ueluti propugnacula quædam ulceratis particulis facta rosionem ualentibus pharmacis adimunt soluuntq; . Itaque attendendum est, quantum prius usus humiditatis in ulcere desiccauerit: uel si etiam sordes habeat, quantum inde absterferit . Ac ita secundum, tertiumq; uti illo debemus , donec purum & siccum ulcus apparuerit . Vbi uerò id tale conspexeris, ad aliud medicamentum te confers, eiusdem quidem speciei, sed priore imbecillius . Nam ualidiora, dum mordendo ulcus dolorem infrunt, fluores mouent, & phlegmonas concitant . Quòd si rursum aliquod multò imbecillius priore pharmacum adhibeas, ulcus humidum, sordidumq; euadet . Hac igitur parte artificio utens medicus , eo qui experimento innititur melior est , quòd sciat ulcus non alia medicamentorũ uirtute curari, quàm dum affecta pars eam siccitatem consequatur , quam in naturali statu sita possidebat . Quod factum intelligimus, ubi neque tenuis amplius sanies influat, neque pus producat . Hanc dispositionem ulcera nanciscuntur , quo dixi modo siccescentia, hoc est astricta , discussaq; : dein ubi sicca

sicca quidem fuerint, uerum sordida adhuc appareant, deterforijs pharmacis repurgantur, quæ & ipsa in opere de simplicibus medicamentis commemorauimus, in quo prius exercitatum esse conuenit, qui hinc omnino frugem reportaturus est. Hoc uobis amici, quibus ista scribuntur, constare manifestò admodum noui: itidem rationem sine operum exploratione probabilem non esse, dicta iam mihi demonstrant. Etenim uidistis subinde medicos quosdam, illis ipsis pharmacis sine uia ac ratione usos, nihil promouisse: me uerò multa eius generis ulcera persanasse. Quamobrem in memoriam reducite medicamenta citra demorsum exiccantia: qualia sunt per multa metallica. Atqui hoc etiam memuneritis, quod combustis elotisq; erosio, quæ prius absuit, edomatur ac interit. His igitur impræsentiarum uti uobis licet: elotis quidem in pueris, eunuchis, mulieribus, & qui molli natura carne sunt præditi: item qui ad sentiendum habiles admodum sunt, & uitioso succo laborant. In alijs corporibus etiam illa usurpare potueritis, mane primum ipsa partibus, quæ curantur, probè diffatis adhibentes. Si uerò corpus totum præparationem quandam requirat, & hanc prius factam esse oportuit, præcipimus de his in commentario de morbis curandis. Nonnullis siquidem uel purgatio sola sufficit, quibusdã sanguinis detractio, alijs utraque hæc adhibere profuerit. Sunt in quibus superiacentem uaricem excindere satis est: uel lieni, uel iocineri prospicere: aliquibus ambiètes ulcus partes præscindere: quemadmodum interim labrorum callos amputare. Si horum quid experiri oportet, humoris copia si-

Q

mul cum sordibus inspicienda est : atque ita ad idoneum medicamen ueniemus, rursus simplicium memores, quæ desiccant, non tamen ulceris sordes abstergunt: item quæ abstergunt quidem, non tamen probè desiccant. Porro quæ utrunque possunt efficere, prospiciemus ex quoto quodq; ordine existat, quod maximum inter ea censeo, quæ ad curationem pertinent, neglectum tamen medicinalis materiæ scriptoribus. Nam hi solas uniuersales ipsius uires dicere studuerunt: sicut etiam Dioscorides, quem nulli eorum qui in eadem quasi arena defudarunt, secundum esse quisquam dixerit. Ego igitur deinceps omnia pharmaca recensebo, quæ ulcera citra demorsum & manifestum exasperationem exiccare possunt. Incipiam à metallicis, quibus etiam terræ species adnumerantur. Porro cum uariè inter se differant, in eo quod magis minusq; siccant, à medijs orsus ad uehementia, uel obscurius exiccantia me conferam. Siccant igitur modicè lemmia sſbragis, & cadmia, præsertim quæ sua sponte nascitur, præter quod in torrentibus aut riuis quæritur, ac in Cypriorum montibus, alijsq; locis inuenitur, maximè ubi metalla sunt. Consueui eam magis siccantem reddere per æstatem in sole, pluribus deinceps diebus terens ex aceto, aut uino colore giluo, substantia pellucido. Cuiusmodi est in Italia Falernum, in Asia Tmolites, quod multo maximè siccare natum est. Hoc genere comprehenditur & Ariusium in Chio natum: item odoratū Lesbium in Eressso & Mithymna. His succedunt omnia uetera, cum ex albis & astringētibus inueterata sunt. In Italia Signinum, Tiburtinum, & Marsum: in Sicilia uocatū

catum ab incolis Aminæum : in Asia Aphrodisæum, & Misyum. Sufficit enim mihi horum facultates uniuersales ueluti exempla exposuisse. Iam uerò cadmiæ ex aceto acri, similiter multis per æstatem diebus in sole præparo, siccatamq; repono, ut ulceribus malignitatem assumentibus inspergi possit. Valentius hoc phar-  
macum est, chalcitis combusta eodem modo prius in puluerem redacta : post hanc ignem non experta tam ualens medicamentum est, ut crustas faciat. Lotam igitur ipsam, deinde tursam habere satius est. Minus enim lota, quam uista desiccatur, tum longè melior est, minusq; mordax. Per-  
simile medicamentum est etiam ærugo cõbusta, quæ igne non experta est, fortissimum medicamen est, sicut chalcitis. Verùm hæc nonnihil etiam astringit, & ea multo magis chalcanthum, quod inter metallica maxime siccatur. At ærugo huius potentie omnino particeps non est. Misy autem & fori chalcitidi genere cognata sunt, ex una, ut dicam, radice producta: tenuius tamen misy apparet, tum nunus mordax & urens : crassius fori est, & utrisque siccatur imbecillius: quænamadmodum & sibi maiorem astringendi siccandiq; uim ac fori possidet. Porro diphryges appellatum pharmacum, ulceribus ægrè humiditatis uitio ad cicatricem uenientibus aptissimum est: ualide namque siccatur, etsi modicè mordax. Ad hæc, præter acrem tum qualitatem, tum potentiam, uim habet astrictoriam: quas tamen utraq; fortiores & chalcitis cruda, & chalcanthum repræsentat: siue id masculino genere, siue fœminino, siue neutro appellasse quis maluit. Nam hoc uobis interim succurrat, de nominibus contendendum non esse,

ubi speculationem ipsius artis usui necessariam ediscere statueritis. Porro alumen quodlibet ulcera satis exiccat, generose astringit: unde nemo solis his ad ulcera utatur, sicut nec cruda chalcitide, & ærugine: usta uerò & hæc & musy utilia sunt, ut clota morsum quidem remittunt, uerum minus siccant. Itaque lotis uti tutius est: quoniam permulta corpora, quibus mederi cogimur, unam quandam dispositionem habent, qua uehementem comorsum ferendo non sunt. Audiuiſtis hæc frequenter, & nunc iterum commetationis gratia in toto subsequenti sermone repetere conabor. Quæ igitur plethora uitiōſoq; succo laborant corpora, ad hæc quæ tenera carne prædita, & ad sentiendum insigniter habilia sunt, facile ex morsu, seu rosione phlegmonem recipiunt. In horum numero continetur mulieres uidelicet candidæ, pueri, eunuchi, uiri cute alba: insuper qui regionem frigidam incolunt, humidi hi quoque & pituitosi, eoq; molles & albi: quemadmodum ij, qui calidum tractum inhabitant, ut Aegyptum & Arabiam, duros corporum habitus, & siccos sortiuntur. Itaque hæc ueluti in mentem reuocando, appositurus sum & aliã pharmacorum simplicium materiem, quæ malignis ulceribus curandis sit idonea. Sarcocolla igitur & ichthyocolla, his magis ad huc chrysocolla tali facultate prædita est. Huc optimè facit & plumbum combustum: post hoc fori, stibiq; eaq; combusta: insuper plumbi recrementum, Græci *σκαρπία* *μολύβδου* uocant, probè siccatur: quemadmodum & ferri squama, euidentius tamen stomomatis. Porro æris squama, præter quòd siccatur, etiam abstergit purgatq;.

Unde  
pura



pura quoque ulcera efficit, quod reliquæ squamæ non possunt. Quare si hæc omnia medicamenta arida ulceribus malignis ac contumacibus inspergis, mirificè uidebis citra erosionem ea desiccari sicut ubi buccinorum testas concrematas, purpurarum, ostrcorum, aliorumq; id genus adhibueris. Quin & lapis specularis, græce *σφαγις*, Romanis olim specularium dictus, ex ijs est quæ leniter ac sine morfu exiccant: qui ustus ulceribus dysepulotis, non item malignis ac rebellibus conducit: quippe minus exiccat, quàm illa requirunt. Idem potest uistrum ustum, ac ignitum illud quod in uasis æreis calefacturijs adhæret. Cæterum ægyptiæ spinæ fructus, galla omphacitis, hoc est, immatura, rheon, malicorium, tum radices, tum herbæ non paucae ultra siccandi etiam astringendi potestatem habent: nam & malum terræ, iris, achorū, arthemisia, panacis radix, argemone, chamaeleontis nigri radix, ciperum, dracunculus, & gladiolus affatim exiccant. His euidentius adhuc centaurium, & posilium: quibus paulò imbecillior est terra nomine erythrias, uti ualentior est ampelitis. Talis sanè medicamentorum simplicium ad ulcera maligna ac contumacia materies existit: extrinsecus autem nonnulla ipsis apponuntur, quæ quidem per se uehementis potentiae gratia non admoueri, sed alijs temperari solent, ueluti ærugo ignem nondū experta, calx uiua, & illota, & molle aphronitrum, quod reuera aphronitrum est. Quanto enim spumantius, tanto præstantius est utraq; facultate, tum quòd minus mordet, tum quòd magis digerit. Didicistis enim in opere de simplici medicina, subtiliora crassioribus

hac uirtute inter omnia, quæ simili specie comprehenduntur, præcellere. Porro nihil tam nobis cuitādū est, quam pharmaca generis oleosi, quæ Hippocrates μαλακωδῆς, id est mollia nominat: cuiusmodi sunt omnes adipēs, præsertim porcorum, dein resina, postea cera: alia uerò ratione & quæ indurata remolliunt, μαλακτικῆς dicuntur, non conueniunt, galbanum, bdellium, gutta ammoniaci, styrax, medullæ. Item alio modo acria, piper, zingiber, sinapi, canchri, multaq; eius generis alia.

Quomodo medicamētis siccis modò commemoratis, in vlceribus ad cicatricem ægrè venientibus & malignis, vtendum sit.

**H**uiusmodi ulcera uitioso plena humore necessario existunt: pleraq; uerò ipsorum etiam sordes copiosas sustinēt. Quoniam ergo siccum aliquod pharmacum ipsis sumus inspersuri, conuenit prius ea linteolo molli, puro & sicco exprimere: ubi ulceris cauitatem medicamento impleueris, platysma labris attenuandis accommodatum extrinsecus superdandum est: hinc rursus limanentum undique æquale foris inuiciendum, cui spongiam, ex aqua aut uino imctam applicabimus. At permultum refferre existimabis, ut spongia frigida maneat: quod ex facili fiet, si frigida continuè citra deligaturæ solutionem foueas: sed hanc ei imponere, ac circumdare debes, ut Hippocrates in commentario de fracturis edocuit, maximam offēsam fore ratus ex deligatura, quæ ad elegantē formam, non usum conducit. Si igitur fasciā una fuerit,

sua sum

*fursum tendet, siue sura, siue genu, siue talus, siue cubitus, siue manus summa, siue alia quæuis pars laborauerit. Quòd si duabus uti uelis, ut in fracturis, altera à parte affecta fursum feretur, altera deorsum prius, mox in superiore parte desinet, dum ipsa priori coniungatur. Quamobrem hasce fascias ex linteis, non laceros panniculos esse, ut omnes nouistis, expedit. Tertio quoq; die, non singulis soluendum membrum est, sic ut aqua non adhibita, quo dixi modo nuper, molli, puro, & sicco linteo saniem ulceri abstergas. At si ambientes ulcus partes phlegmonodes quippiam representent, humidum medicamen latum extrinsecus platysmati superaccommodandum est ex meo phœnicino, non simpliciter liquefacto, sed cui plurimum uini astringentis adiectum sit: non tamen cum refrigerante oleo liquare ipsum conuenit: uerùm si rubor quispiam, uel omnino calor in circumpositis ulceri partibus exuperet, astringente, & refrigerante id faciendum est. Sunt huiusmodi, myrteum & melinum: si hæc non adsint, adhibeto quod omphacinum, & omotribes nomenat. Si durities maior extiterit, oleo uetcri, uel ricinino ipsum phœnicinum liquefacies. Sed tutius fuerit, si nihil in ambiente ulcus loco uitiosi appareat, superpositæ regioni liquidum medicamentum ad mouere, quod repellat, si quid prius uel prauum, uel plus quam par est, insuat: maxime cum in crure ulcus obortum superpositam uenam uaricosam habeat: quæ dum magna est, ac colore nec rubrum, nec probum sanguinem, sed atrio rem, magisq; melancholicum continere uidetur, excitanda uenit. Interim uerò contigit, ut ue-*

na tali excisa ulcus statim ad cicatricem ueniret, etsi iam annum durarat: uerum ipsius loco iuxta diuisionem, ubi erat excisa, ulcus malignum ac contumax oriretur, cui cicatrix induci non potuerit. Igitur in id genus uitij præstat, uiribus ægri consultis, à uenæ incisione auspiciari: deinde pharmaco purgare melancholicum humorem, & cum hoc etiam pituitosum educente: quoniam is quoque una nonnunquam cum melancholico influit, dum uarices generantur. Postea ipsam uenam ulceri suprapositam in longum scarificare commodum est: ubi abundè uacuaris, ei ipsi uenæ sectæ prius medendum: postquam exactè iam cicatricem ducere uidetur, tunc maligni ulceris curationem, ut prædictum est, aggredere. Iam uerò lien interdum malè affectus uitiosi talis humoris auctor est, sicut & iecur: quibus antea prouisis, sic tandem ad ulcus curandum uenire oportet. Pari modo si uniuersum corpus cachochymum, uel plethoricum existat, prius expurgare uacuareq; expedit, quàm medicamentum ulceri admoueas. Porro intra ulceris per arida medicamenta curationem, quotiescunq; solueris, aduertendum est, qualèmnam in particula effectum ediderint: sciendumque, ac in memoria habendum, nonnulla desiccare, non autem detergere, cuiusmodi sunt illa, quæ astringendi qualitatem obtinent, ulcus purum non efficiunt. At quæ præterquam quòd siccant, adhuc etiam detergunt, ea non modò siccam, sed puram quoque totam partem exulceratam efficiunt. Præterea notandum uenit, pura ulcera ab ijs medicamentis, unde prius cum essent sordida nihil rosionis percipiebant, nunc erodi,

di, morderiq; . Quæ causa est, ut à ualentioribus absterforijs pharmacis ad mitiora lenioraq; digrediamur, ubi ulcus adanußim purum inuenerimus. Quemadmodum rursus in sordidis ad magis abstergentia transimus, nisi ex rosione sordida apparuerint. Hoc siquidem medicis etiam bonis existimatis nonnunquam imposuit, ut ad absterforium ualentius acriusq; se conferrent: unde iterum ulcus erosum, ex æquo sordidum, uel etiã magis adhuc, altera solutione uisum fuerit, carne quæ id foedat à medicamento colliquata: nam ita in prauam saniem degenerat. Cæterum quicquid in his ipsis tenuioris substantiæ est, à pharmaco diffatur, reliquum ibidem ulceribus infixum sordes ipsis redditur. Quare animum attendere oportet, utrum ulcus carne quæ subest exesa ac colliquescente sordidum euaserit, an quia medicamen sordidis auferendis aptum requirat, impositum uero tale non sit. Quod indicat ulceris maior facta cavitatis, tum oræ rubentiores calidioresq; cum medicamento acrimonia abstergentur. For san igitur superuacaneum fuerit, in præsentis commentario compositorum medicaminum usus, ratione, modumq; adscribere: quippe in methodo curandi explicatū. Quæ uerò necessaria sunt, & magnam noxam adferunt neglecta, satius est bis tære, ut fidelius memoriæ inhereant, eadem repetere. Ponamus igitur & hoc in talium ulcerum curatione, si quidem citra totius corporis offensam fieri poterit, ægrum à balneo abstinere, perfricari linteis largiter, mox oleo, deinde serulis exerceri, si crus fuerit affectū: uel cursu, si partes superiores malè habeant. Quod si à balneo temperare sine totius corporis noxa non po-

terit, soluere deligaturam non oportet: uerum ut ligatum est membrum lauare, & aquam calidam ex spongia exprimere, aliamq; mox frigidam infundere, ut nullus in deligatura calor sit reliquus. Iam si curatio succedere uideatur, etiam absque spongia alligata sanari potest, si phoenicinum liquefactum, ut dixi, extrinsecus imponas, uel citra spongiam, quæ fasciis comprehensa uelut in fracturis, ægrotæ corporis parti orbiculatim circumdatur.

#### Compositio emplastrodis medicamenti.

**Q**uoniam malignorū, & difficulter cicatricem recipientium ulcerum curationis summus est scopus, ut medicamentum citra morsum exiccet: aqua uerò & oleum maxime omnium humectent, ab eis abstinendum est ita, ut nec per se adhibeantur, nec alijs siccis temperentur. At cera deligenda est, neq; natura, neq; uetustate sicca, uerum recens & pinguis: quam in sole emollitam aridis medicaminibus dictis, quibuscumq; uoles, excipere licebit: sin autem sol absit, apud ignem calefacta subigatur, & in calidam aquam demergatur. Non enim aqua per tota muscetur, sed statim ab ea emollescente destitit, antequam ulceri fuerit imposita. Symmetria uerò mordicationis est talis.

Mediocre medicamentū hoc modo efficitur.

Quarta pars metallicorum ceræ adijcitur: ualentius erit, si tertia sumatur. Porro cum ipsa metallica nunus magisq; lenia siccaq; existant, uirtus in ijs que magis siccant, intendetur: quæ minus, remittetur: quemadmodum  
rursus

rursus tutior leniorum usus est, mordaciorum periculoserior. Dictum nanque frequenter est, nonnullas naturas corporum, tum cutem, tum carnes magis sensorias habere, quibusdam has minus esse sensiles. Item pro maioris minorisq; sensus ratione doloris etiam affectus sequitur, ut & phlegmones. Accedit huc non mediocris differentia, quod quis molli sit carne, uel duriore, boni maliq; succi, uel plethoricus, uel uacuius, uel medio quodam modo inter enumeratos affectus: unde colligo, unum omnibus medicamentum præparari non posse: sed quaecunque ex simulibus specie cōfectum fuerit, hoc uti sciet ille, qui methodum isto libro traditam artificiose didicerit. Exempli gratia in subiecta materie: si pares utriusque, æruginis & æris combusti partes misceas, aluminis scissi partis unius dimidium, ut totum tribus uel duobus denarijs s, uel uncijs totidem constet, sufficiet ceræ denarios adijcere denarijs: decem uerò uncias uncijs, in temperati & medij facultate pharmaci compositionem: melius fiet, minusque mordebit, si loco aluminis scissilis diphryges accipiat: cuius uno denario integro iniecto, erit præstantius: & si æruginem mordacius facturam suspicati, lene prorsus ipsum fieri postulemus, combustam apponimus. Insuper si expurgare sordes statuerimus, æris squamæ denarij dimidium addetur, ut tota medicamenti temperatura talis euadat: æris, æruginis ustæ, diphrygis, singulorum partes æquales, hoc est, cuiusque denarij pondo unius, æris squamæ denarij dimidiū. Hæc pingui cera, ut dixi, excipiantur: ubi sicciior paulò fuerit, quam ut cōmemorata excipiat, temperan



perandum est oleum myrteum quo mollescat, uel melissum, uel lentiscinum, uel ricininum, uel cyprinum, uel omotribes uetus, uel recēs hispanum, uel quod apud nos ex oleæ surculis conficitur. Aut si omnino nihil oleosum medicamento adhibere placet, laricem resinam admisce-  
to: cuius si copia non est, terebinthinam in locum resti-  
tuito. Cæterum hoc semper in memoria tenendum est ijs,  
qui hæc legunt, maxime ad primum nuper dictum, tan-  
quam præstantissimum ueniendum esse, mox ad secun-  
dum & tertium, deinde ad alia, ceu pro pharmacorum  
uirtutis, & potentiae portione, sermonis ordinem nobis  
usurpantibus.

Quæ medicamenta Crito scripserit. Medica-  
mentum  $\sigma\lambda\gamma\lambda\alpha\delta\alpha\upsilon\tau\upsilon$ , hoc est, ex Ladano.

**O**ptimum medicamen epuloticum, quod  $\sigma\lambda\gamma\lambda\alpha\delta\alpha\upsilon\tau\upsilon$   
inscribitur: conuenit prætumidis ulceribus, & ca-  
uis: deligatum uerò membrum in diem quartum conti-  
nendum est: Picis aridæ denarium pondo centum, æru-  
ginis rasæ denarium pondo uiginti quatuor, æris com-  
busti denarium pondo quindecim, squamæ rubræ dena-  
rium pondo uiginti quatuor, ladani pōdo uncias nouem,  
argenteæ spumæ pondo libras tres, olei sextarium s, ui-  
ni optimi sextarium unum s. Hoc emplastrum præpara-

Quæ uocet ui & ego, materia, quæ nullum  $\mu\alpha\lambda\theta\alpha\kappa\omega\delta\iota$ , hoc est, mol-  
 $\mu\alpha\lambda\theta\alpha\kappa\omega\delta\iota$ . le pharmacum contineret. Sic enim uocat Hippocrates  
omne genus medicaminum, quæ connatam humiditatem  
habent, qualis in pingui est, singulisq; olcosis medicamen-  
tis, & quidem in ipso oleo & aqua. Quin & resina, ce-  
raq;

raq; molle quippiam occupant. In medio ipsorum, dico autem siccorum temperamento & mollium, pix consistit: eoq; ambobus generibus citra offensam admiscetur, quemadmodum tum argenti spuma, tum arida phar maca, quæ circa mediam materiæ uersantur, etiamsi non nihil ad utrumuis excessum interim declinent. Hoc genere comprehenditur pix quoque, secundum siccitatis ac humiditatis oppositionem manifestò iam à medijs recedens, secundum alteram oppositionem calefacientium & refrigerantium non item: calefacit enim modicè, atque ideo medicamentis quæ pus mouent, admiscetur. Quamobrem in proposito medicamine arida pix medijs attribuitur, atque hac magis argenti spuma, tum alia quæ sic candi uim obtinent.

#### De indicationibus ad vlcera curanda.

Osten sum est in medendi methodo, præsidia ex indicatione ab ipsis affectibus contrariæ illis temperaturæ inueniri: item à tota animantis cuiusque figura, tum à singularum rursus partium propria & simili: unde si ulcus simplex, cauum habeat quis, ab ipsis generalibus, sed quæ non mediocrem differentiam in particularium speciebus habent, curatio sumetur: atque ob id demonstrauimus ulcerum omnino simulum quædam à medicamentis, quæ ad plenum siccent, persanari, puta, radice panacis, aristolochia, acoro, iride: nonnulla à solo thure, licet hoc carnem non inducat, sed illas naturas ad suppurationem perducatur, quas aristolochia carne replet. Sicut autè in corporibus curandis differètia particularis per magna

magna est, ita quoque in ulceribus : nam cauum & purum ulcus à mediocriter siccantibus curatur : sordidum uerò, & malignum, & oris prætumidis quidem, sed carne cutis fluida, ualidissimè siccantia requirit . In his igitur ulceribus , quoniam de ipsis uerba facimus , thus est imbecillum medicamen , ut ne pus quidem concoquere, uel mouere possit : argenti spuma hoc est ualidius , sed medijs tamen & ipsum inferius . At pix arida mediorum gregi annumeratur : quemadmodum hanc superat exiccando æs combustum, chrysocola, & diphryges . Euidenter siccant & chalcitis combusta, ærugo, musy, & æris squama : atque alio modo acerba, quæ Græci σφουρι vocant, galla omphacitis, malicorium, alumen . Exedunt autem non uista, chalcitis, ærugo, musy, & calx . Quæ iam fortissimas facultates habet , in omnibus corporibus eandem actionem ostendere uidentur . Imbecillia manifestam differentiam indicant : insuper si mentem adhibeas , neque minus in ualentibus pharmacis magnum actionis discrimen deprehendes, quàm in mollibus & duris corporibus obeunt . Etenim mollia citius accendunt, uehementius molestant, & maiores phlegmonas concitant .

E se

## E sexto libro Caleni

## DE COMPOSITIONE

## MEDICAMENTORVM

## KATA GENH.

QVINTVS enim quòd particu-  
laria solum tractet omissus est.



VPERIORE commentario  
emplastra dicta Græcè *πολύχρη-  
στα*, quòd multis conueniant affe-  
ctibus, distinguentes, ea potissi-  
mum collegimus, quæ præter al-  
lia ipsorum pollicita etiam ulce-  
ribus ægrè ad sanitatem perue-  
nientibus mederi queant: in præsentia uerò ad aliud em-  
plastrorum genus *πολύχρηστον* digrediar, quæ tum ad al-  
lia multa singulatim faciunt, tum ad particulas putrescen-  
tes, aliter affectas, quàm ulcera propriè *δυσθιράπνευτα* à  
curatione difficili nuncupata. Etenim illas putrilago de-  
pascitur, eoq; turba medicorum hos affectus *νομας* ap-  
pellat: illi uerò uno loco sine putrilagine circumscripta  
sunt, ut *σφηγεδενæ* dictæ, iucina quidem depascunt,  
non tamen ea putrefaciunt, febresq; inferunt, quòd ijs  
quæ depastionem cum putrilagine sustinet accidere con-  
suevit. Summa curationis erat in prædicto ulcerum ægrè  
curabilium genere (*chironia* quoque uocant) medicamen-  
ta inuenire, quatenus licet rofionis expertia, ualide autè  
exiccan

exiccantia . Porro hæc quæ nunc scribentur omnia, mor-  
dacia sunt, si quis ipsis solis , non cerato temperatis uta-  
tur . Quæ cerato muscentur, purgare quidem ulcus sordi-  
dum & carne replere possunt, atq; etiam duriliem quan-  
dam & tensionem discutere, non autem difficilia curare.  
Indicant ipsorum uirtutem affectus, quibus bene adhibe-  
ri credita sunt . Quod iam superius admonui, & nunc di-  
cturus sum : meminisse uidelicet oportere illorum quæ  
in opere de simplicibus medicamentis prodita sunt . In  
cuius primo libro methodum seu rationem exposui, qua  
medicaminum facultates inueniantur : tum pluribus ex-  
emplis eius exercitationem proposui : in sequentibus sin-  
gulorum nominatim mentionem feci . Nam illorum me-  
mor, ex facili rationem eorum qui hæc pharmaca à no-  
bis modò proposita composuerunt, assequeris, & uide-  
licet ipse alia conficies, quocunque tempore prius exper-  
torum inopia laboraueris : multa siquidem huiusmodi  
non paucis contingunt in itinere, cum alio, tum maxime  
nauali . Quandoquidem etiã in patria quidam manentes,  
pharmacorum structuram, unde ægros curabant, amise-  
runt, ut præ tristitia ipsi tabefacti, perierint . Optimum  
igitur medicamenta iam explorata secūdum dictam me-  
thodum usurpare : sin autem, ut dixi, nonnunquam hæc  
desideremus, habitum talem nos habere, quo similia iam  
abundè compertis, possimus componere : quemadmodum  
me sæpe agentem & in itinere & alibi uidistis . Nonnul-  
la siquidem quæ proprio Marte in huiusmodi temporum  
occasionibus condidi, postquam experiētia probassem,  
nihilò peiora uel celebratissimis apparuerunt . Nam pri-  
mum

mum ipsorum compositionem ex coniectura artificiali molimur: postea uerò cum nonnulla post experimentum probatissima uisa fuerint, nonnulla à scopo absint, denuò rursus corrigimus, & tertio nonnunquam ad perfectiorem eius quod præstare uolumus, ipsa redigimus: at si ne methodo, & in prioribus, & in Therapeutices libris exposita uti prædictis rectè nemo potest: tantum abest ut similia ipsis conficiat.

Emplastra ad digerendum & extrahendum,  
quæ Græcè *ὑποφωρῆται* & *ὑποκαταίεται*  
nominantur.

**Q**ui compositorum medicaminum uirtutes descripserunt, emplastra quædam ab extrahendo *ὑποκαταίεται*, sicut alia à discutiendo *ὑποφωρῆται* nominarunt: alijs utranque extrahendi, & digerendi facultatem adesse testati sunt. Etenim uicinæ sibi uirtutes sunt, eorum quæ in alto latent, attractrix, & attractorum digestrix. Nam quæ trahunt etiam nonnihil planè discutiunt: & quæ discutiunt, pariter trahunt: Verùm in digerentibus medicamentis discussoria uirtus, in trahentibus attractrix præpollet. Constant itaque attractrices simplicibus pharmacis, quæ humorum superfluitates in cutem extimam possumus extrahere. Discussoriæ ex his conflantur, quæ attractum possunt digerere. Vt autem emplastrum fiat, quemadmodum suprâ dictum est, huic argenti spuma, illi resina, alij cera, alij oleum, reliquo pix temperatur. quæ nec insignem digerendi potentiam, nec extrahendi continent, sicut uel propolis, uel calx, uel medulla, uel

galbanum, uel asiae petrae flos, uel spuma nitri, uel aphro-  
nitrum, uel acetum, uel lixiua stacte, piper, sinapi &  
struthium, salesq; tum qui edi possunt, tum ammoniaci.  
Ad haec pleraq; alia, de quorum facultate in commenta-  
rio simplicium dictum est. Nunc autem emplastra, quae  
iam experimēto satis probata sunt, exequar: tantum ad-  
huc ipsis adiiciens, quod nonnulli etiā astringentia phar-  
maca extrahentibus miscuerunt, ueriti quod accidit, ubi  
humorum superfluitas fuerit: trahunt siquidem plus in-  
terim ac conuenit, ut non solum ex particula quae cura-  
tur, attractionem in alto, sed etiā ex omnibus uicinis mo-  
liantur. Comprehensum est & antea, cum de sarcoticis  
ageremus, extrahentia & digerentia, uelut omnia quae  
magis quam oportet detergunt, sarcotica fieri cerati mi-  
stura. In quibus uirtus quidem ualida, copiosioris: in  
quibus imbecilla, paucioris. Quod si uerò compositum  
extrahendi uel digerendi medicamentū, astringens quo-  
que aliquid habeat, tali pharmaco ad carnem genera-  
dam, propter uim astrictoriam utendum non est, quae ad  
uulnera glutinanda & sinus, tum ad ulcerum cicatricem  
ducendam utilis est, ad carnis productionē non ita. Di-  
ctum mihi est abunde iam de hoc.

Hæc in Aegyp̃tia Andromachi scribit  
Galenus libro sexto.

**S**Vbinde audiui medicamenta, quae simul cum dige-  
rentibus etiam astringentia capiunt, tutiora fieri:  
quae uerò sine astringentibus digerant, efficaciora qui-  
dem, sed uon perinde tuta: sæpe enim fluxiones attra-  
hunt, dū corpus quod curatur, plethoricū est, uel prauo  
succo



*succo obnoxium . Si autem uacuum corpus esset , ac su-  
perfluitatibus liberum , prōptius medicamenta , quæ dis-  
cutiuntur , sola sine astringentibus assumpta , ad finem  
peruenirēt . At cum pauca id genus corpora quibus me-  
dicamenta offeruntur , reperiās : securius esse uidetur ,  
miscere etiam nonnulla repellentia . Ita sane & emplaz-  
stro digerenti , quod ex sale conficitur , quidam adiece-  
runt chalcanti paululum , quamuis sal ipse astringens  
quippiam possideat .*

# E septimo libro Galeni

## DE COMPOSITIONE

### MEDICAMENTORVM

#### KATA GENH.



**M**ALAGMAT A uocant me-  
dici , quæ partes supra naturam  
induratas emolliunt , calido o-  
mnia tēperamēto mediocri præ-  
dita , non tamē exiccantia , quem-  
admodum nec manifestò hume-  
ctantia . Nam cum exactè mala-

ctica medium quendam ordinem inter humectantia sic-  
cantiaq; sortiantur , indurescentium substantiæ ueluti fu-  
sionem quandam moliuntur . Nominantur autem mala-  
ctica , licet in alijs paululum ad siccandi humectandiq;  
uirtutem inclinent , si modò subiectam partium , quas con-

tingunt, substantiam queant diffundere: quod nimirum propter moderatum in eis calorem accidit. Ac quòd, ubi durities diffusa discussaq; fuerit, digerentium medicamentorum usus ueniat, in tertio de simplici medicina, tum in decimoquarto Therapeutices libro comprehensum est. Indurescentia igitur, quæ ex methodica, seu rationali arte non curata scirrum contrahunt, optimè curabuntur, si medicus spectet, quàm ægri corporis substantia à mediocri humiditate ac siccitate recesserit, quæ admodum si affectus ipsius incrementum inspiciat: præterea consideret, inter ipsa pharmaca alia magis, alia minus emollire: Huc nanque spectanti primus usus emollientis medicamunis, coniecturalis quidẽ erit, sed cum artificio. At post unum aut alterũ diem siue intendere medicamenti uirtutẽ, siue remittere conueniat intelliges, ut in prioribus & medendi methodo dictum est. Quapropter medici digerẽtia pharmaca cõposuerũt, ceu scopos ambos sibi proponẽtes, tum ut partis duritiem, quæ iam in scirrum degenerat, diffunderent: tum ut per halitum digererent, non uicissim utroque utentes, quemadmodum me frequenter facere conspexistis: uerum duo ipsa composito medicamune molientes. Notum est omnibus, in mustura uel emollientia, uel digerẽtia esse copiosiora, tum maioris minorisq; rationẽ in ipsis esse nõ exiguam. Cæterum constat subinde uaria facultatibus nasceri: ac necesse est, sicut in alijs medicamentis, ita in his, si probè mederi cupias, plura eiusdem generis pharmaca, uel certe duo temperari, ualidissimum puta totius generis & moderatissimum, ut ex ipsorum mustura conuenienti mal

ta quæ

ta quæ intra summa contineantur medicamina efficias. Non enim pingue eandem uirtutem obtinet quam bdelium, styrax, & gutta ammoniaci: quemadmodum nec inter ipsos adipēs anserinus, & gallinaceus, uel pardi, uel leoninus, uel hyenæ, uel alterius cuiusdam animalis: Nam secundum animalis temperamentum etiam adeps calidiorum magis excalfacit, sicciorum uerò euidentius siccatur. Ac uulgus medicorum nouit leoninum adipem in utroque, calfaciendo dico & digerendo, longè esse ualentissimum. Proximum locum habet pardi adeps, ut qui modicè emolliat: pari spatio ab hoc recedit adeps gallinaceus. Hi igitur omnes tenuiorum partium substantiam inter quadrupeda animantia occupant. At differentia prorsus permagna in illis est, cum suillus quidem mollissimus ac humidissimus, eoq; aliorum imbecillimus sit, ut teneris corporibus conueniat, cuiusmodi habent mulieres, pueri, eunuchi, & uiri delicatiores, in umbra, ocio, & frequentibus potabilis aquæ balneis effœminati. Caprarum uerò & bouum pingue quāto suillo est ualidius, tanto magis corporibus & naturæ durioribus, & inter duriora scirro opportunioribus conuenit: taurorum hircorumq; in ualidioribus, tum corporibus, tum affectibus proficit. Eadē uerò & alijs in minoris maiorisq; ratione inter se est differentia. Porro ab imbecillioribus auspicabor, si prius de duritie, ac scirri affectu quædam præliba uero: nam cum phlegmone laborantibus & indurescentibus commune sit, digitus prementibus reniti, distinguuntur affectus, doloris sensu & indolentia: hæc enim nondum utrisque communia sunt. Quemadmodum

uerò in alijs omnibus, quæ sibi mutuo possunt accidere, inest uicinitas utriusque aliquatenus particeps, ita quæque ulcerum phlegmone laborantium, cum scirris absq; phlegmone, quales induratis accidunt, media quædam est dispositio, doloris quidem expers, si non digitos imprimas, dolens autem si id facias, quàm clarioris breuiorisque disciplinæ gratia, uel phlegmonem scirrosam, uel scirrum phlegmonodem dicemus, non hic tumoris magnitudini animum attendentes: Nam phlegmone & scirrus formæ affectuum, non quantitatis in altero ipsorum nomina sunt: Nam phlegmone uel propter partis inflammatæ magnitudinem, uel ob tumorem præter naturam magna euadit: parua autem quum aut paruum locum possidet, aut exiguum tumorem habuerit. Dicitur nunc mihi paruæ phlegmones, scirrique parui curatio, sicut & magni utriusque, pro affectuum figura. Hinc enim & aliorum, quæ magna & parua dicuntur, curationis notio sumetur. Itaque magna phlegmone cataplasmatibus humidis quibusdam medicamentis sanatur: parua, cum scirrosa durities musta fuerit, itidem cataplasmatibus: interim uerò medicamentis cerati modo confectis, & limpidis, insuper emollientibus emplastris: talibus autem & parua durities tollitur. Atqui in hoc quidem simplex scopus, quemadmodum & phlegmone consistente est: cum uerò durities phlegmonodes quippiam habuerit, ad composita quoque animum dirigimus.

De medicamento, quod quia liquidum est,

ῥάφυσον Græci appellant.

**A**C ideo medicamen quodammodo compositum est, ueluti & hoc quod ῥάφυσον nominant, omnibus cognitum: magnificè uerò cum ab alijs quibusdam, tum Hera commendatū. Medetur autem id particulæ parua adhuc phlegmone confligenti, non multo post confectio- nem tempore, sed protinus impositū: ubi uerò duritiem à dolore alienam pars affecta acquisierit, paulò recenti ue- tustius utile est: quemadmodum si phlegmonodi affectu omnino sit libera, melius in ea uetustius medicamentum proficit: uerū medicamenti tempus pro duritiei inten- tione uidelicet æqualiter augere conuenit, etsi partem ual- de induratā ne uetus quidem pharmacū emollicrit. Quip- pe uaria hoc ῥάφυσον dictum medicamentum & pronut- tit, & potest: quoniam materiem mistam quoq; seu ua- riam obinet: siquidē adeps suillus & cera mollientium sunt imbecillima: argenti spuma uerò & cerussa nihil ha- bent malaficum, quemadmodum antea didicimus. Por- rò Heras, qui pharmacum hoc omnium maximè lauda- uit, ex hisce ipsum ita conficit: Adipis suilli recentis cura- ti pondo uncias quadragintaquatuor, ceræ pondo un- cias uigintiquatuor, cerussæ pondo uncias sex, argenti spumæ tantundem: quæ liquari possunt siccis superfun- duntur: temporis autem spatium medicamentum consistit spissaturq;. Sicut ceram & adipem suillū imbecillæ mol- liendi uirtutis esse dixi, ita si oleo paxillū ceræ misceas, id quod à medicis cerælum dicitur efficies. Atqui oleum uidelicet esse conuenit, nec quod uocant omphacinum

Et omotribes, quasi dicas, immaturum et crudum, nec quod oleæ surculos in confectioe assumpsit. Itaque tam imbecillia malactica etiam parvis medicantur inflammationibus. His autem fortiora modicam duritiem sine phlegmone persanant: his adhuc ualidiora maiores, quemadmodum et quæ duritiem in scirrum propè degenerantem curant, efficacissima sunt, cuiusmodi est medullarum genus, in maioris minorisq; ratione inter se differētium, ut deinceps explicabo. Item bdellium utrunq; arabicum

Styracis differētia, & electio.

et schythicum: insuper styraces: siquidem horum efficacissimus est colore pallidus, qui etiam optimus in Pamphilia nascitur: qui uerò hoc magis fuscus est ubiq; prouenit, potentia multò pallidior inferior: at temporis processu aureum colorem acquirit. Hoc itaque in antidotis propter caritatem utimur: ac tu propterea principum quodcunque ex styrace præparans semper hoc uteris: item si familiarium quis in pharmacorum sumptibus magnificus existat, illi quoque ex huiusmodi styrace medicamentum compones: in alijs optimum ex fusco genere deliges, et odore potissimum, et colore iudicium eius sumens: nam niger deterior est. Ceterum his quæ indure scētia ualidè emolliunt, gutta ammoniaci adscribitur, eaq; magis pinguis et noua. His minus, sed tamē et ipsa effi-

De adipibus.

cacia sunt, caprarum bouumq; pinguia: interea ipsa hircorum ac taurorum ualidiora sunt: bouum uerò et caprarum his quidē imbecilliora, quanquā nec ipsa actionis sint expertia: hædorum autē et uitulorum his ipsis adhuc imbecilliora sunt, porcillo tamen efficaciora: porro leonis, pardii, hyenæ et anseris euidentius his digerunt, non magis emol-

emolliunt: quanto etiam subtiliorem substantiam caprino  
 & bubulo seuo habent. Cæterum gallinaceum mediam  
 intra anserinum & suillum sedem occupat: quemadmo-  
 dum & medullarum optima est uitulina: ac resine, quæ Medullæ.  
 non acrem odorem habent, si dictorum cuiuspiam miscen-  
 tur, glutinandi uim, quæ Græcis ἑλκυστικὴ & dicitur, me-  
 dicamentis compositis apponūt, emolliendi uirtutem non  
 auferunt. Aptissima est quæ Chia uocatur & larix:  
 post has picea, inde abietina: strobilina uerò uehemen-  
 ter acris est, pityinea, seu pinea, quam proprie physema  
 nominant, pinguitudinis expers admodum exiccat. Has  
 igitur fugere, chia uerò & abietina uti oportet, non ipsis  
 per se, uerum cum cera & quodam alio, quod affectui  
 conducere uideatur. Cæterum pix non miscenda est, si-  
 cut nec bitumē, utpote iusto sicciora: quippe ea quæ exic-  
 cant mollientibus esse contraria: quoniam uere piceam  
 & frictam resinam, & colophoniam appellare consue-  
 uerunt, sciendum uenit, aliam quandam esse colophoniam, Colophonie  
 Chie mastichæ persimilem, molliens aliquid habens, duplex nota.  
 quemadmodum illa & thus: insuper ægyptia mastiche  
 nonnihil emollit, sed maior uirtutis ipsius portio conco-  
 quit, digeritq;: item thus modicam molliendi uim obti-  
 net: uerum hoc quidem coctum ex usu est, ueluti & fœ-  
 nigræci semen: etenim & hoc probè coctum emollit, ac  
 magis adhuc pingui temperatum. At quæ citra coctionē  
 ob consistentiæ siccitatem dilui, liquari, mergiq; deside-  
 rant, oleoso quopiam indigent, cuiusmodi sunt, oleum  
 ipsum, cum nihil astrictionis habet: item balneorum  
 strigmenta, præterea quod uocatur susinum: ad hæc



multo magis commagenum : huius ordinis est butyrum, tum altheæ & fœnigræci decoctū. Porro inter tam molliā & ualidiſſima, quod genus ſunt bdellium & ſtyrax, gutta ammoniaci idem poteſt quod & propolis : atqui hoc in bdellio diſtinguendum eſt, quòd ſcythicum altero arabico multo ad hæc ſit præſtantius, præcipue nouum & molle, quod etiam pingue nominant: conſuetudo ſiquidem hæc eſt inter recētioreſ medicos, in huiuſmodi pharmacis quod mollius eſt, idem uidelicet humidius quoque appellaffe. Cæterum galbanum, & quæ opopanax dicitur, præterquam quòd digerunt, etiam quid molliens occupant : opopanax autem digerendo, galbanum molliendo coquendoq; præcellit. Talis ſanè mollientiū pharmacorum facultas eſt. Tu cum uel ſcriptum aliquod in libris medicamentorijs diſcutias & examines, uel ipſe componas, auditis nuper pharmacorum ſecundum maioris minorisq; rationem diſſerentijs, intellectus item corporum aſſectuumq; diuerſitatibus, ualida ualidis, imbecillia imbecillibus adhibebis. At ubi poſt primam medicamenti impoſitionem denuò ipſum applicas, oleo pingui partem aſſectam fouere conuenit. Porro ex ijs quæ à glutinatione ἑξικοττα nominantur, nullum auferendum eſt priuſquam ſua ſponte abſceſſus proueniant : atqui ſi laueris pernuttenda ſunt. Vitanda autem medicamentoſarum aquarum lauachra, præſertim quæ auripigmentoſa, aluminofa & ſulphureoſa ſunt. Hæc quidem ſufficiūt uiris cordatis ac prudentibus, tum in medicinae operibus quodammodo exercitatis. Quoniam uerò omnes eiufmodi non ſunt, & propoſuimus hoc commētario, non ut in opere

opere de morbis curandis methodum solam exponere, uerum simul cum particularium uno atq; altero exēplo pharmaca usu comperta subiungere oportet, quæ maiores nostri, in medicatoria artis parte celebres, literis mandauerunt, ad speciales mollientium pharmacorum differentias peruenimus, à mollissimis, quæ & paruis inflammationibus medentur, exorsi. Ex compositis malaëticis alia quidem, ut ita dicam, imbecilliora primo ordine statuuntur, quædam non multo his ualidiora, secundo, & quædam alia tertio, ad hæc nonnulla quarto. Cæterum primi ordinis malaëticis ad exiguas durities, & in mollibus seu teneris corporibus uti, sicut prædictum est, expedit: ad fortiora his corpora & affectus, secūdi: quemadmodum & tertij & quarti, pro illorum qualitate. Subscribunt autem singula illorum ordinum separatim.

Malaëtica, id est, emollientia medicamina primi ordinis.

**B**Vtyrum uel resina colophonia, & cera candida non uetusta, singula pondere æqualia, inuicem liquata, primi ordinis malaëtica sunt. Et liquidum medicamen, quod *πάπυρος* appellatur, eorum numero adscribitur, cum recens fuerit: uetus autem maiorem digerendi uim repræsentat. At emolliētium imbecillimum est, cera cum butyro liquefacta, aut ex susino, aut commageno. Atque his imbecillius est quod dicitur Græcè *κρηαίλειον*, quasi ex cera oleoq; confectum, cum in libram olei laxantis nulla astringēdi uirtute præditi, ceræ uncias duodecim, uel sedecim iniecerint. Iam ex ouis cerata facta, exiguum

quand

quandam relaxandi potestatem possident: ualentiora his, uerum imbecilla adhuc & ipsa, cerata ex æsypo, resina & cera pari pondere liquefactis: Sin autem uetustiora quodammodo ipsa fuerint, olei cuiusdam laxantis, uel su sini, uel commageni, uel adipis suilli, uel gallinacei, uel anserini misturam requirunt.

### Malactica medicamenta secundi ordinis.

**Q**uemadmodum in simplicibus medicamentis facti-  
tauius, quarti ordinis homogenia pro maioris mi-  
norisq; ratione distinguentes, aliquorum ambiguam esse  
uirtutem diximus, siue ad primum ordinem, siue secun-  
dum initio ipsorum facultas locanda sit: Ita de secundo,  
tertio, & reliquis deinceps. In quibusdam uerò audacter  
pronuncians, alia in principio huius, alia in termino hu-  
ius ordinis consistere dixi: sicut nonnulla citra apposi-  
tionem uel primi, uel secundi, uel tertij, uel quarti ordi-  
nis esse retuli. Atqui multum experientie particularis  
in uarijs & corporibus, & uitijs seu affectibus huiusmo-  
di pronuntiata desiderant. Quare si quis post me æque  
studiosus, & ueritatis uehementis amator extiterit, non te-  
mere ac subito, ubi bis terue usus expertusq; sit, ferat sen-  
tentiam: frequenter enim ex longa experientia, quemad-  
modum & ego, deprehendet uidebitq; in secundo ordi-  
ne dicta, in tertium incipientem transponi oportere, uel  
iuxta in principium tertij absolute. Cum enim corpora,  
quibus medicamenta adhibentur, ipsiq; affectus non exi-  
guum differentie excessum in maioris minorisq; ratio-  
ne obtineat, difficillimum est de omnibus eadem pronun-  
ciare.

ciare. Accedit huc, quòd ipsa simplicia medicamenta non paruo diuantur discrimine. At ego cum in præstantissimis uirtutem pro unaquaq; specie ac genere ostenderim, si quis in deterrimo per experientiam examinatione molitur, examinabit quidem falsò, non autè facultatis ipsorum ordines distinxerit. Itaque longè tutissimum est, medicaminum ipsorum inter se differentiam secundum maioris minorisq; rationem accuratè scribere, quemadmodum & in alijs feci, & nunc facturus sum. Sanè quidem emplastrum Mnaseo auctore compositum, rectissime secundo malacticorum ordini adscripseris, omnibus certe qui eius meminerunt, conuenientibus, ex oleo ueteri, argenti spuma, & adipe suillo componi: in quantitate uerò singulorum discrepantibus, tum eo quòd nonnulli ex recenti adipe, quidam ex ueteri, quem iam omnes uocare solent axungiam, composuerint. In his quidem imbecillimum fiet ex argenti spuma, suillo adipe, & oleo, neutro ueteri ualidius: oleo quidem inter ea ueteri, altero autem recenti addito: his ualidius ex ambobus uetustis. Ex eo igitur quòd recens, aut uetus oleum adepsq; immittitur, quatuor differentie prodibunt: aliàs quidem ambobus recentibus, aliàs uetustis: nonnunquam oleo quidem ueteri, adipe uerò recenti: uel contrà, oleo quidem recenti, uetusto autem adipe indito. At ex trium ipsorum simplicium medicamentorum mutua temperatura aliæ plu-

fiori, uel tribus imparibus temperatis: unde clarum euadit, multas fore differentias: Copiosa siquidem argenti spuma iniecta, medicamen potestate mollius fiet: pauciore, ualidius: ac magis emolliet, si plus adipis immutamus: digeret fortius, si oleum augeamus. Præterea aliud quidem accedit copiosiore oleo imposito, quod magnā uim ad medicamen, ut magis digeret, efficiendum occupat: est autem hoc, sicut primo libro diximus, si magis incoquas. Si igitur solam argenti spumam in oleo copiosiore coquas, medicamentum euidentius exiccabit: in uberiore uerò oleo coques, ubi plus indideris, si emplastri spissitudinem habiturum sit: quòd si id non cures, sed æquali tempore tum id quod minus olei continet, tum quod plus habet incoquas, liquet potestate mollius futurum, cui oleum uberius temperatum fuerit, quemadmodum si & cruda argenti spuma oleo commixta acopo uti uelis. Quare quod iam sæpè dixi, semper ipsius memunisse uolo: non sicut quidam sententias absolute de pharmacis ferunt, & sic nos facere: absolute dicentes, hanc medicamenti compositionem illa esse potiore. Nam utraq; ad diuersos specie affectus componi potest: interim ad eosdem diuersis temporibus.

De relaxantibus medicamentis.

Vocantur medicamenta quædam relaxantia, Græcè χαλαστικὰ, familiari omnibus propè recentioribus medicis uocabulo: inde nimirum, sicut & nomen ipsum indicat, quòd tensas laxant particulas: quippe relaxari, ac intendi contraria inter se dicuntur: quinetiam Hippocrates hūc in modum scriptum reliquit: cuti duræ emolli-  
litio,

litio, intensa relaxatio cōuenit. Si igitur propriè quis di-  
 ctionibus uti uelit, nonnulla medicamina induratorum  
 corporum malaestica, id est emollientia esse dicet, ea nimi-  
 rum quæ ipsorum soluant duritiem, quemadmodum &  
 relaxantia quæ tensioni medentur. Porro in phlegmo-  
 nis cutem tendi contingit, interim à subiecto tumore sym-  
 ptoma hoc capientem, interim ipsammet inflammatione  
 laborantem, non tamen phlegmones substantia partis  
 inflammatae durities est, sed è conuerso planè, sicut in li-  
 bris de ipsa ostendimus, humiditas: atqui in his quæ  
 scirro conflictantur, non præpollens in affecta parte hu-  
 miditas est, uerùm durities: attamen utriusque affectus  
 simul quodammodo generatio est, & curatio: nascitur  
 enim ex confluxu humorum: curantur iisdem euacuatis,  
 quanquam euacuationis modus in utrisque idem non est,  
 sed uti in Therapeutices commentario declaratum est,  
 in quo etiam aliorum omnium affectuum sanandi ratio-  
 nem explicuimus, inflammatis quidem particulis, tum  
 repulsoria medicamentorum qualitas, morbi initio, tum  
 discussoria semper ex usu est: scirris autem sola dis-  
 cussoria sine repellente: itaque summè indurata scirro,  
 summè insanabilia sunt. Porro dignoscere ea oportet,  
 eo nempe signo, quòd nullus affectus partibus sensus su-  
 per sit: at in quibus sensus quidem est, sed obscurus, hæc  
 curantur pharmacis humorem incrassatum uidelicet di-  
 crenantibus, non tamen uelidè, quoniam sunt hæc remedia

cum simul & confluens humor sit crassior & liquidus, & curatio medicamentis ualde exiccantibus administretur: quemadmodum & in exterioribus per multa corpora, quæ ipsum ignem contingunt, torrentur, ex aqua rursus emolliuntur: ita in inflammatis affecti loci humiditas, à calefacientibus & exiccantibus ualidius pharmacis, reliquum aliquid uiscosum crassumq; retinet, tenui discusso. Et hac ratione in morbis articularibus calli proueniunt, & in renum uitio calculi. Quòd si uerò fluxio quæ phlegmonem committit substantia sit tenuis, & curatio eius siccantibus & calefacientibus pharmacis adhibeatur, nihil scirrosus relinquitur: imò refrigerantia uehementer astringentiaq; scirros procreare solent: ac multos ex erysipelatis immodicè refrigeratis scirrosos humores habere conspiciamus medicorum qui eos sanandos susceperunt inscitia. Prima ergo medicaminum, quæ phlegmonis & quæ scirris medentur, differētia est prædicta: altera propter dolorem inflammantis coniunctum, quæ non sustinet ualens medicamentum affectæ particulæ offerri. Quippe hæc cum dolore actionem edunt, inflammationis ob affectum statim dolentibus, eoq; molliissima remedia desiderantibus. At uehementiora præterquam quòd dolores non soluunt, uel mitigant, adhuc etià ex acuentia maiores phlegmonas concitant. Itaque prius usus in dolentibus phlegmonis est, qui medicamentis abundè humidis simul & modicè calidis administratur. Alter paulò crassioribus siccantioribusq; constat. Tertius relaxantibus nominatis, quæ nonnulli malagmatis adscribunt. Sunt autem inter ea molliissima sanè, quæ ce-



rati speciem consistentiæ referunt, cum ex butyro, cera, adipibus, oleoq; relaxante componuntur. Temperatur ipsis æsopi, resinæ & picis modicum, sicut & thus, & galbanum, præterea nonnihil iris illyricæ. Porro Mene crates ut ipse ait, & alij quidam ei attestantur, medicamentum *ἔλχυν*, id est ex succis appellatum, phlegmonis nondum uehementer dolentibus esse remedio.

### De Acopis.

**Q**uid acopa medicamenta promittant, etiam nomen ipsorum ostendit. At copos, id est lassitudines Græci homines uocant affectus ex multo uehementiq; motu, corporibus uel totis, uel particulis amplius exercitatis oborientes. Porro molesti sunt potissimum ijs qui agitantur, mouenturq; uehementiores autem, iam & conquiescentibus negotium faceßunt. Cæterum postea medicis in usu fuit, etsi non ad lassitudines medicamen ab ipsis sit compositum, sed uel ad dolorem diuturnum in alto corporis latentem, uel motum difficilem, uel particulae duritiam, uel tensionem, uel tumorem scirrosam appellare acopa, & id genus omnia, modò humidam consistentiam acopis simulc habeant: quæ liquidis ceratis, cuiusmodi & in luxatis, fracturisq; utimur, est propinqua. Quippe talem consistentiam habet, humidissimum quod à iunioribus medicis ceræleō appellatur: deinde illius acopi: post hoc liquidorum ceratum, crassiore substantia præditū: mox

Medicaminū  
consistentiæ  
ordo.

Ceratoma-  
lagmata.

mediocrem obtinent differentiam. Quare nonnulli medicorum quædam nomune à sola consistentia ita desumpto, ceratomalagmata nuncuparunt: medicamenta, inquam, inter ea quæ corpori imponuntur: nondū quidem humida, duritiem uerò necdum consecuta, qualem emplastra occupant. Cum igitur omnes citatæ differentiæ non medicamentorum uirium, sed consistentiæ formæ sint indices, acoporum appellatio quondam sanè medicaminū facultatem, postea consistentiā significauit: huiusq; rei causa cū distinctionibus ea nominare coacti sunt: hoc quidē acopon relaxans, illud emolliens, uel calefaciens, uel à dolore tollendo anodynum, uel metasyneriticum appellant: sicut ad huiusmodi quendam affectum conferre: uerbi gratia, paraly sin, coxarū laterumq; dolorem: uel communiter ad uniuersos dolores. Natium igitur est medicamen simplex, omnium lassitudinum præsidium, oleum uidelicet, quod & citra adiectionem nominatur: quoniā uetustis temporibus solum quoque erat: posteri cicinum apud nos ei apposuerūt. In Aegypto enim hoc simul uetustum erat: & rursus raphaninum, sinapinum, & sesaminum, tum alia eius generis, quæadmodum etiam apud nos crinum, mastichinum, & lentiscinum, quæq; his magis uaria sint, ut unguenta, propè accedant. Itaq; neminem latere arbitror, medicamenta acopa dicta, omnia liquidæ consistentiæ esse necessario: quippe oleum solum lassitudines externis partibus ingruentes curat: in alto asfligentes uehementioresq; temperatū alicui laxanti pharmaco, & mediocriter calefacienti, ueluti galbano, resinæ terebinthina: adhæc colophonix cuidam nominate

& frit

Oleum simplex acopō.

Acopis quæ  
misceantur.

Et *frictæ*. Quibus calidiores sunt *abietina* Et *strobili-*  
*na*: *terebinthina* uerò *larix* paulò calore præcellit. Cæ-  
terum id genus omnia relaxatibus oleis miscentur, qua-  
le est *sabinum*, iniecta interdum Et *cera*. Iam uerò ἀκο-  
ποι unguen est in his qui iam in corporibus alto dolent  
medicamē ex semine *abietis*, *chamæmeli*, *aneti*, Et *floris*  
*populi*, quorū mox dicemus confecturam: præterea *susi-*  
*num*, Et *gleucinum*, Et *comagenum* ex *acoporū* ungui-  
num grege est, quæ tum ex medulla, tum pingui compo-  
nuntur, suillo quidem moderatissimè relaxati, *gallinacco*  
autem his uehementius, Et hoc adhuc magis anferino.  
Atqui pingue *leoninum*, Et *pardi* ualidius est, ut iam ue-  
hementer calefaciat, eoq; insigniter discutiat. In medio  
horum cōsistunt, *bubulum*, *caprinum*, *uulpis*, Et *hyenæ*.  
Hæc sanè in uniuerso genere sunt, quæ propriæ ἀκοποι di-  
cuntur, hoc inuicem discrimine uariantia, quòd alia ma-  
gis, alia minus calefaciant. Quapropter nonnulla genere  
toto *acoporum* unguinū excidisse uidebuntur, si in mol-  
libus ea corporibus examines, etsi durioribus, cuiusmodi  
*agrestium* sunt, utilissima appareant: nam subinde dixi-  
mus, dura corpora ualentiora *pharmaca* sustinere, mol-  
lia uerò Et *humida*, uelut *puerorum*, *mulierū*, Et *eunu-*  
*chorum* eiusmodi medicamunum potentiam ferendo non  
esse. Insuper cuius notum est, Et quæ uocantur *myraco-*  
*pa*, ex *acoporum* cum unguentis temperatura fieri, ni-

Lugduni  
Excudebant Ioannes  
& Franciscus Frel-  
lonii, fratres.

I 5 4 2